

ديبروفوس أمبولة 5 ملغ 2+ مل محلول معلق للحقن

بياناتيمازون ثانوي البروبوتينات وبيتاميمازون فسفات ثانوي الصوديوم

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاستشير طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك وحدك، فلا تطلعه لآخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها.
- إذا تعرضت لأية آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي. ينطبق ذلك أيضًا على آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة. انظر قسم: 4.

معلومات هذه النشرة:

- ما هو عقار ديبروفوس؟ وفيم يستخدم؟
- ما المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل استخدام عقار ديبروفوس؟
- كيفية استخدام عقار ديبروفوس
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- كيفية تخزين عقار ديبروفوس
- معلومات العبوة ومعلومات أخرى
- ما هو عقار ديبروفوس؟ وفيم يستخدم؟

ينتني عقار ديبروفوس إلى مجموعة من الأدوية التي تُعرف بـ "الكورتيكosteroidات". تساعد هذه الأدوية على تخفيف الالتهاب الذي يصيب بعض أجزاء الجسم. تعمل بالدّاخل من الثورم والاحمرار والحكمة وتقاعلات الحساسية. وتشتمل علاج مشكلات معينة.

يتم استخدام عقار ديبروفوس في حالات الالتهاب التي تتطلب استخدام الكورتيكosteroidات الجهازية، لا سيما في الحالات التالية:

- التهاب المفاصل، الالتهاب الكيس الزالي، أو مرض عرق النساء أو الظم الظهر السفلي أو حالات أخرى بالعظم أو بالأنسجة المغيبة.
- حالات الحساسية مثل: الربو، أو حمى القش، أو التهاب الشعب الهوائية، أو الحساسية تجاه الأدوية، أو لدغات أو لسعات الحشرات.
- المشاكل الجلدية مثل: الالتهاب، أو الحكة، أو الشرى (الارتراكاريا)، أو شفاط الشعر، أو الصدفية، أو الندب أو حب الشباب الكيس.
- مشاكل أخرى تم تشخيصها بواسطة طبيبك.

2. ما المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل استخدام عقار ديبروفوس؟

لا تستخدم عقار ديبروفوس أيضًا في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكورتيكosteroidات الأخرى أو أحد مكونات الدواء الأخرى المدرجة في قسم 6.
- إذا كانت لديك عدوى فطري، يرجى إخبار طبيبك قبل استخدام عقار ديبروفوس. قد يضر طبيبك في علاج العدوى قبل استخدام عقار ديبروفوس.

تحذيرات واحتياطات

تحثّ إلى طبيبك أو الصيدلي قبل الدّاء في استخدام عقار ديبروفوس.

آخر طبيبك قبل الدّاء فيتناول هذا الدّاء في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من مرض الشكري.
- إذا كنت تعاني من مشاكل بالعدة والتّريبة.
- إذا كنت تعاني من مشاكل بالبدن.
- إذا كنت تعاني من صرخ أو تشنجات.
- إذا كنت تعاني من مشاكل بالعينين.
- إذا كنت تعاني من عدوى فيروسية أو بكتيرية.
- إذا كنت تعاني من مشاكل بالكلث.
- إذا كانت لديك مشاكل بالمعدة والأمعاء.
- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل بالقلب.
- إذا كنت تعاني من ضعف العضلات أو فقدان الكالسيوم.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بأمراض نفسية.
- إذا كنت تعاجلاً إلى التشغيل.
- إذا كنت تعاني من درم القرام (ورم في الغدة الكظرية).

اتصل بطبيبك إذا واجهت عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصريّة أخرى.

تم الإبلاغ عن أحداث عصبية خطيرة لدى بعضها إلى الوفاة في حالات حق الكورتيكosteroidات في المنطقة فوق الجافية. تتضمن الأحداث التي تم الإبلاغ عنها تحدثًا من بين أحداث أخرى، احتشاء في النخاع الشوكي، الشلل البصري، شلل رياعي، على شكل رياحنة، سكتة ماغنافية. تم الإبلاغ عن هذه الأحداث العصبية الخطيرة عند إجراء الفحص بالقطفي التالقي أو بدوته، لم يتم التثبت أمان وفعالية إعطاء الكورتيكosteroidات في المنطقة فوق الجافية ولم تُتم الكورتيكosteroidات لهذا النوع من المستخدم.

نظراً لأن الكورتيكosteroidات قد تؤدي إلى اضطراب نمو الرضع والأطفال، فمن المهم أن يراقب طبيبك عن كثب نمو طفلك وتتطوره في حالات العلاج طول الأداء.

استخدام أدوية أخرى مع عقار ديبروفوس

يرجى إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

كل ذلك، أخبر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أيًّا من الأدوية التالية:

• الأدوية المضادة للالتهابات.

قد لا تعلم بذلك أو الأدواء بشكل جيد إذا كنت تتناول هذه الأدوية بالتزامن مع عقار ديبروفوس.

يرجى إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

بعض الأدوية قد تزيد من آثار ديبروفوس وقد يرعب طبيبك في مراقبتك عندها إذا كنت تتناول هذه الأدوية (بما في ذلك بعض الأدوية لفيروس نقص المناعة البشرية: ريتونافير، كريبيسيتات).

لا تقليل إلاغن طبيبك إذا واجهت عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصريّة أخرى.

استخدام عقار ديبروفوس مع الأطعمة والمشروبات والكميات لا تتناول قدرتك على تناول عقار ديبروفوس.

لا تتناول المكوايات خلال فترة تناول عقار ديبروفوس؛ نظرًا لأن هذا قد يسبب مشاكل بالمعدة والأمعاء لدى.

حمل والرّاضعة الطبيعية والخصوصية

إذا كنت حاملًا أو تخطيدين العامل أو كنت مرضيًّا، فتحذر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أيًّا من الأدوية التالية.

حيث أنه من غير المعروف ما إذا كان استخدام عقار ديبروفوس أمنًا أثناء الحمل أو الرّاضعة الطبيعية أم لا.

إذا تم استخدام عقار ديبروفوس للأطفال حديثي الولادة للأمهات اللائي تلقين ديبروفوس قرب نهاية الحمل من اخفاض مستويات السكر في الدم بعد الولادة.

قد يعيق طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بذلك.

استثنائي طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت حاملًا أو مرضيًّا أو إذا كنت مصاببة بمرض في الكبد أو الكلى. فقد تترافق

كميات كبيرة من الكحول البنزيلي في جسمك وقد تسبب آثارًا جانبية (تدعى "الحموض الاستقلابي").

يحتوي عقار ديبروفوس على الصوبيون

يحتوي هذا الدّاء على أقل من ملي مول واحد من الصوديوم (23 ملجم) في ملتر الواحد، أي أنه "خلال من الصوديوم" بشكل أساسى.

يحتوي عقار ديبروفوس على ميثيل بارا هيدروكسى بازوات (E218) و بروبيل بارا هيدروكسى بازوات البروبيل (E216) - هذه المواد قد تسبب تفاعلات حساسية (ربما متاخرة)، و مشاكل بالتنفس في حالات نادرة.

3. كيفية استخدام عقار ديبروفوس

استخدم دائمًا هذا الدّاء بالضبط كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. يجب مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً من شيء.

عقار ديبروفوس هو معلق للحقن. يجب رجه قبل الاستخدام. يوجه عام، يقوم بالحقن طبيبك أو الصيدلي الرعاية الصحية.

سوف يقرر طبيبك الجرعة بدأً على احتياجاته.

يجب خفض المستحضرات المعدة للحقن بالعين المجردة تحسناً لوجود جسيمات وتغير باللون قبل تناوله.

يمكن الحقن داخل العضل، داخل المفصل، حول المفصل، داخل الإصابة، داخل الجلد، داخل الكيس الزالي. يمكن الحقن أيضًا داخل الأنسجة الرّخوة.

لا يجب استخدام عقار ديبروفوس للحقن داخل الوريد أو تحت الجلد.

إذا تناولت كمية أكبر مما يجب من عقار ديبروفوس

سيتأثر طبيبك بالتنظيم من أن تكون تناول جرعة الملح.

في حال تناول جرعة زائدة من ديبروفوس، يرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلي على الفور.

إذا أغلقت عن تناول عقار ديبروفوس

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها.

إذا توقيت عن تناول عقار ديبروفوس

لا توقيت فجأة عن استخدام عقار ديبروفوس. يجب أن يخفيض طبيبك الجرعة تدريجيًّا.

إذا كانت لديك أيًّا من آثار جانبية حول استخدام هذا الدّاء، فاسئر طبيبك أو الصيدلي.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثله مثل كافة الأدوية، قد يسبب عقار ديبروفوس آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع.

تعتمد الآثار الجانبية المترتبة على الكورتيكosteroidات، والتي تشمل عقار ديبروفوس، على الجرعة ومدة العلاج.

قد تعيق آثار العلاج عقار ديبروفوس من تناوله.

• تغيرات في معدل ضربات القلب لديك، ارتفاع ضغط الدم.

• احتباس الماء.

• ترقق الجلد، دكمات، أحمرار الوجه، شفاء الجروح بشكل أكثر بطء، تفاعلات حساسية، زيادة التعرق، شرى (ارتراكاريا).

• بعض الحالات التي تصيب المعدة والأمعاء مثل التقرّات، فرق (جازوق).

• تشنحات، إحساس بالبعض (التشنج)، صعوبة في التنفس (السرقة)، تغيرات في حالة المزاجية، اكتئاب.

• مشاكل بالعينين، مثل المياه البيضاء أو الزرقاء أو بروز مقلة العين من مكانها المعتاد.

• رؤية غير واضحة.

• وجه القرم (worm eye)، حب الشباب، اضطرابات الثورة الشهيرية والرغبة الجنسية، زيادة الحاجة إلى الأنسولين أو بطيء نمو الجنين أو الطفل.

• زيادة الوزن.

• تثبيط اختبارات الجلد.

• إفرازات العروق الدموي، تقييل عدوى كاملة.

• ضعف مقاومة المجرى الدموي، لا سيما تجاهه بكتيريا السبل، وفطريات الميسيبات والفيروسات.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا تعرضت لأية آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. ينطبق ذلك أيضًا على آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة.

من خلال إبلاغك عن الآثار الجانبية التي تصبّيك، فإنك تساعد في توفير معلومات إضافية حول أمان استخدام هذا الدّاء.

5. كيفية تخزين عقار ديبروفوس

يحفظ هذا الدّاء بعيدًا عن رؤية وتناول الأطفال.

ديبروفوس أمبول

يتم التخزين في درجة حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية بعيدًا عن الضوء والتجفيف.

لا تستعمل هذا الدّاء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة بعد كلامة (EXP). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب عدم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية. أسل الصيدلي الخاص بك، ينطبق ذلك أيضًا على آثار جانبية التي تم تجاهيلها.

يجب عدم التخلص من الأدوية التي تصبّيك، فإنك تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. معلومات العبوة ومعلومات أخرى

ما هي معلومات عقار ديبروفوس؟

ثنائي الصوديوم فسفات ثانوي 4.63 مل (مما يعادل 5 مل من ديبروفوس). وبيتاميمازون.

المكونات الأخرى هي: فسفات ثانوي الصوديوم ثانوي الهيدرات، كلوريد الصوديوم، إبيتات ثانوي الصوديوم، بولي سوربات من 1519 (E1519)، كحول بنزيلي (90٪)، ميثيل بارا هيدروكسى بازوات، بروبيل بارا هيدرووكسي بنتروات، كحول بنزيلي.

ما هي معلومات عقار ديبروفوس؟

ثنائي الصوديوم فسفات ثانوي 4.63 مل (مما يعادل 5 مل من ديبروفوس). وبيتاميمازون.

المكونات الأخرى هي: فسفات ثانوي الصوديوم ثانوي الهيدرات، كلوريد الصوديوم، إبيتات ثانوي الصوديوم، بولي سوربات من 1519 (E1519)، ميثيل بارا هيدرووكسي بنتروات، بروبيل بارا هيدرووكسي بنتروات، كحول بنزيلي.