

نوفارتس

لومير لومير إس آر أو

مضاد للكولسترول

التركيب

لومير

يشتمل القرص العزز الواحد على

- المادة الفعالة إيسراديبين ٢٠.٥ مجم

- السواخ كبريتات صوديوم لوريل، سواخ لثعلل اقراص.

لومير إس آر أو

تشتمل الكبسولة الواحدة المنخفضة البرعة على

- المادة الفعالة إيسراديبين ٢٠.٥ مجم

- السواخ لثعلل كبسولة

تشتمل الكبسولة الواحدة على

- المادة الفعالة إيسراديبين ٢٠.٥ مجم

- السواخ سواخ لثعلل كبسولة

الخصائص/الأثار

إيسراديبين، المكون الفعال في لومير، هو دايهيدروبايريدين مضاد للكولسترول له قابلية أعلى لثقلوات الكالسيوم الموجودة على البطانة الأمامية الشريانية من تلك الموجودة في عضلة القلب، ويقلل فهو يوسع الشرايين الوعائية الشريانية، بصفة خاصة تلك الموجودة في القلب والحن والعسلات الوعائية، دون أن يحدده وظيفة القلب وكثافة لتوسيع الأوعية الطرفية، يخفض ضغط الدم الشرياني.

تشير التجارب على الحيوانات إلى أن إيسراديبين يراول مفعولا انتقائيا مسبقا للعدسة اليبسية، ولكنه لا يعوق التوصيل الأنفي للبلنتي أو الوظيفة الانقباضية للعدسة القلب لذلك فإن تسرع القلب المتكسر يكون معتدلا، ولا تحدث إعاقة للمسافة PO، حتى بعد العلاج الأسبوعي واحد حاصرات بيتا، كما يحدث الفعالة عند لومير. ثبت أيضا أن إيسراديبين له تأثيرات مختلفة على معدل للصدويوم ولكنه مفعول معتد.

في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يتسبب انخفاض ترتيب بالفعالي لضغط الدم أثناء الرقاد والجنوس والقيام خلال ٢-٣ ساعات من تناول جرعة مفردة بالفعول. لومير له مدة مفعول طويلة مما يضمن السيطرة على ضغط الدم لمدة ٢٤ ساعة عند تناول قرصين ٢٠.٥ مجم مرة واحدة يوميا أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠.٥ مجم مرة واحدة يوميا، ويتخفف ضغط الدم بشكل معتد بعد أسبوع واحد من العلاج، ولكن يتولى مع الاقل ٢-٣ أسابيع للتحسن على

التأثير الأقصر. لم تُشاهد في المعتاد تغيرات في سرعة القلب مع الكبسولات إس آر أو.

كشأت الفدرعة على تشمل إيسراديبين جيدة عند إعطائه للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الذئبية الصدرية المستقرة ويعرطات تصل إلى ١٠.٥ و ٢٠.٥مجم/يوم. أدت العرعات المفردة بالفعول من لومير إلى إخماد الاستجابة الشنطية الشنطية في مرضى الربو الناتجة عن التسريع لومير ليس له أي تأثير ذو دلالة إكلينيكية على استقرار الجلوكرز وبالتالي يمكن إعطائه مرضى السكر.

لم تُرصد تقارير من حالات انخفاض وظيفي لعضلة الدم. لم تُشاهد حدوث تناقص لثقلول لومير الفائق لضغط الدم في الدراسات التي استمرت مدة تصل إلى سنتين.

الحرائك الدوائية

بعد الامتصاص يتسبب ٩٠-٩٥٪ من القناة الهضمية، يتعرض إيسراديبين لأبيض المرور الأول بشكل موع، مما يؤدي إلى معنواه حيوية بنسبة ١٢.٠٪ تقريبا بعد تناول جرعات مفردة يوميا ٢٠.٥-٩.٠مجم. يظهر الدواء، في البلازما خلال ٤ دقائق؛ ويتم بلوغ ذروته تركيزات الذروة في البلازما بعد حوالي ساعتين في حالة الاقراص، عند إعطاء المتطوعين الأصحاء، ٢٠.٥مجم لومير إس آر أو في حالة الصيام مرة واحدة يوميا لمدة ٧ أيام، كانت تركيزات الذروة في البلازما (Cmax) حوالي ٢.٤ (مجم/رام/مليفلتر بعد ٧-٦ ساعات من تناول الدواء، (Tmax).

يؤدي تناول القرص مع الطعام إلى إبطاء زمن الوصول إلى الذروة في الدم بمضايي ساعة واحدة دون التأثير على التوافر الحيوي. يؤدي تناول كبسولة إس آر أو مع الطعام إلى ارتفاع طفيف في تركيزات الذروة في البلازما وزيادة التوافر الحيوي بنسبة ٢٠٪ تقريبا. يؤدي مصير الصرير غير متوزن إلى زيادة التوافر الحيوي لفرصيات الاديهدروبايريدين من خلال تشبيهاً تاثير المرور الأول يرتبط إيسراديبين بيروثينات البلازما بنسبة ١٩/٥٠ تقريبا ويبلغ حجم توزيعه الظاهري ٧٨٢لتر. توجد علاقة خطية بين كل من تركيز الذروة في البلازما والمساحة تحت المنحنى وبين الجرعة عند إعطاء جرعات بالفعول تصل إلى ٢٠.٥مجم. تبلغ الخصائص اإحصائية إيسراديبين ١٢٠٠٠ساعة/الإفراج تشاى الأظوار: نصف العمر المتسرى النهائي ٢.٢ ساعة في المرضى الأصغر سنأ و ١.٤ ساعة في المرضى فوق ٦٥ سنة. يكون الإفراج كاملا، فلا يتلف في البول إلى قدر من الدواء، غير المتغير يتم إفراج حوالي ٦٠-٦٥٪ من الجرعة في البول و ٢٥-٣٠٪ في البراز.

لم تُشَهر مبيانات الدراسات إلى دليل واضح على وجود علاقة بين الوظيفة الكلوية وبين الجرعات الدوائية لإيسراديبين وقد شوهد كل من زيادة ونقص التوافر الحيوي في مرضى انخفاض الكلى.

وردت تقارير من زيادة التوافر الحيوي في المرضى المسنين والمرضى الذين لديهم ضعف بالوظيفة الكبدية، وقد وجدت القيم إلى ٢٧٪.

لتأثيرات الحرائك الدوائية انظر بند النشائر.

دواعي الاستعمال/الاستخدامات الممكنة

ارتفاع ضغط الدم.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة المعتادة

الجرعة الموصى بها في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مستوي لضغط الدم هي قرص واحد ٢٠.٥مجم مرتين يوميا أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠.٥مجم مرة واحدة يوميا.

تعليمات خاصة بالجرعة

الاقراص يتم بدء العلاج بالجرعة ٢٠.٥مجم مرتين يوميا ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجيا على فترات كل ٤ أسابيع إلى حد أقصى ٢٠.٥مجم مرتين يوميا. إذا لم تتحسن المستويات العلاجية لضغط الدم، يجب التقييم على إضافة دواء آخر خافض لضغط الدم مع نظام لومير.

الكبسولات: إذا لم تكن كبسولة واحدة ٢٠.٥مجم مرة واحدة يوميا فعالة بالقدر الكافي بعد مدة علاج ٤ أسابيع على الأقل، يوصى بإضافة دواء آخر خافض لضغط الدم. في المرضى المسنين وفي مرضى الفشل الكلوي أو الكلى، يوصى باستخدام جرعة إيدأنتية ٢٥.٤مجم (نصف قرص) مرتين يوميا أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠.٥مجم مرة واحدة يوميا.

يمكن أيضا إضافة لومير إلى العلاج الفائق لضغط الدم المتبع بالفعول.

عند إعطاء لومير في نفس الوقت مع سيمثيدين، تُخفَضُ جرعة لومير بنسبة ٥٠٪ (انظر النشائر).

اقراص لومير وكبسولات لومير إس آر أو يجب أن تُخفَضُ مسجحا.

التحذير على الاستعمال

موانع الاستعمال

حظر المساسية لركببات الاديهدروبايريدين أو أي من السواخ

لومير اقراص فقط احتشاء، عضلة القلب قبل بدء العلاج بالفعول من قرص واحد، الذئبية الصدرية غير المستقرة

الاحتياطات

يوصى بتسوشي الصدر الفائق عند إعطاء مسركسيات الاديهدروبايريدين للمرضى الذين يعانون من ضيق أو رضى شديد.

يوصى بشد جرعة لومير بشكل فردي في المرضى الذين يعانون من ضعف بالوظيفة الكبدية أو انقصور الفلتي الزمن، وكذلك في المرضى المسنين.

يوصى بتسوشي الصدر عند علاج المرضى الذين لديهم حالة

مؤكدة أو مُشْتَبِه فيها بنسبة من متلازمة الاعتلال الجيني الذي لم يتم تروبيدهم بانظمة للقلب. يوصى أيضا بتسوشي الصدر الخاص في المرضى الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم الانقباضي.

لا توجد في الوقت الحالي خبرة بشأن استعمال لومير أو لومير إس آر أو في المرضى تحت ١٦ سنة.

توجد أدلة متواترة لا سيما في المرضى مرض قلبي ثنائي قد تؤدي مضادات الكالسيوم الموصى بها من نوع دايهيدروبايريدين إلى زيادة معدل المرض والوفاة لأسباب قلبية وعائية، قد يحدث اشتداد الأعراض الصدرية أو انخفاض حاد لضغط الدم وتسرع القلب والذي قد يتسبب مسارات غير مواتية، أثناء العلاج بهذا المستحضر.

الحمل والإرضاع

يهر إيسراديبين غير حاجز المشيمة ولا تقدم المبيانات في الحيوانات أي دليل على أن إيسراديبين له قدرة سامة للجنين أو مسانسة، ولكن الخبرة محدودة بشأن استعمال الدواء، في النساء، المواد وبالتالي فلا يمكن تسريع استعماله أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة المرجوة للام تفوق بشكل واضح أي مخاطرة ممكنة على الطفل عند استعمال لومير عن طريق الفم أثناء الشهور الثلاثة الأخير من الحمل لم يكن ذلك مصحوبا بأي تغيرات في سرعة قلب الجنين أو في سريان الدم في الرحم والشيمية. توحى المشاهدة السانفة للوفاة في الحيوانات بأن الجرعات المرتفعة من إيسراديبين قد تؤدي إلى إعاقة زمن الولادة.

أظهرت إحدى الدراسات التي تم إجراؤها على الجنونات أن كميات صغيرة من إيسراديبين تُنتج في اللبن. ولم يتم إجراء دراسات في الإنسان، وعلى الرغم من أن الدراسات أظهرت إحدى الدراسات التي تم إجراؤها على الجنونات أن إيسراديبين أثناء الإرضاع، إلا أنه لم يتم إثبات أمان استعمال الدواء على الرضع الذين يرضعون من الثدي لذلك يجب على الأمهات اللاتى يستعملن لومير ألا يرضعن أطفالهن من الثدي.

الأثار الجانبية

الأثار الجانبية الأكثر ذكرا في التقارير هي الصداع، الإحساس بالوخلة، تسبج الوجه، ودمة طفيفة موضعية ذات منشأ غير قلبي، دوار، خفقان، وتسرع هذه الأثار مرتبطة بنسواخ إيسراديبين الموسعة للأوعية وتنبيل للأشياء.

تخاص ضغط الدم في أحوال نادرة الأثار الجانبية غير الشوية، وهي نادرة، تشمل النعب، والطفح، وانخفاض الوعائية (شيطان، في أسهل).

شوهة ارتفاع إيزبات التراسمياني في الفشل في حالات القلبية التنفسية وحجم الدم السنارى في الدورة الدموية، قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية. بشرط ألا يكون استخدامها محظورا، يمكن أيضا محاولة إعطاء الكالسيوم

كما هو الحال في الأدوية الأخرى الموصى للإوعية، قد تحدث

ذبحة صدرية في حالات نادرة، ولا سيما في المرضى الذين يعانون من فشل من مرض قلبي ناجي في المرضى الذين يعانون من فشل من ذئبة صدرية، قد يزداد تكرار ودمة وشدة الذئبات عند بدء العلاج أو كنتيجة لزيادة الجرعة بسرعة مفردة.

التأثرات

لا توجد تفاعلات الكالسيوم الموصى بها مع التسوش الحيوي للمرضى مع الطعام على التسوش الحيوي، ولكنه قد يبطئ كلاً من بدء الاستعمال و زمن الوصول إلى تركيز الذروة في البلازما بإساعة واحدة. يؤدي تناول كبسولات لومير إس آر أو مع الطعام إلى زيادة طفيفة في تركيزات الذروة في البلازما وزيادة التوافر الحيوي بنسبة ٢٠٪ تقريبا.

لا تُشغير خواص الحرائك الدوائية لإيسراديبين باعطائه في نفس الوقت مع ديبوكسين، وإرفارين، بروبرينولول، أو هيدروكلوروثيازيد. لا يؤثر إيسراديبين على حركته هيدروكلوروثيازيد، وإرفارين، أو هيدروكلوروثيازيد، ولكنه يؤدي إلى زيادة التركيز الأقصى (Cmax) والتوافر الحيوي (AUC) لبيروبرينولول بنسبة ٩٨/٥٨٪، على الترتيب. لا يرتبط إيسراديبين بشكل نوعي بالبروتينات، ولم ذلك فإنه يوصى بتسوشي الصدر في الحالات التي يستعمل فيها في نفس الوقت أدوية مضادة للتشنج.

يؤدي استعمال المتزامن لسيمثيدين، وهو أحد مضيققات جهاز إنزيمسينتوكروم P450، إلى زيادة التوافر الحيوي لإيسراديبين بنسبة ٢٠٪ تقريبا (انظر الجرعة وطريقة استعماله). في حين أن استعمال المتزامن لرقابميسين، والذي يُعرف بأنه مضوق قوي لجهاز إنزيمسينتوكروم P450، يخفض ضغطه تركيزات إيسراديبين في البلازما. يجب تجنب استعمال إيسراديبين في نفس الوقت مع رقباميسين أو غيره من الأدوية المضدة للإنزيم (مثل فينوباربيتال).

قد يؤدي إيسراديبين إلى انخفاض طفيف في زمن البروثرومين، غير أن هذا ليس له دلالة إكلينيكية. يُشبه مصير الجريب فروت انشلال التساكي لركببات الاديهدروبايريدين، وبالتالي فإن تناوله في نفس الوقت مع إيسراديبين قد يؤدي إلى زيادة المستويات في البلازما وانخفاض المفعول لضغط الدم.

تجاوز الجرعة

الضروة محدودة بشأن التسعم بإيسراديبين. توحى المبيانات المتاحة بأنه قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ وعند لضغط الدم، مما يتطلب تقديم الدعم القلبي الراجعي (مثلا بإعطاء، سوائل في الوريد أو موسعات حجم البلازما)، مع مراقبة الوظيفة القلبية التنفسية وحجم الدم السنارى في الدورة الدموية، قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية. بشرط ألا يكون استخدامها محظورا، يمكن أيضا محاولة إعطاء الكالسيوم

في المرضى مع ارتفاع إيزبات التراسمياني في الفشل في حالات القلبية التنفسية وحجم الدم السنارى في الدورة الدموية، قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية. بشرط ألا يكون استخدامها محظورا، يمكن أيضا محاولة إعطاء الكالسيوم

في المرضى مع ارتفاع إيزبات التراسمياني في الفشل في حالات القلبية التنفسية وحجم الدم السنارى في الدورة الدموية، قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية. بشرط ألا يكون استخدامها محظورا، يمكن أيضا محاولة إعطاء الكالسيوم

في المرضى مع ارتفاع إيزبات التراسمياني في الفشل في حالات القلبية التنفسية وحجم الدم السنارى في الدورة الدموية، قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية. بشرط ألا يكون استخدامها محظورا، يمكن أيضا محاولة إعطاء الكالسيوم

في المرضى مع ارتفاع إيزبات التراسمياني في الفشل في حالات القلبية التنفسية وحجم الدم السنارى في الدورة الدموية، قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية. بشرط ألا يكون استخدامها محظورا، يمكن أيضا محاولة إعطاء الكالسيوم



معلومات أخرى

ملحوظة

يُخطف لومير بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

العمر الرفي

لا ينبغي استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) للطبوع على العبوة.

الصانع

انظر العبوة

آخر مراجعة لهذه المعلومات

يوليو ١٩٩٨

تاريخ الموافقة (النص)

٢١ يناير ٢٠٠٠

(M) علامة تجارة مسجلة

نوفارتس فارما شركة مساهمة، بازل، سويسرا

(إن هذا دواء)

الدواء، مستحضر بوثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يضرص لظفر

إن بقعة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الموصى عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فاطميتب والصيدلاني هما التغيران بالذواء، وينتفع وضره

- لا تطبق مدة العلاج المحددة لك من تلقا، نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء، بدون وصفة طبية.

حفظ الأدوية بعيدا عن متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصناعات العرب