

# Valsartan arrow®

80 mg

160 mg



Adulte et enfant  
de 6 à 18 ans

comprimé pelliculé

## Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice

1. Qu'est-ce que VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme, qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

**VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé, peut être utilisé pour les conditions suivantes :**

- **pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes et chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans.** L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.

- **pour traiter les patients adultes atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique.** VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est utilisé quand les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (une autre famille de médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque) ne peuvent pas être utilisés. VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé peut également être utilisé en plus des IEC lorsque les bêtabloquants (un autre médicament pour l'insuffisance cardiaque) ne peuvent pas être utilisés. L'insuffisance cardiaque comporte les symptômes suivants : souffle court et gonflement des pieds et des jambes par accumulation de liquide. Elle survient lorsque le muscle cardiaque ne parvient pas à pomper suffisamment de sang pour fournir la quantité de sang nécessaire à l'organisme.

Le valsartan contenu dans VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé peut également traiter d'autres pathologies qui ne sont pas mentionnées dans cette notice. Demandez plus d'informations à votre médecin et à votre pharmacien.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?

**Ne prenez jamais VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan ou à l'un des autres composants contenus dans VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé.
- si vous avez une maladie grave du foie.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé en début de grossesse - voir la rubrique Grossesse).

**Faites attention avec VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé :**

Prévenez votre médecin avant de prendre Valsartan Arrow, comprimé pelliculé :

- Si vous avez une maladie du foie.
- Si vous avez une grave maladie rénale ou si vous êtes dialysé.
- Si vous souffrez d'un rétrécissement des artères du rein.
- Si vous avez récemment subi une transplantation rénale (vous avez reçu un nouveau rein).
- Si vous êtes traité après avoir subi une crise cardiaque ou pour une insuffisance cardiaque. Votre médecin pourrait, dans ce cas, vérifier votre fonction rénale.
- Si vous avez une grave maladie cardiaque en dehors d'une insuffisance cardiaque ou d'une crise cardiaque.
- Si vous prenez des médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang, y compris les suppléments potassiques ou des sels de potassium, des médicaments épargneurs du potassium ou encore de l'héparine. Il peut être nécessaire de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.
- Si vous êtes âgé de moins de 18 ans et si vous prenez VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé en association avec d'autres médicaments qui inhibent le système aldostérone rénine angiotensine (médicaments diminuant la pression artérielle), votre médecin pourrait vérifier régulièrement votre fonction rénale et la quantité de potassium dans votre sang.
- Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est déconseillée si vous êtes dans ce cas.

- Si vous avez perdu une grande quantité de liquide (déshydratation) à la suite d'une diarrhée, de vomissements ou de la prise de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme).
- Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte (ou si vous êtes susceptible de devenir). VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

Ce médicament contient un agent colorant azoïque, le jaune orangé - S (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

L'effet du traitement peut être influencé si VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est pris avec certains autres médicaments. Il peut être nécessaire de changer la dose, de prendre d'autres précautions, et dans certains cas d'arrêter un des médicaments. Ceci s'applique aux médicaments obtenus avec ou sans ordonnance, notamment :

- D'autres médicaments qui diminuent la pression artérielle, particulièrement les diurétiques.
- Les médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang, y compris les suppléments potassiques ou des sels de potassium, des médicaments épargneurs du potassium ou encore de l'héparine.
- Certains types d'antalgiques connus sous le nom d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Le lithium, un médicament utilisé pour traiter certaines maladies psychiatriques.

De plus,

- Si vous êtes traité après avoir subi une crise cardiaque, il est déconseillé d'associer VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé à des IEC (un traitement de la crise cardiaque)
- Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé à des IEC et des bêtabloquants (médicament de l'insuffisance cardiaque).

### Aliments et boissons

Vous pouvez prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé avec ou sans aliments

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

- **Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte (ou que vous êtes susceptible de le devenir).** Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé. VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

- **Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement.** VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est déconseillé chez les femmes qui allaitent. Votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématuré.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Avant de conduire un véhicule, d'utiliser des outils ou des machines ou d'effectuer toute autre activité nécessitant de la concentration, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé. Comme avec beaucoup d'autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé peut, dans de rares cas, entraîner des sensations vertigineuses et affecter la capacité à se concentrer.

### Informations importantes concernant certains composants de VALSARTAN ARROW

Excipient : colorant jaune-orangé -S.

### 3. COMMENT PRENDRE VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?

#### Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. La plupart des personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

### Hypertension artérielle chez les patients adultes

La dose habituelle est de 80 mg par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire des doses plus fortes (ex. 160 mg ou 320 mg). Il pourrait également associer VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé à un autre médicament (ex. un diurétique).

### Hypertension chez les enfants et adolescents (âgés de 6 à 18 ans)

Chez les patients de poids inférieur à 35 kg, la posologie habituelle est de 40 mg de valsartan une fois par jour.

Chez les patients pesant 35 kg ou plus, la posologie habituelle est de 80 mg de valsartan une fois par jour.

Dans certains cas, votre médecin pourra vous prescrire des doses plus élevées (la posologie peut être augmentée à 160 mg et jusqu'à un maximum de 320 mg).

### Insuffisance cardiaque chez les patients adultes

Le traitement débute généralement par 40 mg, deux fois par jour. Votre médecin augmentera progressivement cette dose au cours des semaines suivantes jusqu'à une dose maximale de 160 mg, deux fois par jour. La dose finale dépend de votre tolérance individuelle.

VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé peut être donné avec un autre traitement de l'insuffisance cardiaque et votre médecin décidera quel traitement est approprié dans votre cas.

### Mode d'administration

Vous pouvez prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé avec ou sans aliments. Prenez VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé avec un verre d'eau.

### Fréquence d'administration

Prenez VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé à peu près au même moment tous les jours.

### Si vous avez pris plus de VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous avez des sensations vertigineuses sévères et/ou des évanouissements, consultez immédiatement votre médecin et allez-vous. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

### Si vous oubliez de prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé :

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas la dose oubliée si le moment de votre prochaine prise est proche.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### Si vous arrêtez de prendre VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé :

L'arrêt de votre traitement par VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé peut entraîner une aggravation de votre maladie. N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ces effets indésirables peuvent survenir à certaines fréquences définies ci-dessous :

- Fréquent : affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 100
- Peu fréquent : affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 1 000
- Inconnu : la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

### Certains symptômes nécessitent une prise en charge médicale

#### immédiate :

En cas de symptômes d'angioedème (une réaction allergique spécifique), tels que :

- Gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- Difficultés à respirer ou à avaler
- Urticaire, démangeaisons.

### Si vous présentez l'un de ces symptômes, consultez un médecin immédiatement.

### Les autres effets indésirables comportent :

#### Fréquent (affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 100)

- Sensations vertigineuses
- Pression artérielle basse accompagnée ou non de symptômes tels que des sensations vertigineuses et des sensations d'évanouissements en position debout
- Fonction rénale diminuée (signes d'une atteinte rénale).

#### Peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 1 000)

- Angioedème (voir rubrique « Certains symptômes nécessitent une prise en charge médicale immédiate »)
- Perte de connaissance soudaine (syncope)
- Sensation de tête qui tourne (vertige)
- Importante diminution de la fonction rénale (signes d'insuffisance rénale aiguë).
- Spasmes musculaires, anomalies du rythme cardiaque (signes d'hyperkaliémie).
- Essoufflement, difficulté à respirer en position allongée, gonflement des pieds ou des jambes (signes d'insuffisance cardiaque)

- Céphalée
- Toux
- Douleurs abdominales
- Nausée
- Diarrhée
- Fatigue
- Faiblesse.

**Fréquence inconnue** (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Réactions allergiques avec éruption cutanée, démangeaisons et urticaire, symptômes de fièvre, gonflements des articulations et douleur articulaire, douleur musculaire, gonflement des ganglions lymphatiques et/ou symptômes grippaux peuvent survenir (signes de la maladie sérique).
- Taches violacées à rougeâtres, démangeaisons fébriles (signes d'inflammation des vaisseaux sanguins également connue sous le nom de vascularite)
- Saignements ou ecchymoses inhabituels (signes de thrombocytopenie)
- Douleurs musculaires (myalgie)
- Fièvre, mal de gorge ou aphtes causés par des infections (symptômes d'un taux faible de globules blancs, également appelé neutropénie)
- Diminution du taux d'hémoglobine et du taux de globules rouges dans le sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner une anémie)
- Augmentation du taux de potassium dans le sang (qui peut, dans des cas sévères, provoquer des spasmes musculaires et une anomalie du rythme cardiaque)
- Augmentation des valeurs de la fonction hépatique (qui peut indiquer une atteinte hépatique) y compris une augmentation du taux de bilirubine dans le sang (qui peut, dans des cas sévères, provoquer un jaunissement de la peau et des yeux)
- Augmentation du taux d'urée sanguine et de créatinine sérique (qui peut indiquer une fonction rénale anormale).
- Taux faible de sodium dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion, un spasme musculaire et/ou des convulsions dans des cas sévères).

La fréquence de certains effets secondaires peut varier selon votre affection. Ainsi, les effets secondaires tels que les vertiges et la diminution de la fonction rénale ont été moins fréquemment observés chez les patients adultes traités ayant une hypertension artérielle que chez les patients adultes traités pour insuffisance cardiaque ou après une crise cardiaque récente.

Les effets indésirables chez les enfants et les adolescents sont similaires à ceux observés chez les adultes.

**Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.**

### 5. COMMENT CONSERVER VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C

Ne pas utiliser si vous remarquez que la boîte est endommagée ou présente des signes d'altération

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### Que contient VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé ?

##### VALSARTAN ARROW 80 mg, comprimé pelliculé

#### La substance active est : valsartan

Chaque comprimé pelliculé contient 80 mg de valsartan.

#### Les autres composants sont :

**Noyau du comprimé :** Cellulose microcristalline, crospovidone, laurilsulfate de sodium, povidone, cellulose microcristalline silicifiée, stéarate de magnésium.

**Pelliculage :** Alcool polyvinylique, macrogol 3350, dioxyde de titane (E171), talc, oxyde de fer rouge (E172), colorants jaune orangé - S (E110) et la laque aluminique d'indigotine (E132)

##### VALSARTAN ARROW 160 mg, comprimé pelliculé

#### La substance active est : valsartan

Chaque comprimé pelliculé contient 160 mg de valsartan.

#### Les autres composants sont :

**Noyau du comprimé :** Cellulose microcristalline, crospovidone, laurilsulfate de sodium, povidone, cellulose microcristalline silicifiée, stéarate de magnésium.

**Pelliculage :** Alcool polyvinylique, macrogol 3350, dioxyde de titane (E171), talc, oxyde de fer rouge (E172), colorants jaune orangé (E110)

#### Qu'est ce que VALSARTAN ARROW, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

VALSARTAN ARROW 80 mg, comprimé pelliculé se présente sous forme de comprimé pelliculé rose rond convexe. Il porte les gravures «VS 80» sur une face et «>» sur l'autre face du comprimé.

VALSARTAN ARROW 160 mg, comprimé pelliculé se présente sous forme de comprimé pelliculé orange ovale convexe. Il porte les gravures «VS 160» sur une face et «>» sur l'autre face du comprimé.

Les comprimés sont disponibles en boîtes de 30 ou 90 sous plaquettes thermoformées (PVC/Aclar/Aluminium).

#### Titulaire/Exploitant

#### ARROW GENERIQUES

26, AVENUE TONY GARNIER  
69007 LYON

#### Fabricant

ARROW PHARM (MALTA) LIMITED  
HF 62, HAL FAR INDUSTRIAL ESTATE  
BIRZEBBUGIA, BBG 3000, MALTE

#### ARROW GENERIQUES

26, AVENUE TONY GARNIER  
69007 LYON

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est **Septembre 2011**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Assaps (France). [www.assaps.fr](http://www.assaps.fr)

Cette notice est également disponible gratuitement en braille et en caractères agrandis, auprès de HandicapZéro sur simple demande au 0800.39.39.51 ou sur [pharmabraille.fr](mailto:pharmabraille.fr)

