

كار تيفليكس[®]

الكمية لكل جرعة (٣ أقراص)

سلفات الغلوكوزامين كلوريد البوتاسيوم
٢KCl ١٥٠٠ ملغ
سلفات الكوندرويتين ١٢٠٠ ملغ
ميثيل سلفونيل ميثان ٥٠٠ ملغ
السواغات: ثنائي أوكسيد السيليكون الغرواني، سلولوز بلوري
مكروي، ستيارات المغنيزيوم، كحول البولي فينيل، ثنائي
أوكسيد التيتانيوم، طلق، بيكاربونات الصوديوم، كوبوليمر
حامض الميتاكريليك، بولي إيثيلين الغليكول.

الحمل والرضاعة

على النساء استشارة طبيبهن في فترة الحمل والرضاعة قبل
الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبية .

طريقة الاستعمال

عند البالغين
يجب تناول قرصاً واحداً ٣ مرات يومياً ومن المُستحسن تناوله
مع وجبة طعام.

التأثيرات غير المرغوب فيها

يمكن أن يتعرّض بعض الأشخاص لانزعاج مَعِدِي مَعْوِي أو
لتفاعلات أرجية.

إرشادات خاصة بطريقة الحفظ

يجب حفظ هذا المُستحضر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠
درجة مئوية وبعيداً عن الرطوبة.
يجب حفظ هذا المُستحضر في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ المراجعة: شباط ٢٠١٤ .

الشكل الصيدلاني والعبوة

تحتوي العبوة على ٦٠ قرصاً.

يوصف كار تيفليكس[®] في الحالات التالية

- يُغذّي كار تيفليكس[®] المفاصل كما يُعزّز التكوّن الصحي
للغضاريف ويحافظ عليها فيساعد على التحرك بحرية وبراحة
تامة.

- يمكن أن يساعد كار تيفليكس[®] الأشخاص أو الذين يمارسون
الرياضة في خلال عطلة نهاية الأسبوع على الحصول على ما
يحتاجون إليه من دعم إضافي لمفاصلهم.

- يمكن أن يؤمن كار تيفليكس[®] تغذية ودعمًا على المدى الطويل
للمفاصل والغضاريف الخاضعة لإجهاد مفرط خاصة عند
الأفراد الذين يعانون من الوزن الزائد.

- يمكن أن يؤمن كار تيفليكس[®] التشحيم الضروري لدعم حركة
التنقل بشكل مريح ولتوسيع المدى الحركي عند كل الأفراد
الذي يتبعون نمط حياة نشيط.

يُمنع استعمال كار تيفليكس[®] في الحالات التالية

- فرط التحسس لأي من مكونات هذا المُستحضر.
- حساسية لمادة الكيريت.

الإحتياطات

يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من
دون وصفة طبية عند المعاناة من مشاكل صحية أو عند
الخضوع لعلاج دوائي.

تفاعلات كار تيفليكس[®] مع أدوية أخرى

يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من
دون وصفة طبية عند الخضوع لعلاج دوائي.

بنتا ش.م.ل.
ضبيه - لبنان