

النشرة الدوائية: معلومات للمستخدم

أتوزيت أقراص مغفّة ١٠/١٠ ملغ

أتوزيت أقراص مغفّة ٢٠/١٠ ملغ

أتوزيت أقراص مغفّة ٤٠/١٠ ملغ

أتوزيت أقراص مغفّة ٨٠/١٠ ملغ

إيزيتيميب و أتورفاستاتين

اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام هذا الدواء، فهي تحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.

- احتفظ بهذه النشرة، لربّما احتجت إلى الإطلاع عليها مجدّداً.
- استشر طبيبك أو الصيدلي إن كانت لديك أية أسئلة إضافية.
- وصّف هذا الدواء لك بشكل خاص. حذار من إعطائه لأي شخص آخر لأنه قد يضرّه حتى لو كانت أعراضه المرضية شبيهة بأعراضك.
- إذا بدت لديك أية أعراض جانبية، بما فيها أية أعراض جانبية ممكنة لم ترد في هذه النشرة، اتصل بالطبيب أو الصيدلي. أنظر الفقرة 4.

مضمون هذه النشرة

- التعريف بدواء أتوزيت ودواعي استعماله
- المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استخدام أتوزيت
- كيفية استخدام أتوزيت
- الآثار الجانبية الممكنة
- كيفية حفظ أتوزيت
- محتوى العبوة ومعلومات إضافية

1. التعريف بدواء أتوزيت ودواعي استعماله

أتوزيت دواء مخصّص لتخفيض مستويات الكولسترول المرتفعة. يحتوي أتوزيت على مادتي إيزيتيميب و أتورفاستاتين.

يُستعمل أتوزيت لدى البالغين لتخفيض مستويات الكولسترول الكُلّي، والكولسترول "الضار" (البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والمواد الدهنية المعروفة بالثلاثي الغليسريد في الدم. إضافة لذلك، يسمح أتوزيت برفع مستويات الكولسترول "المفيد" (البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL).

يعمل أتوزيت على تخفيض مستوى الكولسترول بطريقتين، فهو يقلل من الكولسترول الذي يمتصّه الجهاز الهضمي، كما يقلل من الكولسترول الذي يفرزه الجسم بنفسه.

يُعتبر الكولسترول من المواد الدهنية الموجودة في مجرى الدم. ويتشكّل الكولسترول الكُلّي لديك بشكل خاص من الكولسترول الضار LDL والكولسترول المفيد HDL.

يُعرف الكولسترول المنخفض الكثافة عادة بالكولسترول "الضار" لأنه قادر على التراكم وتشكيل لويحات داخل جدران الشرايين. ومع الوقت، يؤدي تراكم اللويحات إلى تضيق الشرايين، ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ أو منع وصول الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب والدماع. ويمكن لإسداد مجرى الدم أن يتسبّب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

بالمقابل يُعرف الكولسترول المرتفع الكثافة بالكولسترول "المفيد" لأنه يساعد في منع الكولسترول الضار من التراكم داخل الشرايين وبقي من أمراض القلب.

أما ثلاثي الغليسريد فهو نوع آخر من الدهون الموجودة في الدم والقدارة على زيادة خطر التعرض لأمراض القلب.

يُستعمل أتوزيت مع المرضى العاجزين عن التحكم بالكولسترول بواسطة الحمية الغذائية فقط. عليك اتباع حمية غذائية خافضة للكولسترول طيلة الفترة التي تتناول فيها هذا الدواء.

يستعمل أتوزيت، إلى جانب الحمية الغذائية الخافضة للكولسترول، إذا كنت مصابًا بأي من الحالات التالية:

- ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم (فرط كولسترول الدم الأولي (متغاير الزيجوت الوراثي وغير الوراثي)) أو ارتفاع مستوى الدهون في الدم (فرط شحميات الدم المختلط)
 - عندما لا يمكن السيطرة عليه جيدًا بواسطة مادة الستاتين بمفردها؛
 - عندما تستخدم لعلاج مادة الستاتين ومادة الإيزيتيميب في أقراص مختلفة.
- مرض وراثي (فرط كولسترول الدم الوراثي المتمثل الزيجوت) الذي يتسبّب بارتفاع نسبة الكولسترول في دمك. في تلك الحالة، من المحتمل أن تتلقى علاجات أخرى.
- مرض في القلب. يخفض أتوزيت من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو عملية جراحية لزيادة تدفق الدم في القلب أو دخول المستشفى بسبب ألم في الصدر.
- أتوزيت لا يساعذك على فقدان الوزن.

2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استخدام أتوزيت

لا تتناول أتوزيت إذا:

- كانت لديك حساسية من الإيزيتيميب أو الأتورفاستاتين أو أي مكوّن آخر من مكوّنات هذا الدواء (المدرجة في الفقرة 6)
- كنت مصابًا حاليًا أو في أي وقت مضى بمرض في الكبد.
- كان هناك أي خلل غير مبرر في وظيفة الكبد حسب نتائج فحوصات الدم
- كنت سيّدة قادرة على الإنجاب ولا تستعملين وسيلة موثوقة لمنع الحمل
- كنت سيّدة حاملًا أو تحاولين الحمل أو مرضعًا
- كنت تستخدم مزيج من glecaprevir/pibrentasvir في علاج التهاب الكبد الوبائي C

التحذيرات والاحتياطات

أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلاني قبل استعمال أتوزيت في الحالات التالية:

- تعرضت في السابق لسكتة دماغية مع زريف في الدماغ، أو تكوّنت لديك جيوب صغيرة من السوائل في الدماغ جراء سكتات دماغية سابقة
- لديك مشاكل في الكلى
- لديك قصور في نشاط الغدة الدرقية (قصور الدرقية)
- تعرضت في السابق لأوجاع أو ألم متكررة أو غير مبررة في العضلات أو لديك تاريخ شخصي أو عائلي من مشاكل في العضلات
- تعرضت في السابق لمشاكل في العضلات أثناء العلاج بأدوية أخرى خافضة للدهون (مثل سائز أدوية "الستاتين" أو "الفيبرات")
- تسرف في شرب الكحول بانتظام
- لديك تاريخ مرضي مع داء الكبد
- عمرك يتجاوز ٧٠ عامًا
- أخبرك طبيبك أنك تعجز عن تحمّل بعض أنواع السكر. في هذه الحالة، اتصل بطبيبك قبل البدء باستخدام هذا الدواء.
- * إذا كنت تتناول دواءًا يدعى حمض الفوسيديك أو تتولّته خلال الأيام السبعة الماضية (دواء لعلاج العدوى البكتيرية) عن طريق الفم أو الحقن؛ إذ قد يؤدي الجمع بين حمض الفوسيديك وعقار أتوزيت إلى مشاكل خطيرة بالعضلات (انحلال الربيدات).
- لا تتناول **أقراص الفور** إذا شعرت **بألم غير مبرر أو إيلام عند اللمس أو وهن في العضلات أثناء استعمال أتوزيت**. ففي حالات نادرة يمكن للعضلات أن تصاب بانضربات خطيرة منها الانحلال العضلي المؤذي إلى تلف الكلى. من المعروف أن الأتورفاستاتين يتسبب بمشاكل في العضلات، كما أفيد أيضًا عن التعرض لمشاكل عضلية أثناء استعمال إيزيتيميب.
- كما يجب أن تخبر طبيبك المعالج أو الصيدلاني في حال شعرت بوهن مستمر في العضلات. قد تحتاج إلى تحاليل أو أدوية إضافية لتشخيص تلك الحالة وعلاجها.

راجع طبيبك المعالج أو الصيدلاني قبل تناول أتوزيت

- إذا كنت مصابًا بقصور تنفسي حاد.

إذا نطقت عليك أي من تلك الحالات (أو راونتك بعض الشوك حولها)، تحدث مع طبيبك المعالج أو الصيدلاني قبل استعمال أتوزيت، لأن طبيبك قد يحتاج إلى إحصاكت لتحليل دم قبل أو ربما أثناء فترة العلاج بأتوزيت، لتوقع خطر تعرضك لآثار جانبية مرتبطة بالعضلات. يزداد خطر التعرض لتأثيرات جانبية مرتبطة بالعضلات، مثل انحلال الرّبيدات، عند الاستعمال المتزامن لبعض الأدوية (أنظر الفقرة 2 بعنوان "التداخل بين أتوزيت وغيره من الأدوية").

طيلة الفترة التي تتناول فيها هذا الدواء، سيرافق طبيبك أحد ممرضات طبيبك أو ممرضًا للإصابة بالسكري. من المحتمل أن تكون عرضة للسكري إذا كنت تعاني من ارتفاع السكريات والدهون في الدم أو من الوزن الزائد أو من ارتفاع ضغط الدم.

أخبر طبيبك عن كافة الحالات المرضية التي تعاني منها، بما فيها الحساسية.

ينبغي تجنب استعمال أتوزيت بالتزامن مع الفيبرات (أدوية لتخفيض الكولسترول) نظرًا لغياب أية دراسات حول الاستعمال المتزامن لأتوزيت مع الفيبرات.

الأطفال

لا يوصى باستخدام أتوزيت مع الأطفال والمراهقين.

التداخل بين أتوزيت وغيره من الأدوية

أخبر طبيبك أو الصيدلاني عن أي دواء آخر تتناوله حاليًا أو تتولّته مؤخرًا أو من المحتمل أن تتناوله، بما في ذلك الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية.

يمكن لبعض الأدوية أن تبدّل مفعول أتوزيت كما يمكن لأتوزيت أن يبدّل مفعولها (أنظر الفقرة 3). ويمكن لهذا النوع من التفاعل أن يخفف من فعالية أحد الدوائين أو الدوائين معًا. كما قد يزيد ذلك من خطر الآثار الجانبية أو حدتها، بما في ذلك التلف العضلي الخطير المعروف باسم "انحلال الربيدات" المذكور في الفقرة 4:

- سيكلوسبورين (دواء يستعمل عادة لدى المرضى الذين يخضعون لعمليات لزرع أعضاء)
- إريثروميسين، كلاريثروميسين، تيليثروميسين، حمض الفوسيديك، ريفامبيسين (أدوية مستعملة لعلاج العدوى البكتيرية)
- كيتوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، فلوكونازول، بوساكونازول (أدوية مستعملة لعلاج التهابات الفطرية)
- جمفيريزول، سائز أنواع الفيبرات، حمض النيكوتينيك، المشقات، كوليستيبول، كوليسترامين (أدوية لتخفيض مستويات الدهون في الدم) بعض حاصرات قنوات الكالسيوم المستعملة لعلاج الصدعية أو ارتفاع ضغط الدم، مثل أملوديبين أو ديلتيازيم
- ديجوكسين، فيراباميل، أمبودارون (أدوية مستعملة لتنظيم ضربات القلب)
- الأدوية المستعملة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، مثل ريتونافير، لوبينافير، أتازانافير، إيندينافير، دارونافير، توليفة تينيرنافير/ريتونافير، إلخ. (أدوية الإيدز)
- بعض الأدوية المستعملة لعلاج التهاب الكبد الوبائي C، مثل تيلابريفير ، أو بوسيفيفير ، أو مزيج من إيلباسفير/جرازوبريفير دابوتاميسين (دواء يستعمل لعلاج التهابات المعدة للجلد وبنية الجلد وتجرثم الدم).

** إذا كنت بحاجة لتناول حمض الفوسيديك لعلاج عدوى بكتيرية، فستحتاج إلى وقت العلاج بهذا الدواء مؤقتًا. سيخبرك طبيبك بالوقت الذي يكون فيه استئناف العلاج بعقار أتوزيت آمنًا لك. نادرًا ما قد يؤدي تناول عقار أتوزيت بمصاحبه حمض الفوسيديك إلى ضعف العضلات أو ألم أو وجع (انحلال الربيدات). انظر المزيد من المعلومات المتعلقة بالتحلال الربيدات في القسم 4.

- غيرها من الأدوية المعروفة بتداخلها مع أتوزيت:
 - موانع الحمل الفموية (جيوب منع الحمل)
 - ستيرويدات (دواء مضاد للتهنجات يستعمل لعلاج الصرع)
 - سيميتيدين (دواء يستعمل لعلاج الحرقة في المعدة والقرحة المعدية)
 - فينازون (مسكن للأوجاع)
 - مضادات الحموضة (أدوية لعلاج عسر الهضم تحتوي على الألومنيوم أو المغنسيوم)
 - وارفارين، فينبروكومون، أسينوكومارول أو فلوينديون (أدوية لوقاية من جلطات الدم)
 - كولتشييسين (يستعمل لعلاج القرص)
 - نبّة سانت جون أو العرن المنقوب (دواء لعلاج الاكتئاب).

أتوزيت مع الطعام والكحول

أنظر الفقرة 3 للاطلاع على تعليمات حول استعمال أتوزيت. تجدر الإشارة إلى ما يلي:

عصير الجريب فروت

لا تتناول أكثر من كوب واحد أو كوبين صغيرين من عصير الجريب فروت في اليوم، لأن هذا العصير بكميات كبيرة يؤثر على مفعول أتوزيت.

الكحول

لا تسرف في شرب الكحول أثناء استعمال هذا الدواء. لمزيد من التفاصيل، أنظر الفقرة 2 بعنوان "المحاذير والاحتياطات".

الحمل والرضاعة

لا تتناولي أتوزيت إذا كنت حاملًا أو تحاولين الإنجاب أو تعتدين أنك حامل. لا تتناولي أتوزيت إذا كنت قادرة على الإنجاب إلا إذا كنت تستعملين وسائل ميثوقة لمنع الحمل. في حال أصبحت حاملًا أثناء استعمال أتوزيت، توقفي عن تناوله على الفور واتصلي بطبيبك.

لا تتناولي أتوزيت أثناء فترة الرضاعة.

لم يتم التّثبت بعد من سلامة استعمال أتوزيت خلال فترتي الحمل والتّواليد.

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

القيادة وتشغيل الآليات

لا يُتوقّع أن يؤثر أتوزيت في قدرتك على القيادة أو تشغيل الآليات، مع الإشارة إلى أن البعض قد يصابون بدوخة بعد استعمال أتوزيت.

أتوزيت يحتوي على الكانثوز

تحتوي أقراص أتوزيت على أحد أنواع السكريات المعروف بالكانثوز. إذا قال لك طبيبك بك تعجز عن تحمّل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل البدء بتناول هذا الدواء.

3. كيفية استخدام أتوزيت

تقدّم دومًا بإرشادات الطبيب عند تناول هذا الدواء. طبيبك هو من يحدّد تركيز الدواء الملائم بالنسبة إليك، على ضوء العلاج الحالي الذي تتلقاه وعوامل الخطر الخاصة بك. تحقّق من طبيبك أو الصيدلي في حال راوندك أية شكوك.

- قبل البدء باستخدام أتوزيت، ينبغي أن تتبع حمية غذائية لخفض الكولسترول لديك.
- ينبغي أن تستمر في اتباع الحمية الخافضة للكولسترول طيلة الفترة التي تتناول فيها أتوزيت.

الجرعة الموصى بها

إن الجرعة الموصى بها من أتوزيت هي قرص واحد من أتوزيت عبر الفم يوميًا.

موعد تناول الدواء

تتناول أتوزيت في أي وقت من النهار، مع أو بدون الطعام.

إذا وصف لك الطبيب أتوزيت إلى جانب الكوليستيرامين أو سائز منحيات حامض الصفراء (أدوية خافضة للكولسترول)، ينبغي أن تتناول أتوزيت قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات على الأقل من تناول منحيات حامض الصفراء.

في حال تناولت جرعة زائدة من أتوزيت

الرجاء الاتصال بطبيبك أو الصيدلي.

في حال نسيت تناول أتوزيت

لا تتناول جرعة مضاعفة، بل اكتف بتناول الجرعة الاعتيادية من أتوزيت في مواعدها في اليوم التالي.

استشر طبيبك أو الصيدلاني إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء.

4. الآثار الجانبية الممكنة

على غرار الأدوية كافة، يمكن لأتوزيت أن يتسبّب ببعض الآثار الجانبية، مع العلم أنها لا تصيب الجميع.

إذا بدت عليك أي من الآثار أو الأعراض الجانبية الخطيرة التالية، توقف عن تناول هذا الدواء وأخبر طبيبك على الفور أو توجه إلى قسم الطوارئ أو أقرب مستشفى إليك.

- حساسية خطيرة تتسبب بتورّم الوجه واللسان والحلق، مما يسبّب صعوبة كبيرة في التنفس
- مرض خطير مصحوب بتورم أو تقتشر شديد للجلد، وظهور بثور على الجلد والفم والعينين والأعضاء التناسلية، وحمى؛ طفح جلدي مع بقع زهرية داكنة خاصة في باطن اليدين أو القدمين، يتحول أحيانًا إلى بثور
- ضعف العضلات، إيلام،ألم أو تمزّق أو بول لونه أحمر مائل إلى بني، خاصة إذا شعرت بنفص الوقت بإعياء أو بحمى شديدة، فهي أعراض تنجم أحيانًا عن انحلال غير طبيعي للعضلات قد يعرّض الحياة للخطر ويؤدي إلى مشاكل في الكلى
- متلازمة شبيهة بالذئبة (بما في ذلك الطفح الجلدي، الاضطراب لاش في المفاصل والتأثيرات على خلايا الدم)
- عليك استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن في حال التعرض لمشاكل مع زرف أو تكدم غير متوقّع أو غير اعتيادي، لأن تلك الأعراض قد تشير إلى مشكلة في الكبد.

تمّ التبليغ عن الآثار الجانبية التالية (قد تصيب لغاية ١ على ١٠ أشخاص):

- إسهال
- ألم في العضلات

تمّ التبليغ عن الآثار الجانبية التالية الغير شائعة (قد تصيب لغاية ١٠٠ على ١ شخص):

- رشح
- إكتئاب؛ صعوبة في النوم؛ اضطراب النوم
- دوخة؛ صداع؛ إحساس بالتئميل
- تباطؤ ضربات القلب
- هبات ساخنة
- ضيق نفس
- ألم في البطن؛ نفخة؛ إسهال؛ عسر هضم؛ غازات؛ تعوط متكرر؛ التهاب المعدة؛ غثيان؛ انزعاج المعدة؛ تلبّد المعدة
- حب الشباب؛ شرى
- ألم في المفاصل؛ ألم في الظهر؛ تشنجات في الساق؛ تعب أو تشنجات أو وهن في العضلات؛ ألم في الذراعين والساقين
- ضعف غير اعتيادي؛ شعور بالتعب أو الإعياء؛ تورم خاصة في الكاحلين (وذمة)
- ارتفاع نتائج بعض تحاليل الدم التي تقيس وظيفة الكبد أو العضلات (كيناز الكرياتين CK)
- زيادة الوزن

إضافة لذلك، تمّ التبليغ عن الآثار الجانبية التالية لدى أشخاص يتناولون أتوزيت أو أقراص الإيزيتيميب أو الأتورفاستاتين:

- حساسية، بما في ذلك تورّم الوجه و/أو اللسان و/أو الحلق، قد تسبّب صعوبة في التنفس أو البلع (ما يستدعي العلاج الطارئ)
- طفح جلدي أحمر وثنائي، مصحوب أحيانًا بأفات مستديرة على شكل أهداف
- مشاكل في الكبد
- سهال
- حرقة
- ترجع الشهية؛ فقدان الشهية
- ارتفاع ضغط الدم
- طفح جلدي وحكة؛ حساسية تشمل الطفح الجلدي والشرى
- إصابة الأوتار

- حمى أو التهاب في المرارة (ما يتسبب بألم في البطن وغثيان وتقيؤ)
- التهاب البنكرياس المصحوب عادة بألم شديد في البطن
- هبوط كريات الدم الحمراء، ما يتسبب بتكدم/نزف (قلة الصفائح الدموية)
- التهاب المجاري الأنفية؛ نزف من الأنف
- ألم في العنق؛ أوجاع؛ ألم في الصدر؛ ألم في الحلق
- ارتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم (إذا كنت مصابًا بداء السكري، عليك الاستمرار في فحص مستويات سكر الدم بعناية)
- كوليبس
- الشعور بالخدر أو التتميل في أصابع اليد والقدم
- انخفاض الإحساس بالألم أو اللمس
- تغير في حساسة الذوق؛ جفاف الفم
- فقدان الذاكرة
- ظنين في الأذنين و/أو الرأس؛ فقدان السمع
- تقيؤ
- تجشؤ
- تساقط الشعر
- ارتفاع الحرارة
- وجود كريات الدم البيضاء في فحص البول
- تشوش الرؤية؛ اضطرابات بصرية
- تضخم الثديين لدى الرجال

تأثيرات جانبية ممكنة تمّ التبليغ عنها مع استعمال بعض أنواع الستاتين

- صعوبات جنسية
- إكتئاب
- مشاكل تنفسية تشمل السعال المستمر و/أو ضيق النفس أو الحمى
- داء السكري. يزداد خطر الإصابة بالسكري عندما تكون مستويات السكريات والدهون مرتفعة في الدم لديك، وعندما تعاني من الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم. سوف يراقبك طبيبك أثناء استعمال هذا الدواء.
- ألم أو إيلام أو ضعف مستمر في العضلات خاصة إذا في نفس الوقت كنت تشعر بالتوئك أو كنت تعاني من حمى شديدة لا تزول بعد التوقف عن استعمال أتوزيت (الوئيرة غير معروفة).

التبليغ عن الآثار الجانبية

إذا بدت عليك أية آثار جانبية، بما فيها أية آثار جانبية ممكنة لم ترد في هذه النشرة، استشر طبيبك أو الصيدلاني.

فالإبلاغ عن الآثار الجانبية يساعد في تكوين المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية حفظ أتوزيت

يخزن في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية.

- يحفظ هذا الدواء بعيدًا عن نظر ومتناول الأطفال.
- لا تستعمل أتوزيت بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة أو العبوة بعد عبارة EXP، علمًا أن هذا التاريخ يشير إلى آخر يوم من الشهر المذكور.
- يحفظ في علبته الأصلية لحمايته من الأكسجين.

لا يجب التخلص من الأدوية في المراحيض أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فهذه التدابير تساعد في حماية البيئة.

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

مكونات أتوزيت

المواد الفعالة هي إزيتيميب و أتورفاستاتين. يحتوي كل قرص مغلف على ١٠ ملغ من الإيزيتيميب و ١٠ أو ٢٠ أو ٤٠ أو ٨٠ ملغ من الأتورفاستاتين (على شكل أتورفاستاتين كلسيوم ثلاثي الهيدرات).

المكونات الأخرى: كاربونات الكالسيوم، سيليكات غروية لا مائية؛ كروس كاراميلوز الصوديوم؛ هيدروكسي بروبيل سيليلوز؛ لاكتوز أحادي الهيدرات؛ ستيرات المغنيسيوم؛ سيليلوز دقيق التبلور؛ بولي سورات ٨٠ ، بوفيدون؛ لوريل سلفات الصوديوم.

يحتوي غلاف القرص على: هيبروميلوز، ماركوجول ٨٠٠٠، ثنائي أكسيد التيتانيوم (E17١)، تالك.

الشكل الصيدلاني ومحتوى العبوة

أقراص أتوزيت أقراص مغلفة لونها أبيض مائل إلى أصفر على شكل كبسولة محدبة من الجهتين.

أقراص أتوزيت ١٠/١٠ ملغ: "257" محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت ٢٠/١٠ ملغ: "333" محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت ٤٠/١٠ ملغ: "337" محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت ٨٠/١٠ ملغ: "357" محفورة على جهة واحدة.

أحجام العبوات:

عبوات تحتوي على ١x١٠ و ٣x١٠ أو ٩x١٠ أو ١٠x١٠ قرص مغلف في شرائح مصنوعة من الألومنيوم/الألومنيوم المنظّف بانتروجين (تجوية من OPA-Al-PVC مع غطاء من الألومنيوم).

عبوات فيها شريحة واحدة من ١ x ٣٠ و ١ x ٤٥ قرص مغلف في جرعة واحدة، ضمن شرائح مصنوعة من الألومنيوم/الألومنيوم المنظّف بانتروجين (تجوية من OPA-Al-PVC مع غطاء من الألومنيوم).

من المحتمل ألا تتوفر جميع الأحجام و التركيزات في الأسواق.

الشركة المالكة لحقوق التسويق والشركة الصانعة يتم اصدار التشغيلية من قبل:

الشركة المالكة لحقوق التسويق و المصدرة للتشغيلية:

ميزك شارب أند دوم بي. في.

٣٩ واردةويج

٢٠٢١ بي إن هارليم

هولندا

الشركة المصنعة:

أم إس دي إنترناتيونال جي إم بي آيتش (فِرغ بورترويكو) آل آل سي،

بريدكو اندستريال بارك، ستايت رود ١٨٢،

٠٠٧٧١ لانس بيدرس، بورترويكو

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.

إنّ هذا الدواء

- مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء ومنافعه ومخاطره.
- لا توقف العلاج من تلقاء نفسك.
- لا تكرر وصف الدواء بلا استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.