

موسيجور®

فاتح للشهية مع تأثير إضافي رافع للمزاج

التركيب

المكون الفعال: بيزوتيفين، في شكل هيدروجين ماليتات
الأقراص المغلفة بالسكر تحتوي على ٠.٥ مجم بيزوتيفين
السواغ: سواغ لعلل أقراص وسواغ للتغليف
الشربا يحتوي على ٠.٥ مجم / ١٠ مليلتر بيزوتيفين
السواغ: سوريبيتول، سكاروز ٣٠ جرام / ١٠٠ مليلتر، مواد حافظة E216 و E218، مكسبات نكهة، إيثانول ٢.٤٪، سواغ لإطعام حقم.

الخصائص / الآثار

بيزوتيفين هو مضاد للأمين له تأثير تثبيطي متعدد التكافؤ على الأمينات الحيوية المنشأ مثل السيروتونين، والهستامين، والتريبتامين. وهو يحفز الشهية ويستخدم لزيادة وزن الجسم في المرضى ذوي الوزن المنخفض الذين يعانون من فقدان الشهية. في المرضى المسنين وجد أن بيزوتيفين يزاو أثرًا رافعًا للمزاج بتخفيف أعراض معينة مثل الشعور باليأس أو الاكتئاب أو الغم، والوهن، والتعب، واضطرابات النوم، وضعف التركيز أو ضعف الذاكرة. نظرًا لتأثيره التثبيطي للأمينات الحيوية المنشأ، فمن الممكن أيضًا استعمال أقراص بيزوتيفين للوقاية من الصداع النصفي، حيث أنها تقلل من معدل تكرار النوبات.

الحركت الدوائية

يُمتص بيزوتيفين بسرعة (العمر النصفى ٠.٥ - ٠.٨ ساعة) وبالكامل تقريبًا (٨٠٪). ويبلغ عمره النصفى الأيضي حوالي ساعة واحدة ويبلغ العمر النصفى لإطراح لميتبه الأساسي (ن-جلوكورونيد) حوالي ٢٢ ساعة. وهو يرتبط ببروتينات البلازما بنسبة ٩١٪ وحجم توزيعه الظاهري ٤٨٥ لتر. يتم إخراج أقل من ١٪ من الجرعة في البول في شكل الدواء غير المتغير، بينما يتم إخراج ٥٥٪ في شكل ميتباز. قد يتم تعديل الجرعة في مرضى القصور الكلوي.

دواعي الاستعمال / الاستخدامات الممكنة

فقدان الشهية ذو الأصل الجسماني أو النفسي في المرضى المنخفضي الوزن كمساعد مع العلاج

للحالة المسببة، مثلًا الأمراض المعدية أو الطفيلية (ويشمل ذلك فترة النقاهة)، الإسهال المزمن، فقدان الشهية العصبي، حالات الاكتئاب في المسنين. يجب دائمًا إعطاء الأولوية لتحديد وعلاج الحالة المسببة.

اضطرابات المزاج في المسنين.
في البالغين، يمكن استعمال أقراص موسيجور للوقاية من الصداع الوعائي مثل:
- الصداع النصفي النمطي وغير النمطي؛
- الصداع الوعائي الحركي؛
- الصداع العنقودي (صداع هورتون).
الصداع التوترى والصداع النفسي المنشأ أو التالي للصدمة يستجيب بشكل أقل لموسيجور. لا يفيد موسيجور في تخفيف النوبات الحادة من الصداع النصفي.

جرعة / طريقة الاستعمال

فقدان الشهية في المرضى المنخفضي الوزن
الجرعة الاستمرارية المتوسطة في الأطفال الذين يزيد وزنه عن ٢٥ كجم هي ٢٠ كجم لكل كجم يوميًا. الأطفال الذين يقل وزنه عن ٢٥ كجم فاكتر: قرص واحد مرة واحدة يوميًا
الأطفال الذين يبلغ وزنه ٤٠ كجم فاكتر: قرص واحد مرتين يوميًا
البالغون: ٠.٥ مجم مرة واحدة في البداية، تُزاد تدريجيًا إلى ٠.٥ مجم ثلاث مرات يوميًا (٠.٥ مجم يعادل قرص واحد أو ١٠ مليلتر من الشربا).

اضطرابات المزاج في المسنين

يتم تحديد الجرعة على أساس الاحتياجات الفردية وشدة الأعراض. يوصى بجرعة ابتدائية ٠.٥ مجم / يوم، تُزاد - ويُفضل أن يتم ذلك في شكل زيادات ٠.٥ مجم يوميًا - إلى أن تتحقق الاستجابة المثلى. في معظم المرضى تكون الجرعة اليومية المثلى في حدود ٢-٣ مجم، تعطى في شكل عدة جرعات مقسمة. يمكن تحمل جرعات يومية تصل إلى ١٢ مجم بشكل جيد. عندما تحدث استجابة لدى المريض - عادة خلال ٨-٦ أسابيع - يمكن إجراء محاولة للخفض التدريجي للجرعة أو وقف العلاج.

الوقاية من الصداع الوعائي (العلاج البيني)

البالغون: ٠.٥ مجم / يوم في البداية، تُزاد تدريجيًا الجرعة الاستمرارية المتوسطة هي ١٠٥ مجم / يوم، تعطى في شكل عدة جرعات مقسمة أو في شكل جرعة واحدة في المساء. في الحالات المستعصية يمكن زيادة الجرعة إلى ٣ - ٤.٥ مجم يوميًا تُعطى في شكل ٣ جرعات مقسمة.

القيود على الاستعمال

موانع الاستعمال
فرط الحساسية لبيزوتيفين أو أي من السواغ، لا

يتبعي إعطاء موسيجور للأطفال الذين يقل وزنه عن ٢٠ كجم.

الاحتياطات

نظرًا لإمكانية حدوث أثر مهدئ، فيجب تحذير المرضى من أن موسيجور قد يعوق ردود الأفعال عند قيادة السيارة أو تشغيل الآلات. إلخ.
يحتوي الشربا على ٢.٤٪ حجم كحول، أي أن كل جرعة موصى بها في تعليمات الجرعة تحتوي على ٠.٢ جرام كحول (ما يصل إلى ٠.٢ جرام في الأطفال). وهذه الكمية تمثل مخاطرة ضحلة على المرضى بعرض كبدي، ولدهم إفراط في تناول الكحول. أو سرع، أو تلف دماغي، وفي النساء الحوامل والمرضعات وكذلك في الأطفال إذا تم تجاوز الجرعة الموصى بها للأطفال. قد يحدث انخفاض أو زيادة في مفعول الأدوية الأخرى. على الرغم من أن نشاط موسيجور المضاد للفعل الكلونيبي ضئيل، إلا أنه يجب توخي الحذر في المرضى الذين يعانون من جلوكوما الزاوية الضيقة (ما لم تكن قد عولجت بنجاح باستخدام الجراحة) أو احتباس البول (مثلًا كنتيجة لتضخم البروستاتا).
يؤدي موسيجور إلى زيادة الشهية وقد يسبب اكتساب الوزن. ولكن اكتساب الوزن يعتمد على تناول الكافي للطعام. ويجب التمييز بين فقدان الشهية وبين سوء التغذية.

الحمل / الإرضاع

لم يتم إجراء دراسات مضبوطة على الحيوانات أو النساء الحوامل. لذلك لا ينبغي إعطاء الدواء أثناء الحمل إلا إذا كانت الفائدة المرجوة للمريضة تفوق المخاطرة الممكنة على الجنين.

على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون تركيزات بيزوتيفين التي يتم قياسها في لبن الثدي في الأمهات اللاتي يتلقين موسيجور ذات تأثير على الرضيع، إلا أنه لا يوصى بإعطاء موسيجور للأمهات المرضعات.

التفاعلات المتوقعة

التفاعل المتأخر الأكثر حدوثًا هو التسكين، يليه بشكل أقل تكرارًا الدوار، جفاف الفم، الغثيان، والإمساك. في الأطفال قد تظهر علامات التثبيط المركزي. وردت تقارير قليلة (ضعيفة التوثيق) عن حدوث هالوس في الأطفال والبالغين. ولم يتم إثبات وجود علاقة سببية مع استعمال موسيجور.

التأثيرات

قد يؤدي موسيجور إلى تقوية الآثار المركزية للأدوية المهدئة والنموثة والمضادة للهستامين (وتشمل بعض أدوية السعال والبرد) والكحول.

جَازَاز الجرعة

العلامات والأعراض الممكنة تشمل: الدوار، الغثيان،

انخفاض ضغط الدم، ثقل الرأس، التهيّج (في الأطفال)، صعوبة في التنفس، تشنجات (ولاسيما في الأطفال)، وغيبوبة.

العلاج: يوصى بإعطاء الفحم المنشط: يمكن التفكير في عمل غسيل للمعدة إذا كانت الفترة المنقضية منذ تناول الدواء فترة قصيرة. علاج الأعراض بحسب اللازم، مع مراقبة القلب والتنفس. يمكن إعطاء مركبات البنزوديازيبين للسيطرة على التهيّج أو التشنجات.

معلومات أخرى

يُحفظ موسيجور بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

العمر الرفي

لا يُستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP=) المطبوع على العبوة.
الأقراص المغلفة بالسكر: تُحفظ بعيداً عن الضوء.

الصانع

انظر العبوة الخارجية.

آخر مراجعة للمعلومات:

سبتمبر ١٩٩٨

تاريخ الموافقة (النص):

١٦ نوفمبر ١٩٩٨

(٥) = علامة تجارية مسجلة

نوفارتس فارما شركة مساهمة، بازل، سويسرا

هذا دواء

- الدواء - مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرض للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء ويتفهمه وضروه.
- لا تتلعث من تلقاء نفسك مدة العلاج المحددة لك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

تُحفظ الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال