

# سيازمو- كانيلولاز®

توليفة مضادة للتقلصات

التركيب

يحتوي الفرقس ذو الطبقتين:

المواد الفعالة:

الكتلة المركبة: سيلولوز .٩ وحدة FIP، مسحوق بنكرياتين مكافئ أميلاز .٢٠ وحدة أوروبية، لياز .٢٠ وحدة أوروبية، بروتياز .٨٠ وحدة أوروبية؛ داميتكون .٢٠ ملغم؛ هيدروكلورات الصوديوم .٢٠ ملغم.

الطبقة الخارجية: هيدروكلوريد ميتكيسين .١ ملغم؛ مسحوق بيسين .١٢٠ وحدة أوروبية؛ داميتكون .٢٠ ملغم؛ هيدروكلوريد حمض غلوتاميك .١٠٠ ملغم؛ سواغ.

سواغ: مادة ملونة #١٧٧

الخصائص/تأثيرات

تحتوي الطبقة الخارجية من الفرقس هيدروكلوريد ميتكيسين، وهو مادة تخلقية تجعل مفعول جار الصعب السماحي وتبطئ شدة الحركة المعدية المعموية؛ وهيدروكلوريد حمض الغلوتاميك الذي يطلق حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وبالتالي هو الأنزيم الرئيسي لحل الريوتين في العصارة المعدية، وتحتوي الكتلة المركبة للفرقس المواد الأخرى التالية: هيدروكلورات الصوديوم التي تنشط إفراز الصفراء؛ والبنكرياتين الذي يحتوي أنيزمات هضم البروتينات والكريوهيدرات والدهون؛ وأنزيم السيلولوز الذي يحل السيليلوز، ويقاوم التخمر الكبيري وتكوين الغازات في الأمعاء.

ويحتوي كل من الطبقة الخارجية والكتلة المركبة من الفرقس داميتكون، وهو مادة نشطة السطح ذات تأثير قوي مضاد للرغوة تمنع الافتتاح.

حراثك الدواء

تكون أعراض سيازمو- كانيلولاز الثانية الطبقات من طبقة خارجية تتlob بسرعة وكتلة مرارية تقوم العصارة المعدية (أنظر التركيب). وبفضل هذا الأسلوب، تحدث مختلف المكونات تأثيرها العلاجي الكامل في المكان المطلوب بالضبط في القناة الهضمية حيث يمكن تأثيرها ضروريًا.

الميتكيسين: هيدروكلوريد الميتكيسين يمتص بالكامل تقريبًا من القناة المعدانية السطحية، وتصلك ذروة التأثير في البلازما بعد ٤-٦ ساعات.

ويسقبل الميتكيسين بسرعة وبالكامل، وهو يخرج عن طريق البراز بشكل خاص (نحو .٨٠٪)، وتخرج نسبة قليلة منه (.٢٪/تقريباً) في البول، بصورة رئيسية في شكل ترات وكميات، وكبيرات ثانية للميلين، ومشتقات فيتولية. ولم تكتشف أي نواتج انتقالات أكثر سمية أو نشاطًا من الناتجة الدوائية من الميتكيسين نفسه، ونصف عمر في البلازما ٦-٤ ساعات، ويتم الإخراج بنسبة .٧٠-٥٥٪ خلال ٤ ساعات.

دوعي الاستعمال/طريقة الاستعمال

حالات تهيج القولون المصحوبة بانتفاخ، وإحساس بألم دماغي، وألم يعلق منتشر شبيه بالملgesch.

الانتفاخ المصاحب لنقص الأنزيمات وبطء الهواء بسبب التخمر أو التufen.

عسر الهضم نتيجة لاضطرابات الصفراء والأضطرابات الهضمية العصبية المنشطة.

الجرعات/إرشادات الاستعمال

يبلغ قرص واحد كاملاً قبل كلأكلة. في حالة الألم البطيء الحاد يؤخذ فرقان معاً.

قيود الاستعمال

نواهي الاستعمال

فقط الحساسية لأي من المكونات.

(كما هو الحال في جميع مضادات إفراز الكوليدين): الغلوكوما الضيقية الزاوية. تضخم البروستاتا المصحوب باضطرابات البول، استرخاء الأمعاء، شدة ضعف العضلات. انسداد القناة الصفراوية (مرض الصفراء، الإنسدادي)، الإلتهاب الكبدي الحاد، والاضطرابات الكبدية الوظيفية الأخرى، التجمع الصيادي في الحوصلة الصفراوية، الغيبوبة الكبدية.

احتياطات  
ليست هناك احتياطات معينة مطلوبة في حالة الاستعمال وفقاً للإرشادات.

الحمل، الإرضاع الطبيعي  
لم تجر دراسات محكومة في الحيوانات أو الحوامـل. وبالتالي، يجب ألا يستعمل الدواء إلا إذا كانت الفائدة المـتحـمـلـة أكبر من الخطـرـ المـتحـمـلـ على الجنـين. وغير معـرـوفـ إذا كان الدـوـاءـ يـتـقـنـقـلـ إلىـ لـبـنـ الأمـ.

الأثار الجانبية غير المرغوبـةـ  
قد تسبـبـ مضـادـاتـ إـفـارـازـ الكـولـينـ بـالـجـرـعـاتـ العـلـاجـيـةـ آـثـارـ جـانـبـيـةـ لدىـ بعضـ الأـشـخـاصـ؛ـ وـهـذـهـ التـائـيرـاتـ مـعـرـوـفـةـ جـيـداـ وـتـشـمـلـ صـوـرـةـ رـئـيـسـيةـ جـفـافـ الفـقـ،ـ اـهـتـيـاسـ الـبـولـ،ـ اـضـطـرـابـاتـ بـصـرـيـةـ،ـ سـرـعةـ ضـرـيـاتـ القـلـبـ،ـ خـفـقـانـ القـلـبـ،ـ اـتسـاعـ الـحـدـقـةـ وـاضـطـرـابـاتـ التـكـيـفـ البـصـرـيـ.

التفاعـلاتـ معـ الأـدوـيـةـ الآـخـرـةـ  
لمـ تـسـجـلـ حتـىـ الآـنـ أيـ تـقـاعـلـاتـ معـ الأـدوـيـةـ الآـخـرـةـ.

فرطـ الجـرـعـةـ

تحـدـيـدـ الجـرـعـاتـ الرـائـدـةـ تـقـاعـلـاتـ سـمـيـةـ منـ التـوـزعـ الـأـتـرـوـبـيـيـ.ـ وـلـوـحظـ

أـيـضاـ زـيـادـةـ الـحـرـكةـ الـمـعـوـيـةـ وـالـأـخـرـاجـ.ـ وـتـرـوـلـ هـذـهـ الـأـعـرـاضـ بـعـدـ وـقـفـ العـلاـجـ.

مـلاحظـاتـ آـخـرـىـ

مـلـوحـةـ  
الـرـائـحةـ الـطـبـيـعـيـةـ نـسـبـيـاـ الـتـيـ تـصـفـ بـهـاـ الـأـقـرـاصـ طـبـيـعـيـةـ؛ـ وـمـنـشـؤـهاـ الـأـنـزـيمـاتـ

الـطـبـيـعـيـةـ الـتـيـ يـحـتـويـهـاـ الدـوـاءـ.

يـتـبـعـ حـفـظـ سـيـازـموـ كـانـيلـولـازـ،ـ شـائـعـ شـائـعـ جـمـيعـ الـأـدـوـيـةـ،ـ بـعـدـ عـنـ مـتـاـولـ الـأـطـفـالـ.

الـتـخـرـينـ

لاـ يـسـتـعـمـلـ الدـوـاءـ بـعـدـ اـنـقـضـاءـ تـارـيـخـ الصـالـحـيـةـ الـمـبـيـنـ عـلـىـ الـعـلـبـ EXPـ.

يـخـرـنـ دونـ ٥٥ـ سـ.ـ يـحـفـظـ بـعـدـاـ عـنـ الـرـطـوبـةـ وـالـضـوءـ.

الـعـوـاتـ

عـبـوةـ بـهـاـ ٢٠ـ قـرـصـاـ ذـاـ طـبـقـيـنـ.

نوـفـارـاتـ كـونـسـيـوـمـ هـيـلـثـ شـمـ

نيـونـ سـوـيـساـ

تـارـيـخـ تـحـديـدـ الـمـعـلـومـاتـ:ـ أـبـرـيلـ/ـنـيـسانـ ١٩٩٤

(إنـ هـذـاـ دـوـاءـ)

ـ الدـوـاءـ مـسـتـحـضـ يـثـرـ عـلـىـ صـحـيـثـ وـاسـتـهـلاـكـ خـلـالـاـ لـتـعـليمـاتـ بـعـضـ لـلـخـطـرـ  
ـ اـتـيـ بـدـقـةـ وـصـفـةـ الـطـبـيـبـ وـطـرـيـقـ الـاسـتـعـمـالـ وـطـرـيـقـ الـصـيـدـلـاـيـ  
ـ الـذـيـ صـفـهـ لـكـ.ـ  
ـ فـالـطـبـيـبـ وـالـصـيـدـلـاـيـ هـمـ الـخـيـرـانـ بـالـدـوـاءـ وـبـعـدـهـ وـضـرـرـهـ.  
ـ لـ تـقـلـعـ مـدـدـةـ الـعـلاـجـ اـخـدـدـةـ لـكـ مـنـ تـاقـةـ نـفـسـكـ.  
ـ لـ تـكـرـرـ صـرـفـ الـدـوـاءـ بـدـونـ وـصـفـةـ طـبـيـةـ.

لاـ تـكـرـرـ الـأـدـوـيـةـ فيـ مـتـاـولـ أـيـدـيـ الـأـطـفـالـ

عـلـىـ وـزـاءـ الـصـحـةـ الـعـربـ

وـأـخـادـ الـصـيـادـلـاـنـ الـعـربـ

(THIS IS A MEDICAMENT)

a. Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

b. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use, and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

c. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.

d. Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.

e. Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

**Keep medicament out of reach of children**

Council of Arab Health Ministers  
Union of Arab Pharmacists