

المسازال

أوميرازول صوديوم مسحوق معقم مجفف بالتجميد محلول للحقن في الوريد أو لرئي الوريدي التركيب

تحتوي كل عبوة على:

المادة الفعالة: أوميرازول الصوديوم (مجفف بالتجميد) بما يعادل أوميرازول ٤٠ ملغم.

المواء: ثاني إيدنات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم.

الخواص

يعتبر المسازال النمط الحالي لعلاج قرحة الجهاز الهضمي والحالات المصاحبة لها بحيث يتم بواسطته التحكم في تثبيط إفراز حامض المعدة بغض النظر عن المحفز لزيادة إفراز هذا الحامض. يعمل المسازال على التثبيط النوعي للنظام الإنزيمي الدينوسين ثلاثي الفوسفات الهيدروجيني- البوتاسي (مضخة البروتون) وذلك عند مستوى سطح الإفراز في الخلايا الجدارية المبطنة للمعدة. بما أن هذا المفعول يثبط المرحلة النهائية لتكوين الحامض المعدني، فإن المسازال يعمل بفعالية على تثبيط إفراز هذا الحامض سواء كان هذا الإفراز أساسياً أو ناتجاً عن التحفيز.

يعتبر المسازال أيضاً بفعاليته كمضاد للبكتيريا ضد البكتيريا المعروفة باسم هيليوباكتر باليوري حيث يعمل كمثبط إنفاثي لإزيم البيريز الذي تنتجه هذه البكتيريا والضروري لتكوين مستعمراتها في المعدة. ليس لمستحضر المسازال أي تأثير على مستقبلات الأستيل كولين أو المستامين.

يتشر أوميرازول بسرعة بعد الإعطاء عن طريق الوريد إلى خارج الأوعية الدموية. إن حجم انتشار أوميرازول قد ينخفض قليلاً لدى كبار السن والمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد، بينما لا يتغير حجم انتشاره بدرجة ملحوظة في حالة المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى. إن عمر النصف لطرح أوميرازول قصير ويتراوح بين ٢/١ -٣ ساعات، إلا أن مدة فاعليته المتضمنة تثبيط إفراز حامض المعدة تكون أطول مما يسمح بتناوله كجرعة يومية واحدة. يرتبط أوميرازول بنسبة عالية ببروتين البلازمما (حوالى ٩٥%). يؤيذ أوميرازول بشكل كامل تقريرها في الكبد عن طريق إزيم سيلوكروم ب٤٥٠. يتم طرح ٨٠٪ من الجرعة المعطاة عن طريق البول على شكل نواتج أيضاً أما الباقى فيطرح عن طريق البراز والذي ينشأ أصلاً من إفرازات المرارة.

دواعي الاستعمال

تستعمل عبوات المسازال كبديل للعلاج الفموي للمرضى الذين لا يستطيعون تناول الأوميرازول عن طريق الفم. يعطي المسازال لعلاج الحالات التالية:

-دخول حامض المعدة في الجهاز التنفسi: للوقاية من خطر دخول حامض المعدة في الجهاز التنفسi أثناء التخدير العام (ويتم ذلك من خلال تقليله لإفراز حامض المعدة).

-قرحة الجهاز الهضمي: علاج القرحة الحميدة للمعدة والإثنى عشرى.

-الارتئاد المعدى المريضي.

-متلازمة زولينجر إيسون: علاج حالة زيادة إفراز الحامض المعدى المرضية المرتبطة بمتلازمة زولينجر إيسون (بضمها الحالات التي لم تستجب لأنواع العلاج الأخرى).

الجرعة

-لتقليل إفراز الحامض المعدى أثناء التخدير العام (للوقاية من خطر دخول حامض المعدة في الجهاز التنفسi): ٤٠ ملغم على أن يتم إعطائها كاملة قبل ساعة واحدة من إجراء العملية الجراحية.

-قرحة المعدة الحميدة، قرحة الإثنى عشرى وارتئاد المعدى المريضي: ٤ ملغم مرة واحدة يومياً حتى يصبح بإمكان المريض تناول الدواء مجدداً عن طريق الفم.

-متلازمة زولينجر إيسون: ٦٠ ملغم مرة واحدة يومياً.

قد يتطلب الأمر أحياناً إعطاء جرعات يومية عالية، عندها، يتم تنظيم الجرعة وفقاً لحالة كل مريض.

إن الجرعة اليومية التي تزيد عن ٦٠ ملغم يجب تقسيمها وإعطائها على جرعتين يومياً.

التحضير والإعطاء

الحقن: يحضر محلول الحقن في الوريد عبر إضافة ١٠ ملليلترماء للحقن في عبوة المسحوق المجفف بالتجميد. يعطى محلول المحضر عن طريق الحقن البطيء في الوريد على مدى فترة تتراوح بين الدقيقتين والخمسة دقائق مع سرعة قصوى ٤ مل/دقيقة.

بعد التحضير، يجب استخدام محلول على الفور.

الريء الوريدي: يحضر محلول الوريدي عن طريق حقن ١٠ ملليلتر من محلول كلورايد الصوديوم ٩٠٪ في عبوة المسحوق المجفف بالتجميد. يعطى محلول المحضر عن طريق الريء بعد تخفيف التركيز في ١٠٠ ملليلتر من محلول الملح ٩٪ أو محلول الغلوکوز ٥٪.

بعد التحضير، يجب استخدام محلول على الفور.

نوادي الاستعمال

يجب عدم استعمال المسازال من قبل المرضى ذوي الحساسية المفرطة للأوميرازول.

لا يجب إعطاء الأثارنافير (يرجى مراجعة التفاعلات الدوائية).

كما هو الحال مع مثبطات مضخة البروتون الأخرى، فإنه يفضلتجنب استخدام أوميرازول خلال فترة الحمل والرضاعة (ما لم يعد ذلك ضرورياً) إلى حين توفر المزيد من الدراسات والبحوث حول ذلك.

الاحتياطات

كقاعدة عامة عند علاج قرحة المعدة، يجب التأكد من عدم وجود أورام خبيثة بالمعدة قبل بدء العلاج بأوميرازول، إذ قد يخفى أوميرازول أعراض سرطان المعدة. يوصى بتوفير العناية الخاصة للمرضى الذين قد يشكون من تغير أعراض قرحة المعدة وكذلك للذين تزيد أعمارهم عن ٤٥ سنة.

تصور وظائف الكبد: يؤيذ أوميرازول إلى درجة كبيرة في الكبد وينتاج عن ذلك زيادة عمر النصف لدى المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد، لذا يوصى بالحذر عند إعطاء أوميرازول لهؤلاء المرضى، كما يجب لا تتجاوز الجرعة الموصوفة ٢٠ ملغم في اليوم.

تصور وظائف الكلى: لا يستوجب الأمر إجراء أي تعديل على الجرعة في حالة المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى.

كبار السن: لا يستوجب الأمر إجراء أي تعديل على الجرعة في حالة المرضى كبار السن.

الأطفال: لا يوصى باستخدام أوميرازول للأطفال وذلك لقلة تتوفر التجارب والمعلومات عن مدى أمان استخدامه لدى الأطفال.

التآثرات الجانبية

إن أوميرازول جيد التحمل عادة، وتعد التآثرات الجانبية التي تم تسجيلها غابرة وتزول بمجرد إيقاف الدواء.

إن التآثرات الجانبية المذكورة أدناه والمصنفة وفقاً لأجهزة الجسم تم تسجيلها عند استعمال أوميرازول والتي غالباً ما تعد مصادقة للتآثرات الجانبية الناتجة عن استعمال أي من الأدوية المثبتة لمضخة البروتون، وهي:

الجهاز العصبي: صداع، دوخة، نوار، عدم وضوح الرؤية، ضعف في البصر (عند استعمال جرعات كبيرة)، اضطرابات في التذوق، أرق، نعس، اكتئاب وخرد. لقد سجل أحياناً حدوث حالات من الارتباك المنعكش إضافة إلى تهيج ولهوسة لدى المرضى شديد الاعلال.

الجهاز الهضمي: جفاف الفم، التهاب الفم، غثيان، قيء، انتفاخ، ألم في البطن، إسهال وأمساك.

كما هو الحال مع بقية الأدوية الأخرى المثبتة لمضخة البروتون، فإن أوميرازول يقلل من درجة حموضة المعدة وبالتالي فهو قد يزيد من خطر حدوث عدوى في الجهاز الهضمي.

الكبد: قد تحدث نذراً اضطرابات غابرة في إنزيمات الكبد، ولقد سجل في حالات قليلة حدوث خلل في وظائف الكبد، التهاب الكبد مع أو بدون حدوث يرقة واعتلال دماغي لدى المرضى المصابة بمرض شديد في الكبد.

الكلى: التهاب الكلية الخلالي.

العظام والعضلات: وهن وآلم في العضلات والمفاصل، كسر في الوركين، المعصمين أو العمود الفقري.

الجلد: لقد سجل في حالات قليلة حدوث حكة، تحسس للحناء، الحمامي المشكلة، تساقط الشعر (الصلع)، طفح فقاعي، متلازمة ستيفنس - جونسون، تسمم البشرة التخري.

نفاعلات الحساسية: طفح جلدي، شرى، وذمة وعائية ونفاس الشعب الهوائية.

ذخوصات الدم: نقص الكريات الدموية المحببة، نقص الكريات الدموية البيضاء، نقص الخلايا الدموية ونقص الصفات الدموية.

تأثيرات أخرى: حمى، تعرق، انخفاض نسبة الصوديوم والمغنيسيوم في الدم، وذمة طرفية، وقد يحدث عند الذكور تضخم الثدي ونادرأ خلل الانصباب.

الجرعة الزائدة

لم يسجل حدوث آية تآثرات جانبية متعلقة بزيادة الجرعة حتى بعد إعطاء أوميرازول عن طريق الوريد بجرعات تصل إلى ٢٧٠ ملغم في اليوم أو ٦٥٠ ملغم على مدى ٣ أيام.

الجرعة الزائدة

التفاعلات الدوائية

قد يسبب أوميپرازول انخفاضاً في الأيض الكبدي لكل من وارفرين، ديازيبام، فينیتوین وبعض الأدوية التي تؤخذ بواسطة إنزيم سايتوكروم ب ٤٥٠ ولذلك فلنتناول هذه الأدوية بالتزامن مع أوميپرازول قد يؤدي إلى تأخير طرحها وزيادة تركيزها في الدم وبالتالي زيادة في تأثيراتها. يوصى بمراقبة تركيز هذه الأدوية في الدم أو بمراقبة زمن البروثرميدين للوارفرين وذلك لحساب مقدار الجرعة تتبعاً لذلك لأن تعديل الجرعة لهذه الأدوية قد يكون ضرورياً خلال فترة العلاج بأوميپرازول وكذلك بعد إيقافه.

قد ينخفض امتصاص كلاً من كيتوكونازول واتراكونازول عند تناولهما بالتزامن مع أوميپرازول. قد يزداد تركيز كلاً من ديجوكسين وتاكروليموس في الدم عند تزامن تناولهما مع أوميپرازول.

محتوى العلبة

السازال مسحوق معقم مجفف بالتجميد محلول للحقن في الوريد أو للري الوريدي متوفّر في علبة تحتوي على عبوة واحدة أو ١٠ عبوات سعة ٤٠ ملغم أوميپرازول.

شروط التخزين

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدي ٢٥°م، بعيداً عن الضوء.

أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل، جدرا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء منحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبران بالدواء وبفعله وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.