

Novartis

Novartis

## زاديتين أقراص

## زاديتين كبسولات

## زاديتين ٢,١ مجم / مليلتر شراب (بنكهة الموز)

## زاديتين ٢,٢ مجم / مليلتر شراب (بنكهة الفراولة)

## زاديتين إس آر أو أقراص مغلفة

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

- التهاب الجدي المتحد.

قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يحقق زاديتين أثره العلاجي الكامل.
زاديتين ليس بديلاً للعلاج بالكورتيكوستيرويد (المستنشق أو الجهازى) عندما يوصى باستعمال الكورتيكوستيرويد لعلاج الربو.

##### الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة اليومية المعتادة هي ٢ مجم؛ يجب أن تؤخذ مع الوجبات سواء قرص واحد أو كبسولة واحدة ١ مجم مرتين يوميا (في الصباح والمساء).
أو قرص واحد إس آر أو واحد ٢ مجم مرة واحدة يوميا (في المساء).
في المرضى الذين لديهم قابلية للتسكين، يوصى باتباع نظام تدريجي خلال الأسبوع الأول من العلاج.
يبدأ هذا النظام بنصف قرص قياسي مرتين يوميا أو قرص واحد قياسي أو كبسولة واحدة في المساء، فقط، وتزاد الجرعة حتى يتم الوصول إلى الجرعة العلاجية المناسبة على مدى الـ ٥ أيام التالية.
إذا لزم الأمر، يمكن زيادة الجرعة اليومية حتى ٤ مجم، أي قرصين قياسيين أو كبسولتين مرتين يوميا أو قرصين إس آر أو مرة واحدة يوميا في المساء.
يجب توقع بدء المفعول بشكل أسرع مع الجرعة الأعلى.

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

قد يخفف زاديتين من عبء الاختلاج، ولذلك يحظر استخدامه في المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بالصرع (انظر **موانع الاستعمال**).

لا توجد بيانات كافية عن الاستعمال طويل الأجل ( ≥ ٤ أسابيع) في المرضى المصابين بارتيكارييا مزمنة مجهولة المنشأ.
عند بدء العلاج طويل الأجل زاديتين لا ينبغي أن يوقف بشكل فجائي أي علاج بالكورتيكوستيرويد جاري استخدامه بالفعل.
ينطبق ذلك الأمر بصفة خاصة على الكورتيكوستيرويدات الجهازية والهرمونات الموجبة لقشرة الكظر ACTH.
نظراً لمخاطرة حدوث قصور كظري في المرضى العنتمدين على الستيرويد.
في مثل هذه الحالات، قد يستغرق الأمر مدة تصل إلى عام كامل لاسترداد الاستجابة التخفيمية-الكظرية الطبيعية تجاه الإجهاد.
يجب إعطاء أدوية معينة مضادة للعدوى بالإضافة إلى زاديتين لمكافحة أي عدوى عارضه.
في مرضى السكر، يجب أن يوضع في الاعتبار محتوى الكربوهيدرات في الشراب (٥ ملليلتر= ٣ جرام كربوهيدرات).

تحتوي أقراص زاديتين على لاكتوز.
المرضى الذين لديهم مشاكل وراثية نادرة بشأن عدم تحلل اللاكتوز، أو نقص الشدي في اللاكتيز أو سوء امتصاص الجلوكوز- الجالاكتوز يجب ألا يستعملوا أقراص زاديتين أو أقراص زاديتين إس آر.

يحتوي الشراب على مالتيتول سائل.
المرضى الذين لديهم مشاكل وراثية نادرة بشأن عدم تحلل الفركتوز، يجب ألا يستعملوا زاديتين شراب.

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

كيتوتيفين هو دواء مضاد للآرجية له خواص غير تنافسية حاصرة للهستامين (H١).

##### الحركات الدوائية

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

يُمنَح كيتوتيفين بالكامل تقريباََ عقب الاستخدام عن طريق الفم.
يبلغ التوافر البيولوجي ما يقرب من ٥٠٪ بسبب أثر المرور الأول بنسبة ٥٠٪ تقريبا في الكبد.
يتم بلوغ تركيزات الذروة في البلازما خلال ٤-٢ ساعات.

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

يُمنَح كيتوتيفين بالكامل تقريباََ عقب الاستخدام عن طريق الفم.
يبلغ التوافر البيولوجي ما يقرب من ٥٠٪ بسبب أثر المرور الأول بنسبة ٥٠٪ تقريبا في الكبد.
يتم بلوغ تركيزات الذروة في البلازما خلال ٤-٢ ساعات.

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis