

کودیو فان

ما هو عقار كوديوفان؟ وفمَ يُستخدم؟  
يحتوي عقار كوديوفان على مادتين فعاليتين مُكملتين لبعضهما، تعملان على الجهاز الذي يُنظم ضغط الدُّم في الجسم، وهما: فالساراتان، الذي يعمل بشكل أساسي على توسيع الأوعية الدموية، مما يخفض ضغط الدُّم، وهيدرووكوروثيازيد، الذي يعمل على تقليل كمية كولرید الموميديوم والماء بالجسم عن طريق زيادة ناتج البول.  
يُستخدم عقار كوديوفان لعلاج ارتفاع ضغط الدُّم الطفيف والمعتدل لدى المرضى الذين يتطلب ضغط الدُّم المرتفع لديهم تلقى عقار مركب.

طبيبك أن يرى ويتحقق من تأثير هذا  
من خلال قياس ضغط الدم.  
استخدام عقار كوديوفان إلا إذا قام طبيبك  
بإضافة يتوجب أن تكون على دراية بها  
بـ علاج ارتفاع ضغط الدم؟  
الحال ارتفاع ضغط الدم، فمن الممكن أن  
ضرر بالأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى  
ربما تشعر بأنك على ما يرام ولا تشكو من  
اض، إلا أن ارتفاع ضغط الدم غير المُعالجة قد  
في حدوث آثار على المدى الطويل مثل:  
ـ العدمة الدماغية أو التوبة القلبية أو فشل القلب  
ـ ربابات وظائف الكلى أو فقدان البصر.

**ل عقار كوديوفان**

ول عقار كوديوفان إذا كنت قد عانيت  
ـ كل من إحدى تفاعلات الحساسية (فرط  
ـ (الية) تجاه فالساراتان أو هيدروكلوروثيازيد أو  
ـ ي مُكون آخر بهذا الدواء، لا تتناول عقار  
ـ سان إذا كنت حاملاً أو تخطط للحمل أو  
ـ مرضعاً، وإذا كنت تعاني من تليّف القنوات  
ـ (تلف القنوات الصفراوية الصغيرة الموجودة  
ـ (د) مما يؤدي إلى حدوث انخفاض في تدفق  
ـ (ء) (ركود صفراوي)، أو إذا كنت مصاباً بمرض  
ـ (ي من النوع 1 أو 2) أو تعاني من قصور  
ـ بـ الكل وتناول أليسكيرين لخفض شديد في كمية  
ـ ديك، أو إذا حدث انخفاض شديد في كمية  
ـ التي يتتبّعها جسمك (انقطاع البول). إذا  
ـ عاني من الوذمة الوراثية. لا تتناول  
ـ كوديوفان إذا كنت قد عانيت من قبل

الميلانيتي)، وربما يكون ذلك بس حساسية الجلد تجاه الأشعة فوق ال احرص على حماية جلدك من أشعه الأشعة فوق البنفسجية أثناء الع الع كوديوفان. كما يجب عليك فحص شكل منتظم تجاه طروره تغيراً عليه وإخبار طبيبك فوراً إذا لاحظت مشتبه بها على الجلد.

التدخلات مع الأدوية الأخرى عند استخدام عقار كوديوفان مع أدوي قد تحدث تداخلات دوائية (تعزز أو تأثير عقار كوديوفان أو الأدواء الآخر أو زرع الجنينية). يشمل ذلك الآتي: الأدوية التي على البوتاسيوم أو بداخل الملح التي تخفيف على البوتاسيوم أو الأدوية الأخرى التي قد زيادة في كمية البوتاسيوم بالدم (على س الهيازيرين الذي يستخدم لتحسين سوية يقوم طبيبك بفحص كمية البوتاسيوم الدم بشكل دوري)، الأدوية التي تستثنه الانهاب أو الألم (الأدوية المضادة للالتهاب الستيرويدية، بما في ذلك مثبطات أنزيم الحلقية-2)، الليتيوم (دواء يستخدم لع الأمراض النفسية)، مُدررات البول (أدوية ناتج البول)، مثبطات أنزيم تحويل الأدرينالين أو أليسكرين، الأدوية الشبيهة بالستيرويدات، الأدوية المضادة لـ النظم القلبي (تُستخدم لعلاج اضطراب القلب)، بعض الأدوية التي تُستخد العدوى (أفيتوبريسين، البيبسيلين جي) سرطان الجلد والشفتين.

الدموية للعين (الانصباب المشيمي) أو ارتفاع الضغط داخل العين. من الممكن حدوث ذلك في غضون بضع ساعات أو أسبوعين من تناول مقا ع كوديوفان وقد يؤدي إلى فقدان البصر الدائم إذا لم يتم بدء العلاج في الموعد المناسب. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البنسلين أو السلفوناميد، فقد يزداد خطر التعرض للإصابة بالانصباب المشيمي. كما يمكن توخي الحذر مطلقاً إذا كنت تعاني من فشل القلب أو كنت قد عانيت من نوبة قلبية. اتبع تعليمات طبيبك بعناية فيما يخص جرعة البداء. قد يجري طبيبك أيضاً فحصاً لوظائف الكلى لديك.

آخر طبيبك قبل أن تبدأ العلاج باستخدام عقار كوديوفان في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من اضطراب بالكلى أو الكبد، أو بة أو ربو.
- إذا كنت تعاني من توسم الوجه أو العينين أو الشفتين أو على حدوث وذمة وعائية) كوديوفان. في هذه الحالات للمراقبة وربما تحتاج إلى انتظاراً لذلك.
- إذا كنت تعاني من قرط حمض الاليوريك بالدم أو من القرص أو السكري.
- إذا كنت تعاني أو عانيت من انخفاض مستويات البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم أو ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.
- إذا كنت قد أصبحت من قبل بسرطان الجلد أو إذا لاحظت حدوث تغيراً مفاجئ في الجلد أثناء العلاج. قد يؤدي العلاج بهيدروكلوروثيازيد (أحد المادتين الفاعلتين بعقار كوديوفان)، لا سيما في حالة الاستخدام لفترة طويلة وبجرعة مرتفعة، إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد والشفتين (سرطان الجلد غير شفين أو اللسان أو الحلق التنفس) عند تناول دواء