

# فينلاكس® إكس آر فينلافاكسين

في ظل عدم توفر معلومات كافية حول استخدام فينلاكس إكس آر لدى المرأة الحامل، يُستحسن عدم استخدامه خلال فترة الحمل إلا في حال كانت حاجة الأم لهذا الدواء تضاهي الخطر الذي قد يسببه للجنين. يُفَرِّز فينلاكس إكس آر في حليب الأم لذلك يُنصَح بتجنب الرضاعة خلال فترة العلاج.

## ما هي جرعة فينلاكس إكس آر المعتمدة؟

تبلغ جرعة فينلاكس إكس آر في بداية العلاج ٧٥ ملغ مرة يومياً تؤخذ مع الطعام (قد يستأنف البعض العلاج بجرعة ٣٧,٥ ملغ خلال الأيام الأربعة إلى السبعة الأولى).

يمكن زيادة الجرعة تدريجياً إلى جرعة قصوى تبلغ ٢٢٥ ملغ يومياً. إن جرعة فينلاكس إكس آر تتحدد لكل مريض وفقاً لحالته واستجابته للعلاج.

## كيف تتناول فينلاكس إكس آر؟

تناول فينلاكس إكس آر مرة واحدة في الوقت نفسه من كل يوم إما في الصباح أو في المساء. ابتلع الكبسولة كاملة مع الماء. لا تشطرها ولا تهرسها ولا تمضغها. يُستحسن تناول فينلاكس إكس آر مع الطعام وذلك للتقليل من إمكانية حصول اضطرابات في الجهاز الهضمي.

## مدة العلاج

في حال استخدام فينلاكس إكس آر على المدى الطويل لأي من المؤشرات العلاجية، يتوجب الإبقاء على الجرعة الأدنى التي تحقق المفعول العلاجي. كما وأنه من الضروري أن يقيم الطبيب وبشكل دوري الحاجة إلى الاستمرار بالعلاج.

## ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

استشر الطبيب في حال شككت أنك تناولت جرعة مفرطة. تتضمن الأعراض الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من فينلاكس إكس آر ما يلي:  
الشعور بالغثاس، النوار، تسارع أو تباطؤ في دقات القلب، انخفاض في ضغط الدم، نوبات، وغيبوبة.

## ما العمل عند نسييت موعد إحدى الجرعات؟

تناول الجرعة التي فوتها حالما تدرِك أنك نسييتها. في حال تذكرت ذلك في وقت قريب من موعد الجرعة التالية، أهمل الجرعة التي فوتها واستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

## شروط الحفظ

يُحفظ فينلاكس إكس آر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية.

يُحفظ في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

لا تتناول هذا الدواء بعد انقضاء مدة الفعالية المذكورة على العبوة الخارجية.

## تاريخ المراجعة: كانون الثاني ٢٠١٩.

## الأشكال والعبوات

فينلاكس إكس آر ٣٧,٥: كبسولات ممتدة المفعول: ٢٠ أو ٣٠ كبسولة في العبوة.

فينلاكس إكس آر ٧٥: كبسولات ممتدة المفعول: ٢٠ أو ٣٠ كبسولة في العبوة.

فينلاكس إكس آر ١٥٠: كبسولات ممتدة المفعول: ٢٠ أو ٣٠ كبسولة في العبوة.

## التركيب

فينلاكس إكس آر ٣٧,٥: تحتوي كل كبسولة ممتدة المفعول على فينلافاكسين هايدروكلورايد مما يوازي ٣٧,٥ ملغ من العامل الفعال فينلافاكسين.

فينلاكس إكس آر ٧٥: تحتوي كل كبسولة ممتدة المفعول على فينلافاكسين هايدروكلورايد مما يوازي ٧٥ ملغ من العامل الفعال فينلافاكسين.

فينلاكس إكس آر ١٥٠: تحتوي كل كبسولة ممتدة المفعول على فينلافاكسين هايدروكلورايد مما يوازي ١٥٠ ملغ من العامل الفعال فينلافاكسين.

المواد غير الفعالة: مانيتول، سكروز، نشاء، إيثيل السلولوز، هيدروكسي بروبيل ميثيل سلولوز، جيلاتين، ثاني أكسيد التيتانيوم (فينلاكس إكس آر ٣٧,٥، فينلاكس إكس آر ٧٥)، أصفر الكينولين (فينلاكس إكس آر ٧٥، فينلاكس إكس آر ١٥٠)، أصفر غروب الشمس (فينلاكس إكس آر ٣٧,٥، فينلاكس إكس آر ٧٥)، أزرق لامع (فينلاكس إكس آر ١٥٠).

## لماذا يجب أن تتناول فينلاكس إكس آر؟

الغثة العلاجية: مؤثر نفسي.

الرمز الكيميائي العلاجي التشريحي (ATC): N06AX16.

يُستخدم فينلاكس إكس آر للحالات التالية:

- علاج اضطراب الإكتئاب الرئيسي (حالة الإكتئاب الحاد، وحالة الإكتئاب المنكسر أو المزمن)

- اضطراب القلق العام أو اضطراب القلق الإجتماعي

- اضطراب الهلع

في أي حالات لا يجب أن تتناول فينلاكس إكس آر؟

لا تتناول فينلاكس إكس آر في حال كنت تعاني من تفاعلات تحسسية للفينلافاكسين هايدروكلورايد أو لأي من المواد غير الفعالة.

## الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول فينلاكس إكس آر

- من الضروري إجراء فحوصات طبية دورية في حال استخدام هذا الدواء على المدى الطويل.

- تجنب تناول المشروبات الكحولية أو أي من الأدوية المثبطة للجهاز العصبي المركزي (إلا في حال وصفت من قبل الطبيب).

- احتمال الشعور بالنوار أو الدوخة مما يستدعي الحذر عند الوقوف فجأة من موقع الجلوس أو النوم.

- احتمال الإصابة بالغشاوة، الضمور، الخلل في القدرة على الحكم على الأوضاع والظروف، الخلل في الوظائف الفكرية أو الجسدية، مما يستدعي الحذر عند القيادة أو القيام بأعمال تتطلب البقطة.

- قد يتطلب الاستمرار بالعلاج لفترة أربعة أسابيع أو أكثر قبل الحصول على التأثير المضاد للإكتئاب.

- استشر طبيبك قبل تخفيض الجرعة التي تتناولها أو التوقف عن تناول الدواء.

## ما هي التأثيرات الجانبية لفينلاكس إكس آر؟

إن فينلاكس إكس آر كغيره من الأدوية قد يسبب بعض التأثيرات الجانبية لدى بعض الأشخاص مثل: أحلام غير عادية، دفق غير عادي للسائل المنوي، إمساك، دوخة، جفاف في الفم، صداع، أرق، قيء، عصبية، نعاس، تعرق، تلاشي في القوى، فقدان الوزن.

## هل من تداخل بين فينلاكس إكس آر وأي دواء أو طعام؟

لتجنب حصول تفاعلات غير مرغوبة من جراء تناول أدوية متعددة، استشر طبيبك قبل تناول فينلاكس إكس آر مع أي من الأدوية التالية:

الليثيوم، سيميتيدين، إندينافير، الأدوية المؤثرة على السيروتونين، مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين، أو الأدوية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي.

تجنب تناول المشروبات الكحولية بالتزامن مع فينلاكس إكس آر لما لها من تأثير تزايد على إمكانية الإصابة بالخلل الحركي النفسي.

إن التأثيرات الجانبية لفينلاكس إكس آر قد تزداد في حال تناوله مع عشبة St. John's Wart

الحمل والرضاعة:

مؤتمر وزراء الصحة العرب  
والتحاد الصيدلاني العرب

بنيتا ش.م.ل.  
ضبيه - لبنان