

الأطفال عمر 6 سنوات فأكثر

الوقاية

يتم استنشاق محتويات كيسولة واحدة (٢٤ ميكروجرام) مررتين يومياً

ال أقل قيل المعرض.

ال العلاج الاستمراري

١٢ ميكروجرام يومياً

١- كيسولة من محتوى الاستنشاق

٢٤ ميكروجرام مررتين يومياً

محتوى الاستعمال

فورداديل

البيانات الخاصة بالاستعمال

فورداديل

البيانات العامة

فورداديل

البيانات الفنية

فورداديل

البيانات التشخيصية

فورداديل

البيانات العلاجية

فورداديل

البيانات المعاشرة

فورداديل



• إطلاق المضخة من الكبسولة:

• أسلك المضخة في وضع راسيا، بحيث يكون المسمى متبعاً إلى أعلى.


• اتّبِع الكبسولة بسان خفيف فقط.

• بعد شم الماء الرئيسي، اغسل ذلك بأخذ سائل الماء الرئيسي ذات ذلك بريجاً.

بريجاج ملاحظة أن الكبسولة قد تتسرب في هذه الحالة وأن الخطأ قد ينبع من الكبسولة.



آخر هو، البابير بالكام.



جدة الكبسولة.

ز- أزرق مع أحنته صغيرة.

(أزرق جلدي بساقة).

كل جانب.

فتحة الدخل الهواء.



تعليمات خاصة بالاستعمال والتبادل

البيانات العامة

البيانات المصحة

البيانات المعاشرة

ـ ألغل الميس وآمس المطاب.

ـ مكان.

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ