

Notice : Information de l'utilisateur

Opsumit 10 mg comprimés pelliculés macitentan

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Opsumit et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Opsumit
3. Comment prendre Opsumit
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Opsumit
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Opsumit et dans quel cas est-il utilisé ?

Opsumit contient la substance active macitentan qui appartient à la classe de médicaments appelés « antagonistes des récepteurs de l'endothéline ».

Opsumit est utilisé pour le traitement à long terme de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez l'adulte. Il peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments pour le traitement de l'HTAP. L'HTAP est due à une augmentation de la pression sanguine dans les vaisseaux qui transportent le sang du cœur aux poumons (les artères pulmonaires). Chez les personnes atteintes d'HTAP, ces artères deviennent plus étroites, ce qui oblige le cœur à travailler plus pour pomper le sang dans les artères. Cela occasionne chez les personnes de la fatigue, des vertiges et un essoufflement.

Opsumit dilate les artères pulmonaires, ce qui permet au cœur de pomper plus facilement le sang dans les artères. Ainsi la pression artérielle au niveau des poumons diminue ce qui permet de soulager les symptômes et d'améliorer le cours de la maladie.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Opsumit ?

Ne prenez jamais Opsumit :

- si vous êtes allergique au macitentan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés à la rubrique 6).
- si vous êtes enceinte, si vous envisagez une grossesse ou si vous avez un doute sur une éventuelle grossesse car vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable alors que vous êtes en âge d'avoir des enfants. Voir ci-dessous la rubrique « Grossesse ».
- si vous allaitez. Veuillez lire les informations mentionnées sous la rubrique « Allaitement ».
- si vous avez une maladie du foie ou si vous avez des taux très élevés d'enzymes hépatiques dans votre sang. Parlez-en à votre médecin, qui décidera si ce médicament est approprié pour vous.

Si une de ces éventualités s'applique à vous, veuillez informer votre médecin.

Avertissements et précautions

Faites particulièrement attention avec Opsumit :

Si vous avez une anémie (une diminution du nombre de globules rouges).

Vous devrez réaliser des examens sanguins comme prescrit par votre médecin :

Votre médecin vous prescrira des examens sanguins avant le début du traitement par Opsumit et pendant le traitement pour contrôler :

- si vous avez une anémie (une diminution du nombre de globules rouges)
- si votre foie fonctionne correctement

Les signes qui montrent que votre foie ne fonctionne pas correctement sont les suivants :

- envie de vomir (nausée)
- vomissement
- fièvre
- douleur au niveau de l'estomac (abdomen)
- coloration jaune de la peau ou du blanc de l'œil (jaunisse)
- urines de couleur foncée
- démangeaisons de votre peau
- fatigue inexpliquée ou sensation d'épuisement (léthargie ou sensation de fatigue)
- syndrome pseudo-grippal (douleurs dans les articulations et douleurs musculaires avec fièvre)

Si vous remarquez un de ces signes, **mentionnez-le immédiatement à votre médecin.**

Si vous avez des problèmes rénaux, parlez-en à votre médecin avant de prendre Opsumit. Le macitentan peut provoquer une baisse plus importante de la pression sanguine et diminuer le taux d'hémoglobine chez les patients ayant des problèmes rénaux.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants âgés de moins de 18 ans.

Personnes âgées

Il y a une expérience limitée avec Opsumit chez les patients âgés de plus de 75 ans. Opsumit doit être utilisé avec précaution dans cette tranche d'âge.

Autres médicaments et Opsumit

Opsumit peut affecter l'activité d'autres médicaments.

Si vous prenez Opsumit avec d'autres médicaments incluant ceux cités ci-dessous, les effets d'Opsumit ou d'autres médicaments peuvent être modifiés. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un des médicaments suivants :

- Rifampicine, clarithromycine, téthromycine (antibiotiques utilisés pour traiter des infections)
- Phénytoïne (un médicament utilisé pour traiter les crises d'épilepsie)
- Carbamazépine (utilisé pour traiter la dépression et l'épilepsie)
- Millepertuis (une préparation à base de plante pour traiter la dépression)
- Ritonavir, saquinavir (utilisés pour traiter l'infection par le VIH)
- Nefazodone (utilisé pour traiter la dépression)
- Kétoconazole (sauf sous la forme de shampoing), itraconazole, voriconazole (médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques)

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Opsumit peut être dangereux pour l'enfant à naître, avant sa naissance, conçu avant, pendant ou peu après le traitement.

- Si vous êtes une femme en âge de procréer vous devez utiliser une méthode de contraception fiable pendant que vous prenez Opsumit. Parlez-en à votre médecin.
- Ne prenez pas Opsumit si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.
- Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir pendant que vous prenez Opsumit, consultez votre médecin immédiatement.

Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin vous demandera d'effectuer un test de grossesse avant de commencer à prendre Opsumit, puis régulièrement (une fois par mois) pendant que vous prenez Opsumit.

Allaitement

On ne sait pas si Opsumit passe dans le lait maternel. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez Opsumit. Parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Opsumit peut causer des effets indésirables comme des maux de tête (mentionnés à la rubrique 4), et les symptômes de votre maladie peuvent également diminuer votre capacité à conduire des véhicules.

Importante information concernant certains excipients d'Opsumit

Les comprimés d'Opsumit contiennent un sucre appelé lactose en petites quantités. Si vous souffrez d'une intolérance au lactose ou à tout autre sucre, contactez votre médecin avant de prendre Opsumit.

Les comprimés d'Opsumit contiennent de la lécithine dérivée du soja. Si vous êtes allergique au soja, vous ne devez pas utiliser ce médicament (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais Opsumit »).

3. Comment prendre Opsumit ?

Opsumit ne peut être prescrit que par des médecins expérimentés dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée d'Opsumit est un comprimé de 10 mg, une fois par jour. Avaler le comprimé en entier avec un verre d'eau, ne pas le croquer ou le couper. Vous pouvez prendre Opsumit au cours ou en dehors d'un repas. Il est préférable de prendre le comprimé à la même heure chaque jour.

Si vous avez pris plus d'Opsumit que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, demandez conseil à votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Opsumit

Si vous oubliez de prendre Opsumit, prenez un comprimé dès que vous vous en souvenez, puis continuez à prendre vos comprimés à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Opsumit

Opsumit est un traitement que vous devrez continuer à prendre pour stabiliser votre HTAP. N'arrêtez pas de prendre Opsumit sans l'avis de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables très fréquents (peuvent survenir chez plus d'une personne sur 10)

- anémie (diminution du nombre de globules rouges dans le sang) ou taux d'hémoglobine diminué
- maux de tête
- bronchite (inflammation des voies respiratoires)
- rhinopharyngite (inflammation de la gorge et des voies nasales)
- œdème (gonflement) en particulier au niveau des chevilles et des pieds

Effets indésirables fréquents (peuvent survenir jusqu'à une personne sur 10)

- pharyngite (inflammation de la gorge)
- influenza (grippe)
- infection des voies urinaires (infection urinaire)
- hypotension (pression sanguine basse)
- congestion nasale (sensation de nez bouché)

Effets indésirables peu fréquents (peuvent survenir jusqu'à une personne sur 100)

- Réactions d'hypersensibilité (réactions allergiques : gonflement autour des yeux, de la face, des lèvres, de la langue, ou de la gorge, démangeaisons et/ou éruption cutanée)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement (voir détails ci-dessous). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

France

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance

Site internet: www.ansm.sante.fr

5. Comment conserver Opsumit

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étui en carton et sur la plaquette thermoformée après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Opsumit

La substance active est le macitentan. Chaque comprimé contient 10 mg de macitentan.

Les autres composants du comprimé sont : lactose monohydraté, cellulose microcristalline (E460i), povidone, carboxyméthylamidon sodique (type A), stéarate de magnésium (E572), polysorbate 80 (E433), alcool polyvinyle (E1203), dioxyde de titane (E171), talc (E553b), lécithine de soja (E322) et gomme xanthane (E415).

Qu'est-ce qu'Opsumit et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés d'Opsumit 10 mg sont des comprimés pelliculés ronds, biconvexes, blanc à blanc-cassé, portant la mention gravée « 10 » sur une face.

Opsumit est disponible sous forme de comprimés pelliculés de 10 mg sous plaquettes thermoformées de 15 ou 30 comprimés pelliculés ou en flacons de 30 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

Mars 2016

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Actelion Registration Ltd
Chiswick Tower 13th Floor
389 Chiswick High Road
London W4 4AL
Royaume-Uni
Tél. : +44 20 8987 3320

Fabricant

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH
Konrad Goldmann Strasse 5b
79100 Freiburg
Allemagne