

DENOMINATION

PRUNASINE®

FORME PHARMACEUTIQUE ET AUTRES PRESENTATIONS

Sirop à usage oral disponible en flacon de 200 ml et en emballage clinique de 1 litre.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Médicament appartenant au groupe des laxatifs de contact.

INDIQUE DANS

Constipation.

La PRUNASINE® est utile pour lutter contre les symptômes, mais ne s'adresse pas aux causes de la constipation. Il ne faut pas la prendre pour combattre une constipation légère.

CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE

- Constipation par obstacle mécanique.
- Inflammation du gros intestin.
- Douleurs abdominales de cause non-déterminée.
- Hypersensibilité aux anthraquinones.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Utiliser la PRUNASINE® avec prudence selon les instructions du médecin en cas de :

- grand-âge
- mauvais fonctionnement des reins ou du cœur
- diabète (3,25 g de sucre par cuillerée à café)

Compte tenu du risque de perte excessive d'eau et de sels minéraux (voir EFFETS NON DESIRÉS), ne prendre la PRUNASINE® que pendant des périodes aussi courtes que possible.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS

Il est recommandé aux personnes prenant d'autres médicaments de consulter un médecin avant de commencer un traitement par PRUNASINE®.

La PRUNASINE® peut augmenter les effets d'un traitement par des :

- digitaliques
- médicaments contre les troubles du rythme cardiaque
- diurétiques
- hormones minéralocorticoïdes
- médicaments parasympathomimétiques

Vu le risque de troubles du rythme cardiaque, éviter de

prendre PRUNASINE® en même temps que des antiparasitaires (halofantrine, pentamidine), des antihistaminiques H1 (astémizole, terfénadine) et des produits hypokaliémiants (diurétiques).

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

L'utilisation de PRUNASINE® est déconseillée durant la grossesse et la période d'allaitement.

COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE ?

Quantité habituelle :

Adultes : 2 cuillerées à café par jour.

Enfants de plus de 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Ne pas administrer au-dessous de 10 ans. L'usage prolongé de la PRUNASINE® doit être évité.

voie et mode d'administration

Voie orale.

MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES

Sont observés :

- diarrhée et douleurs abdominales
- syncopes
- pertes exagérées de liquides et de sels minéraux

Une hospitalisation doit éventuellement être envisagée.

Consulter un médecin.

EFFETS NON DESIRÉS

- Diarrhée et douleurs abdominales.
- Perte excessive d'eau et de sels minéraux (potassium) particulièrement chez la personne âgée.
- Teinte légèrement rougeâtre des urines.

CONSERVATION

Conserver à l'abri de la chaleur, au-dessous de 25° C.

Ne pas utiliser au-delà de la date limite figurant sur l'emballage (EX : mois/année). La date de péremption est le premier jour du mois mentionné.

DATE DE DERNIERE REVISION DE LA NOTICE

Mai 1999.

Par 5 ml de sirop (= 1 cuillerée à café) / Per 5 ml siroop (= 1 k Sennae fructus extractum siccum aequival. sennae fructus 400

TITULAIRE D'ENREGISTREMENT/REGISTRATIEHOUDER

CHRISTIAENS PHARMA s.a./n.v.

Chaussée de Gand, 615, Gentsesteen

1080 Bruxelles/Brussel/Brüssel