

محلول ملحي معقم مفرط التوتر مضاف إليه إن-أسيتيل سيستين لأقعية التنفس والتقطير

عبوات تحتوي كل منها على 5 مل

1. التعرف بالمنتج الطبي وتكوينه والغرض منه

1-1 الوصف ودواعي الاستخدام

Viscoflu منتج طبي يُستخدم مرة واحدة، ويُعطى أثناء علاج أمراض الجهاز التنفسي التي تتميز بفرط الإفرازات الكثيفة واللزجة.

1-2 موانع وقبود الاستخدام

فرط الحساسية للمواد الفعالة أو لأي من المواد المضافة.

يُمنع استخدام Viscoflu للأطفال دون الثانية من العمر.

لا يجب إعطاء Viscoflu أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية إلا في حالات الضرورة المطلقة وتحت الإشراف المباشر من الطبيب.

1-3 التركيب

تحتوي العبوة الواحدة 5 مل على: إن-أسيتيل سيستين 300 ملغ، كلوريد الصوديوم 150 ملغ.

المواد المضافة: هيدروكسيد الصوديوم، إيدينات الصوديوم، ماء للإعطاء عن طريق الحقن.

1-4 آلية العمل

يخفف Viscoflu المخاط الكثيف واللزج من خلال الآلية الفيزيائية / الميكانيكية لمكوناته:

• محلول مفرط التوتر معقم وموازن من كلوريد الصوديوم: المحاليل الملحية مفرطة التوتر التي تُطبق مباشرة على الغشاء المخاطي عن طريق التناسخ تسحب الماء من الحيز داخل الخلية إلى الحيز خارج الخلية، مما يزيد من نسبة الماء في المخاط المبط للظهارة، ويخففه ويسهل إزالته؛

• إن-أسيتيل سيستين (NAC): يبدل الحمض الأميني السيستين المؤسّل، يمارس نشاط حال للمخاط عن طريق الاتصال المباشر بالمخاط. ويعتمد هذا النشاط على وجود جزيئات جذور الكبريتريدل في الجزيء، والقادرة على تحطيم روابط ثاني الكبريتيد في البروتينات المخاطية التي تعطي المخاط اللزوجة، وتزيل بلمرته. كما يحتوي إن-أسيتيل سيستين على آلية مضادة للأكسدة تساعد في الحفاظ على انتحاء ظهارة الجهاز التنفسي؛

2. شكل التعبئة

• حاوية تحتوي على 5 عبوات كل منها 5 مل

• حاوية تحتوي على 10 عبوات كل منها 5 مل

3. طريقة الاستخدام

Viscoflu محلول معقم يمكن:

• أخذه عن طريق التنفس باستخدام رذاذات الإبروسول ليتم استنشاقه بحيث يصل إلى منطقة القصبة الهوائية.

• تقطيره مباشرة عن طريق غسل الأنف والأنف.

• تقطيره عن مستوى داخل القصبة الهوائية من خلال القسطرة الدائرية، تنظير القصبة الهوائية، وما إلى ذلك؛

3-1 جرعة الاستخدام وطريقته وتوقيتته

الإعطاء عن طريق الإبروسول: رذذ عبوة واحدة لكل جلسة بمعدل جلسة في جلستين في اليوم على مدى 5-10 أيام. ويمكن للطبيب تعديل مدى تكرار الجلسات وجرعاتها على نطاق واسع فيما يتعلق

بالتأثير السريري والعلاجي دون الحاجة إلى التمييز بشكل كبير بين الجرعات للبالغين أو الأطفال.

التقطير وغسيل الأنف والتجويغات أخرى: ¼ عبوة أو عبوة واحدة لكل استعمال.

تنظير القصبة الهوائية – داخل القصبة الهوائية: عبوة واحدة لكل استعمال، مرة – مرتين في اليوم أو حسب الحاجة.

3-2 الجرعة الزائدة

يمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة من Viscoflu عن طريق الاستنشاق وتقطير القصبة الهوائية – داخل القصبة الهوائية إلى إفراز السوائل بكميات كبيرة وإفراط، في المرضى الذين يعانون من خلود منعكس السعال، والتخامة على وجه الخصوص قد تجعل من الضروري غسل القصبات والأنساج.

4. التأثيرات الجانبية المعروفة

نظراً للتركيز العالي من الملح في المحلول، يمكن أن يؤدي استخدام Viscoflu لحث ظواهر التهيح الموضوعي العرضي الذي يمكن أن ينسب في حدوث التشنج القصبي، أو الإحساس بالحرقان في الغشاء

المخاطي للأنف، أو سيلان الأنف، أو الغثيان، أو القيء.

من بين هذه التأثيرات، استحداث منعكس السعال ضمن الحدود المحتملة أمر مستحب لأنه يعزز التخامة وفتح الممرات الهوائية.

عادة ما تخففي التأثيرات الجانبية لـ Viscoflu تلقائياً عن طريق إيقاف العلاج، لكن إذا لم تختف، يرجى استشارة طبيبك.

اتباع التعليمات الواردة في النشرة يقلل من خطر التأثيرات الجانبية.

5. التفاعلات المعروفة مع الأجهزة الطبية أو الأدوية الأخرى

من المستحسن استشارة الطبيب قبل استخدام Viscoflu في حالة المرضى الذين يُعالجون بالأدوية المستندة إلى التروغليسرين، لأن وجود إن-أسيتيل سيستين قد يسبب انخفاض ضغط الدم مع تهدد الشريان

الصدغي واحتمال حدوث صداع؛ يجب مراقبة الضغط في هذه الحالة.

لا يجب إعطاء Viscoflu مع الأدوية المضادة للسعال لأن الحد من منعكس السعال قد يؤدي إلى تراكم الإفرازات الشعب الهوائية.

يمكن إعطاء Viscoflu مع موسعات الشعب الهوائية، ومضيقات الأوعية، وما إلى ذلك، ولكن يجب في هذه الحالة استخدامه لأقصر فترة ممكنة.

لا ينصح بخلط المحاليل الحيوية مع محلول Viscoflu، حيث يمكن أن يتداخل إن-أسيتيل سيستين الموجود في Viscoflu مع اختبار قياس السالييلات والكيتونات في البول. يوصى بإبلاغ طبيبك أو

الصيدلي قبل استخدام Viscoflu إذا كنت قد تناولت أي أدوية أخرى مؤخراً، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

6. ظروف التخزين

يوصى بفتح عبوة Viscoflu قبل الاستخدام مباشرة.

إذا خلط المحلول مع أدوية أخرى، فيجب استخدامه في أقصر وقت ممكن ولا يمكن تخزينه. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة إلى العبوة غير المفتوحة، والمخزنة على نحو صحيح. لا تستخدم

Viscoflu بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ونظّهرهم.

7. تحذير

تنبيه من عبوة Viscoflu عند فتحها رائحة كبريتية لا تؤثر على إعطاء المستحضر بأي طريقة. ويمكن للمحلول أحياناً أن يتحول إلى اللون الوردي في العبوة المفتوحة أو عند سحبه في جهاز الإبروسول،

دون التأثير على نشاط المنتج وإمكانية استخدامه. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام Viscoflu، فيرجى الاتصال بطبيبك أو الصيدلي. يجب مراقبة المرضى الذين يعانون من الربو القصبي عن

كرب أثناء العلاج؛ إذا ظهرت حالة تشنج قصبي، فيجب تعليق عملية إعطاء إن-أسيتيل سيستين فوراً ويجب إجراء العلاج المناسب.

8. التخلص من المستحضر

عند انتهاء الصلاحية أو وجود ما يستوجب التخلص من المنتج، فيجب التعامل معه وفقاً للوائح إدارة النفايات بالسلطات المحلية المختصة. ولا يجب إطلاق المنتج أو عبوته في البيئة.

9. مفتاح الرموز

العبوة:

1. التشغيلية

sc = مدة الصلاحية

NAC: إن-أسيتيل سيستين

MD: منتج طبي