

أنتيبان®

هايوسين-ن-بيوتايل برومايد

محلول للحقن، أمبولات

التركيب

تحتوي كل أمبولة على ١ مليلتر من المحلول المكون من:
المادة الفعالة: هايوسين-ن-بيوتايل برومايد ٢٠ ملغم.
السواغ: حامض الهيدروبروميك وماء للحقن.

الخواص

إن المادة الفعالة في أنتيبان، هايوسين-ن-بيوتايل برومايد، هي عامل مضاد للمسكارين ذات مركز فعالية خاص في العقد اللاودية في جدران الأحشاء، بناء على ذلك يكون له تأثير مضاد للتقلص على العضلات الملساء للقنوات المعدية - المعوية والمرارية والبولية. بما أن هايوسين-ن-بيوتايل برومايد يشترك من أمونيوم رباعي فإنه لا يدخل إلى الجهاز العصبي المركزي، لهذا السبب لا يلاحظ حدوث تأثيرات جانبية مضادة للفعل الكوليني في الجهاز العصبي المركزي.

دواعي الاستعمال

يوصف أنتيبان لعلاج التقلصات الحادة بالقنوات الهضمية والمرارية والبولية التناسلية، وتشمل المغص المراري والكولي. أيضاً، يوصف كوسيلة مساعدة في العمليات التشخيصية والعلاجية، التي يمثل فيها التقلص مشكلة، مثل الفحص بالمنظار للمعدة والاثنى عشر، والتصوير بالأشعة.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

البالغون و الأطفال فوق ٦ سنوات:

يتم إعطاء ١-٢ أمبولة أنتيبان (٢٠-٤٠ ملغم) بالحقن البطيء في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد عدة مرات يومياً على ألا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى ١٠٠ ملغم (٥ أمبولات). لا يجب اخذ أنتيبان بطريقة متواصلة أو لفترات طويلة دون محاولة معرفة السبب وراء ألم البطن.

لم تتم دراسة مأمونية الدواء وفعاليتة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٦ سنوات.

لذلك لا ينصح بإعطاء أنتيبان لدى الأطفال دون ٦ سنوات.

الجرعة الزائدة

الأعراض: في حال تجاوز الجرعة قد تحدث أعراض ناتجة عن الأثر المضاد للفعل الكوليني مثل احتباس البول، جفاف الفم، إحمرار الجلد، تسارع ضربات القلب، تثبيط حركة القناة الهضمية واضطرابات بصرية عابرة.

العلاج: لعلاج المرضى الذين يعانون من المياه الزرقاء في العيون (الجلوكوما)، يتم إعطاء بيلوكاربين موضعياً. في حال الضرورة، يتم إعطاء محاكيات اللاودي، مثل نيوستيجمين ٠,٥ - ٢,٥ ملغم في العضل أو في الوريد. يتم علاج المضاعفات القلبية الوعائية وفق المبادئ العلاجية المعتادة.

في حالة حدوث شلل تنفسي، يتم إدخال أنبوب والقيام بالتنفس الاصطناعي.

قد يلزم تركيب قسطرة في حال احتباس البول. بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق الإجراءات الداعمة المناسبة حسب الحاجة.

نواهي الاستعمال

يجب عدم استعمال أنتيبان عند المرضى الذين عانوا من قبل حساسية مفرطة للهايوسين-ن-بيوتايل برومايد.

يجب ألا يعطى أنتيبان في الحالات التالية: المياه الزرقاء في العيون، تضخم البروستات مع احتباس البول، التضيق الالي في القناة المعدية - المعوية، سرعة ضربات القلب، تضخم القولون والوهن العضلي الوبيل.

الإحتياطات

يوصى بالحذر لدى إعطاء هايوسين-ن-بيوتايل برومايد للمرضى الذين يعانون من المياه الزرقاء في العيون، تضخم البروستات، الإضطرابات القلبية، التضيق الالي في القناة المعدية - المعوية، الفشل الوظيفي الكبدي أو الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

نظراً لإحتمال حدوث إضطرابات في التكيف البصري لا ينبغي للمرضى القيادة أو تشغيل الآلات عقب استعمال أنتيبان عن طريق الحقن.

لم يتم بعد إثبات سلامة استعمال المنتج خلال فترتي الحمل والرضاعة.

التأثيرات الجانبية

أنتيبان عموماً هو جيد التحمل عند إعطائه وفق الجرعات العلاجية الموصى بها. قد تحدث تأثيرات جانبية مضادة للفعل الكوليني وتتضمن جفاف الفم والجلد، تسارع دقات القلب، إمساك واحتباس البول، ولكنها تكون عموماً طفيفة وتختفي من تلقاء ذاتها.

وردت تقارير نادرة عن حدوث دوار وانخفاض ضغط الدم. وردت تقارير نادرة جداً عن حدوث تفاعلات فرط حساسية، وتشمل التفاعلات الجلدية، ضيق التنفس، التفاعلات التأقانية والصدمة التأقية.

التفاعلات الدوائية

إن استعمال هايوسين-ن-بيوتايل برومايد بالتزامن مع مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقات، ومضادات الهيستامين، والكينيدين، والأمانتادين، والديزوبيراميد قد يؤدي إلى زيادة الأثر المضاد للفعل الكوليني لهذه الأدوية. قد يؤدي الاستعمال المتزامن مع الميتوكلوبراميد إلى انخفاض مفعول كلا الدوائين على القناة الهضمية. قد يزيد أنتيبان من تأثير الأدوية ذات الفعل البيتا أدرياليني على القلب (تسرع القلب).

محتوى العبوة

أنتيبان محلول للحقن متوفر في عبوة تحتوي على ٥ أمبولات أو ٥٠ أمبولة.

شروط التخزين

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠°م، بعيداً عن الضوء والحرارة.

أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.، جدرا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدلة العرب