

ANTIPAN®

Bromure de butylhyoscine

Solution injectable, Ampoules

Composition

Chaque ampoule contient 1 ml de solution de:

Substance active: Bromure de butylhyoscine 20 mg.

Excipients: Acide bromhydrique et eau pour préparations injectables.

Propriétés

Le principe actif d'**Antipan**, le bromure de butylhyoscine, est un agent antimuscarinique, ayant une action sélective sur les ganglions parasympathiques dans la paroi des viscères. Par conséquent, il exerce une action antispasmodique spécifique sur le muscle lisse du tractus gastro-intestinal et des voies biliaires et urinaires. Etant un dérivé d'ammonium quaternaire, **butylbromure** d'hyoscine ne pénètre pas dans le système nerveux central et ne cause pas d'effets secondaires anticholinergiques à ce niveau.

Indications

Antipan est indiqué dans le traitement du spasme aigu des voies digestives, biliaires, urinaires et génitales, y compris les coliques hépatiques et néphrétiques, et aussi pour aider dans les examens radiologiques et diagnostiques difficiles en raison des spasmes, comme par exemple l'endoscopie gastro-duodénale.

Posologie et mode d'administration

Adultes et enfants âgés de plus de 6 ans: 1-2 ampoules d'**Antipan** (20-40 mg) à administrer par injection intraveineuse lente, intramusculaire ou sous-cutanée jusqu'à plusieurs fois par jour. Ne pas dépasser la dose maximale journalière de 100 mg (5 ampoules).

Antipan ne doit pas être administré continuellement ou pendant de longues périodes sans rechercher la cause exacte de la douleur abdominale.

L'innocuité et l'efficacité du médicament n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins de 6 ans.

Antipan n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans.

Surdosage

Symptômes: En cas de surdosage, les effets anticholinergiques tels que: rétention urinaire, sécheresse buccale, **rubéfaction** cutanée, tachycardie, inhibition de la motilité gastro-intestinale, et troubles visuels transitoires peuvent survenir.

Traitement: Pour les patients présentant un glaucome, la pilocarpine doit être administrée localement. Au besoin, les parasympathomimétiques tels que la néostigmine 0,5-2,5 mg en I.M. ou I.V. devraient être utilisés.

Les complications cardiovasculaires seront traitées selon les principes de traitement conventionnels.

En cas d'arrêt respiratoire, on aura recours à l'intubation et à la respiration artificielle.

La rétention urinaire pourrait nécessiter un cathétérisme. Quant aux autres symptômes du surdosage, il est nécessaire d'administrer un traitement de soutien standard.

Contre-indications

Antipan est contre-indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité connue au butylbromure d'hyoscine.

Antipan ne doit pas être utilisé en cas de: **glaucome, hypertrophie prostatique** avec rétention urinaire, **sténose des voies gastro-intestinales**, tachycardie, mégacôlon et myasthénie grave.

Précautions

Utiliser **Antipan** avec prudence en cas de **glaucome, d'hypertrophie prostatique**, de troubles cardiaques, de **sténose des voies gastro-intestinales**, de troubles de la fonction rénale ou hépatique et en cas d'hypertension.

Puisque des troubles visuels d'accommodation peuvent avoir lieu, les patients ne doivent pas conduire ou opérer des machines après une administration parentérale d'**Antipan**.

L'innocuité du produit au cours de la grossesse et de l'allaitement n'a pas été établie.

Effets secondaires

Aux doses thérapeutiques recommandées, **Antipan** est généralement bien toléré.

Des effets indésirables anticholinergiques, notamment: sécheresse buccale et dermique, trouble d'accommodation, tachycardie, constipation et rétention urinaire, peuvent avoir lieu mais sont généralement bénins et disparaissent spontanément.

De rares cas d'étourdissements et d'hypotension ont été rapportés. Des réactions d'hypersensibilités comprenant des réactions cutanées, une dyspnée, des réactions anaphylactiques et un choc anaphylactique ont été très rarement rapportées.

Interaction médicamenteuse

L'usage concomitant du butylbromure d'hyoscine avec les antidépresseurs tricycliques, les antihistaminiques, la quinidine, l'amantadine et le disopyramide peut potentialiser l'effet anticholinergique de ces derniers. L'usage concomitant avec le métoclopramide peut aboutir à une diminution des effets des deux médicaments sur le système gastro-intestinal. **Antipan** peut majorer l'effet tachycardisant des agents bêta adrénergiques.

Présentation

Antipan solution injectable est disponible en boîtes contenant 5 ou 50 ampoules.

Conditions de conservation

À conserver à une température inférieure à 30°C, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

**ARWAN Pharmaceutical Industries Lebanon s.a.l.,
Jadra, Liban**

CECI EST UN MEDICAMENT •Un médicament est un produit qui affecte votre santé, et sa consommation contrairement aux instructions est dangereuse pour vous. •Suivez strictement les prescriptions du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament. •Le médecin et le pharmacien sont des experts dans les médicaments, leurs bienfaits et leurs risques. •N'interrompez pas par vous-mêmes la période de traitement qui vous est prescrite. •Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin. •Garder les médicaments loin de la portée des enfants. Conseil des Ministres Arabes de la santé Union des Pharmaciens Arabes
