

ميتورام

ميتوكلوبراميد هايدروكلورايد

محلول للحقن، أمبولات

التركيب

تحتوي كل أمبولة (٢ مليلتر) على:

المادة الفعالة: ميتوكلوبراميد هايدروكلورايد ١٠ ملغم.

المسواغ: كلورايد الصوديوم، ميتايبسلفيت الصوديوم، كحول

البنزيل وماء للحقن.

الخواص

يعمل ميتوكلوبراميد، المادة الفعالة في ميتورام، على تنشيط حركة الجزء العلوي من الجهاز الهضمي دون تحفيز إفرازات المعدة أو المرارة أو البنكرياس. يزيد ميتوكلوبراميد من مدى انقباض المعدة ويعمل على ارتخاء الصمام البوابي، إضافة إلى زيادة حركة الأمعاء الدقيقة وهذا كله يؤدي إلى التعجيل في إفراغ المعدة. يظهر مفعول ميتوكلوبراميد على الجزء العلوي من الجهاز الهضمي عن طريق تثبيط ارتخاء العضلات الملساء الناتج عن تأثير الدوبامين، وبالتالي يحسن من استجابتها للأسيتيل كولين، كما أن هذا التأثير المضاد لعمل الدوبامين على الدماغ قد يكون المسبب لمفعوله كمضاد للقيء.

دواعي الاستعمال

يستعمل ميتورام في الحالات التالية:

- الغثيان والقيء، وخاصة المصاحبان لاضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك للتخفيف من هذه الأعراض.

- الوقاية من الغثيان والقيء المصاحبين لاستخدام الأدوية

الكيميائية أو الإشعاع في علاج الأمراض السرطانية.

- الوقاية من الغثيان والقيء اللذين يعقبان إجراء العمليات الجراحية.

- الإرتجاع المعدي - المريئي الذي يصيب الكبار، وذلك لعلاج حرقة المعدة وتأخر إفراغها.

- الشلل المعدي الناتج عن داء السكري، وذلك لتخفيف الأعراض الحادة والمتكررة.

- عسر الحركة الهضمية، وذلك لعلاج بطء الإفراغ المعدي.

- لتسهيل الإجراءات التي تتضمن إدخال أنبوب في الأمعاء الدقيقة.

- لتحفيز إفراغ المعدة لدى إجراء فحوصات التصوير الشعاعي

للجهاز الهضمي.

الجرعة وطريقة التعاطي

البالغين:

- كعلاج لتأخر إفراغ القناة الهضمية أو كمحفز لحركة الأمعاء (عند إدخال أنبوب في الأمعاء)، تحقن في الوريد جرعة مقدارها ١٠ ملغم.

- للوقاية من الغثيان عند علاج السرطان بالأدوية الكيميائية، تعطى جرعة مقدارها ٢ ملغم/ كلغم من وزن الجسم عن طريق

الري الوريدي قبل البدء بالعلاج الكيميائي بحوالي ٣٠ دقيقة، ويمكن تكرار الجرعة عند الحاجة كل ٢-٣ ساعات.

- للوقاية من القيء الذي يعقب العمليات الجراحية، تحقن في العضل جرعة مقدارها ١٠-٢٠ ملغم وذلك عند قرب الانتهاء

من العملية الجراحية.

- لإجراء الفحوصات التشخيصية، تحقن في الوريد جرعة مفردة مقدارها ١٠-٢٠ ملغم قبل إجراء الفحص بحوالي ٥-١٠ دقائق.

يجب أن يتم الحقن في الوريد ببطء ولمدة تتراوح بين ١-٢ دقيقة بينما يتم الري الوريدي خلال مدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

الأحداث والأطفال:

الجرعة الاعتيادية اليومية هي ٠,١ - ٠,٣ ملغم/ كلغم/ يوم.

نواهي الاستعمال

يجب عدم استعمال ميتورام من قبل المرضى الذين يعانون حساسية مفرطة للميتوكلوبراميد أو لأي من مكونات الدواء

الأخرى. يجب عدم استعمال ميتوكلوبراميد من قبل المرضى الذين يعانون من الصرع إضافة إلى هؤلاء المصابين بنزيف أو

بانسداد أو بتقرب في الجهاز الهضمي، كما يجب تجنب تناوله خلال ٣-٤ أيام التي تعقب إجراء جراحة في الجهاز الهضمي.

يجب عدم إعطاء ميتوكلوبراميد للمرضى الذين يعانون من ورم الغدة الكظرية إذ إن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في

ضغط الدم. يجب عدم استعمال ميتوكلوبراميد مع الأدوية المضادة لداء الباركنسون (ليفودوبا، الأدوية ذات المفعول

المشابه للدوبامين) وسيليجلين.

الإحتياطات

يجب توخي الحذر عند إعطاء ميتورام للمرضى الذين يعانون من الربو، ارتفاع ضغط الدم، داء باركنسون أو البورفيريا.

يوصى بتوخي الحذر لدى استعمال ميتورام من قبل كبار السن والأحداث والأطفال، حيث يوصى بحساب مقدار الجرعة بدقة.

إن استعمال ميتورام قد يحجب ظهور الأعراض والعلامات المصاحبة لبعض الأمراض التي تصيب الدماغ كالتهيج الدماغي.

بما أن أمبولات ميتورام تحتوي على ميتايبسلفيت الصوديوم كسواغ، فإنه نادراً ما قد يحدث أن يتعرض بعض المرضى ذوي الحساسية لهذه المادة إلى بعض تفاعلات الحساسية. إذا

ظهرت أي أعراض للحساسية عندئذ يجب إيقاف العلاج فوراً. **القصور الكبدي:** قد يكون من الضروري تخفيض مقدار الجرعة للمرضى الذين يعانون من القصور الكبدي.

القصور الكلوي: للمرضى الذين يعانون من قصور كلوي شديد، يجب تجنب استعمال ميتورام أو أن يتم إعطاؤه إذا لزم الأمر بجرعات قليلة، وذلك لزيادة احتمالية حدوث التأثيرات

خارج الهرمية.

الحمل: على الرغم من أنه غير معروف عن ميتوكلوبراميد كونه ضاراً خلال فترة الحمل، إلا أنه يفضل استعماله فقط عند الضرورة القصوى.

الرضاعة: يطرح ميتوكلوبراميد في حليب الثدي بكميات صغيرة، غير أنه يفضل تجنب استعماله من قبل الأمهات المرضعات ما لم تكن هناك حاجة ماسة له.

التأثيرات الجانبية

قد يؤدي استعمال ميتورام إلى الشعور بالنعاس وعدم الراحة، وقد تظهر أحياناً أعراض خارج الهرمية، خاصة عند الأطفال والأحداث. وفي بعض الأحيان، نتيجة لطول مدة الاستخدام، قد

تحدث صعوبة شديدة في الحركة إضافة إلى انخفاض مستوى هرمون البرولاكتين في الدم.

وقد سجل في حالات نادرة جداً حدوث اكتئاب أو إسهال أو متلازمة الذهان الخبيث، كما وسجل نادراً بعد الحقن في الوريد حدوث اضطرابات في التوصيل القلبي.

الجرعة الزائدة

حيث أنه لا يوجد دواء ذو مفعول مضاد للجرعة الزائدة من ميتوكلوبراميد، لذلك يجب أن يكون العلاج وفقاً للأعراض.

تساعد مضادات الكولين أو مضادات داء باركنسون أو مضادات الهستامين ذات الخصائص المضادة للكولين على السيطرة على ردود الفعل خارج الهرمية.

التفاعلات الدوائية

قد يزيد ميتوكلوبراميد من امتصاص الأسبرين أو الباراسيتامول، وبذلك فهو يعزز من مفعولهما عند تزامن الاستعمال.

إن تزامن استعمال المسكنات المشتقة من الأفيون أو مضادات المسكارين مع ميتوكلوبراميد قد يؤدي إلى معاكسة تأثيره العلاجي على الجهاز الهضمي.

إن استعمال ميتوكلوبراميد بالتزامن مع مضادات الذهان أو الليثيوم أو النترابنازين قد يزيد من احتمال حدوث التأثيرات خارج الهرمية.

قد يؤدي تزامن استعمال ميتوكلوبراميد مع الأدوية ذات المفعول المشابه للدوبامين إلى حدوث ما يلي:

- معاكسة تأثير بروموكريبتين الخافض لنسبة هرمون البرولاكتين في الدم.

- زيادة تركيز ليفودوبا في البلازما.

- معاكسة تأثير بيرجولايد المضاد لداء باركنسون.

محتوى العبوة

ميتورام محلول للحقن متوفر في عبوة تحتوي على ٥ أمبولات أو ٥٠ أمبولة سعة ٢ مليلتر.

شروط التخزين

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠°م، بعيداً عن الضوء والحرارة.

أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.، جدرا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدالة العرب