

LIPANTHYL® 200M

FÉNOFIBRATE MICRONISÉ

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, elle vous sera utile.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?
3. Comment prendre LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HYPOCHOLESTEROLEMIANT ET HYPOTRIGLYCERIDIEMANT / FIBRATE.

Ce médicament est indiqué dans les hypercholestérolémies (*taux anormalement élevé de cholestérol dans le sang*) et/ou les hypertriglycéridémies (*taux anormalement élevé de triglycérides - graisses - dans le sang*) de l'adulte, lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule dans les cas suivants :

- insuffisance hépatique (*trouble du fonctionnement du foie*),
- insuffisance rénale (*trouble du fonctionnement du rein*),
- allergie connue au fénofibrate ou à l'un des excipients,
- réactions connues de phototoxicité ou de photo-allergie (*réactions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV*) pendant un traitement par le fénofibrate ou un médicament de structure apparentée, en particulier le kétoprofène (*médicament anti-inflammatoire*),
- chez l'enfant.

Faites attention avec LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule :

Mises en garde spéciales

- En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

- Un bilan hépatique sera pratiqué avant traitement et régulièrement pendant la première année de traitement.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

- La prise de ce médicament ne dispense pas du régime et sa poursuite régulière est toujours indispensable.
 - Un bilan sanguin régulier est nécessaire.
 - Prévenez votre médecin si vous êtes traité par anticoagulant.
- NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS**

Interactions avec d'autres médicaments.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS AINSI QUE TOUT SIGNE ANORMAL SURVENANT EN COURS DE TRAITEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, notamment si vous prenez un autre médicament abaissant le cholestérol (fibrate ou statine).

Grossesse et allaitement

Il n'y a en général pas d'indication pour ce médicament pendant la grossesse. En cas de découverte fortuite d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament, il convient d'interrompre ce dernier. Contactez dans ce cas votre médecin traitant.

Par manque de données concernant le passage dans le lait, ce traitement est déconseillé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : lactose.

3. COMMENT PRENDRE LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?

Posologie

La posologie est de 1 gélule par jour.
DANS TOUS LES CAS, CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Le traitement s'administre en 1 prise par jour, au cours du repas, selon la prescription de votre médecin.

Durée du traitement

En association avec le régime, ce médicament constitue un traitement symptomatique devant être prolongé et régulièrement surveillé.

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Ces effets sont peu fréquents et bénins :

- troubles digestifs gastriques ou intestinaux à type de digestion difficile,
- réactions cutanées (éruptions, démangeaisons) de type allergique ou réactions de photosensibilité (lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV). Dans certains cas et même après plusieurs mois sans complications, une réaction cutanée peut apparaître débutant au niveau des zones exposées au soleil ou à la lumière UV artificielle (lampes UV),
- élévation transitoire des transaminases (*enzymes du foie*),
- calculs biliaires, pneumopathies,
- des douleurs musculaires (*avec parfois augmentation des enzymes musculaires*).

Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire douloureuse ou une faiblesse musculaire, contactez immédiatement votre médecin, car les problèmes musculaires peuvent être graves dans de rares cas.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule ?

La substance active est :

Fénofibrate200 mg

Pour une gélule.

Les autres composants sont :

Laurylsulfate de sodium, lactose, amidon prégélatinisé, croscovidone, stéarate de magnésium.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane, oxyde de fer, érythrosine.

Qu'est ce que LIPANTHYL 200 Micronisé, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîtes de 30 et de 90 gélules.

Titulaire

LABORATOIRES FOURNIER SA

28, boulevard Clemenceau
21000 DIJON

Exploitant

ABBOTT PRODUCTS SAS

42, rue Rouget-de-Lisle
92150 SURESNES
TÉL : +33 (0)1 46 25 85 00

Fabricant

RECIPHARM FONTAINE

Rue des Prés Potets
21121 FONTAINE-LES-DIJON

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).

