

<div></div>	<div>نشرة دوائية: معلومات للمستهمل</div>
رودوجيل ® 0.75 مليون وحدة دولية / 125 ملغ، أقراص مغلّفة	<div>Rodogy®</div>
سيبراميسين / مترونيدازول	

<p>الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بعناية قبل البدء بأخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.</p> <ul style="list-style-type: none">احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى إرفاعتها مجدداً. إذا كان لديك أسئلة أخرى، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي. قد يُوصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأشخاص آخرين حتى ولو كانت عرضهم مرهمه مماثلة لمرضك لأنه قد يؤذيهم. إذا شعرت بأي تأثير جانبي، أعلم الطبيب أو الصيدلي. يتلطق هذا أيضاً على أي تأثير جانبي غير متكرر في هذه النشرة. راجع القسم 4.
--

ماذا تحتوي هذه النشرة:

- ما هو رودوجيل وما هي دواعي استعماله
- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل
- كيف يُؤخذ رودوجيل
- ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة
- كيف يُحفظ رودوجيل
- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

- ما هو رودوجيل وما هي دواعي استعماله**

هذا الدواء هو تركيبة من مضادين حيويّين، ينتمي واحد إلى مجموعة الماكروليد والأخر إلى مجموعة الإيميدازول. المادتان الفاعلتان هما على التوالي السبيراميسين والمترونيدازول.

يُوصف هذا الدواء لدى البالغين والأطفال لعلاج التهابات القمويّة والنسيّية مثل بعض خزاجات الأسنان.

- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل**

إذا قال لك طبيبك إنك تعاني من عدم تحمّل بعض أنواع السكر، اتصل له قبل أخذ هذا الدواء.

موانع الاستعمال

لا تأخذ رودوجيل:

• إذا كنت تعاني من حساسية ضدّ السبيراميسين و/أو المترونيدازول و/أو ضدّ مضادات حيويّة أخرى من مجموعة الإيميدازول (عائلة المضادات الحيويّة التي ينتمي إليها المترونيدازول) أو ضدّ أحد مكونات الدواء الأخرى (المذكورة في القسم 6).

• إذا كان المريض طفلاً ما دون السادسة من العمر لأنّ هذا الدواء يأتي على شكل أقراص.

في حال التلش من الضروريّ استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات واحتياطات

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ رودوجيل.

قبل أخذ رودوجيل، أعلم طبيبك في الحالات التالية:

• إذا كنت مصابًا باضطرابات عصبية،

• إذا كنت مصابًا باضطرابات نفسيّة،

• إذا كنت مصابًا باضطرابات في الدم،

• إذا سبق لك أن أصبت بالتهاب السحايا وأنت خضع لعلاج بالمترونيدازول،

• إذا سبق لك أن عانيت من مشاكل قلبيّة؛ يجب أخذ الحذر مع هذا النوع من الأدوية إذا وُلدت مع إطالة فارق كيو تي أو إذا كان لديك تاريخ عائليّ بذلك (تظهر في مخطط كهربيّته القلب)، أو إذا كنت تعاني من خلل في الكهارل في الدم (بخاصة نسب منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم)، أو إذا كان معتلّ ضربات القلب لديك طبيعيًا جدًا (يسمى «بطء القلب») أو إذا كان قلبك ضعيفًا (فشل القلب) أو إذا أصبت في السابق بنبوية قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو إذا كنت امرأة أو إذا كنت متقدّمًا في السنّ أو إذا كنت تأخذ أدوية أخرى يمكن أن تسبّب بعض التشوّهات في مخطط كهربيّته القلب (راجع فقرة «أدوية أخرى ورووجيل»)،

• في حال كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك من نقص في نازعة هيدروجين الفلوكوز – 6 – فوسفات (مرض وراثي في كريات الدم الحمراء) بسبب وجود خطر الإصابة بانحلال الدم (تدمير خلايا الدم الحمراء) مع السبيراميسين التي يحتوي رودوجيل عليها.

أعلم طبيبك على الفور إذا أصبت بأحد الاضطرابات التالية **في خلال فترة العلاج برووجيل**:

• منذ الجرعة الأولى، يواجه المريض خطر الإصابة بارتكاس تحسسي حاد ومفاجئ (صدمة تأقية، أوديميا كوينك)، يظهر من خلال العوارض التالية: ضيق في الصدر، دوار، غثيان أو إسهاء، أو دوار عند الوقوف (راجع قسم «ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة»). في حال حصول هذه العوارض، توقّف عن أخذ هذا الدواء لأنّ حياتك قد تكون بخطر، واتصل بطبيبك على الفور.
• إذا أمثلاً جسمك في بداية العلاج باحمرار وبقور وأصبت بالحمّى، يجب التلش في ردّة فعل خطيرة تُعرف بالتهّار الطمحيّ الشامل الحاد (راجع قسم «ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة»؛ أعلم طبيبك على الفور لأنّه من الضروريّ إيقاف العلاج في هذه الحالة. وفي حال الإصابة بردّة الفعل هذه، يُمنع أيّ إعطاء جديد للمترونيدازول لوحده أو مع مادة فاعلة أخرى في الدواء نفسه.
• أفيد عن حصول حالات من الارتكاسات الجلديّة الحادة من نوع الطّفح القفاعي مع انقلاع الجلد يمكن أن تنتشر بسرعة على الجسم كلّه وأنّ تعرّض حياة المريض للخطر (أفيد عن متلازمة ليل ومتلازمة ستيفنز-جونسون مع السبيراميسين=المترونيدازول). أعلم طبيبك على الفور في حالة حصول هذا النوع من التأثيرات.

• يجب مراقبة الظهور المحتمل أو تفاقم اضطرابات عصبية مثل صعوبة في تنسيق الحركات وحالة تشوُّش واختلاجات وصعوبة في الكلام والتثير وارتعاشات وحركات غير إرادية في العينين وكذلك اضطرابات أخرى على مستوى اليدين والقدمين مثل التتملّ والوخز والإحساس بالبرد والخدر وضعف حاسة اللمس. عادة ما تزول هذه الاضطرابات عند إيقاف العلاج. من المهمّ إذا إيقاف العلاج واستشارة الطبيب على الفور (راجع فقرة «ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة»).

• يمكن أن تحصل اضطرابات في السلوك تشكّل خطرًا على المريض منذ الأخذ الأوّل للعلاج، بخاصة في حالة وجود اضطرابات نفسيّة سابقة. يجب إيقاف العلاج واستشارة الطبيب على الفور (راجع فقرة «ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة»).

• إذا كان لديك تاريخ من اضطرابات الدم أو علاج مبرقع الجرعة و/أو علاج طويل الأمد، يمكن أن يعمد طبيبك إلى مراقبة تعداد الدم لديك مراقبة منتظمة عن طريق فحوصات الدم.

• أفيد عن حصول حالات من السميّة الكبدية الحادة/فشل الكبد الحاد، بما فيها حالات تؤدّي إلى الوفاة، لدى مرضى مصابين بمتلازمة كوكاين، مع منتجات تحتوي على المترونيدازول.

إذا كنت مصابًا بمتلازمة كوكاين، يجب أن يراقب طبيبك أيضًا وطيفك الكبدية بشكل متكرر في خلال فترة علاجك بهذا الدواء وبعد العلاج.
• أعلم طبيبك على الفور وتوقّف عن أخذ هذا الدواء إذا أصبت بالعوارض الآتية:
• أوجاع في البطن، فقدان الشهية، غثيان، تقوّ، حمى، تورّك، تعب، يرقان، بول داكن اللون، براز لونه صمغيّ أو حكّء.

• أعلم الطبيب أو المختبر أنك تأخذ هذا الدواء إذا كنت ستخضع لفحص مخبري؛ فأخذ هذا الدواء يمكن أن يؤثّر على نتائج بعض الفحوصات المخبرية (البحث عن اللولبيّات) يجعل النتيجة إيجابية عن طريق الخطأ (فحص لنسول).

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ رودوجيل.

أدوية أخرى ورووجيل

أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخرًا أو قد تأخذ أي دواء آخر.

أعلم الطبيب بشكل خاص إذا كنت تأخذ:

• أدوية تحتوي على الكحول بسبب خطر حدوث ارتكاسات مثل احمرار الوجه والحرارة والتقيؤ وتسارع دقّات القلب،

• اليوسوفلان (الذي يوصف لعلاج بعض أمراض الدم وفي تحضير زرع النخاع)،

• الديسوفلورام (الذي يُستعمل للوقاية من الانتكاسات أثناء العلاج من الإدمان على الكحول).

رودوجيل مع الطعام والشراب

تجنّب استهلاك المشروبات الكحولية في خلال فترة العلاج بسبب خطر التعرّض لارتكاسات مثل احمرار الوجه والحرارة والتقيؤ وتسارع دقّات القلب.

في حال التلش، لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملًا أو مرضعة أو إذا كنت تعتدين نفسك حاملًا أو كنت تتوين الحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ هذا الدواء.

يمكن استعمال هذا الدواء في خلال فترة الحمل في حال الضرورة، مهما كانت مرحلة الحمل.

بما أنّ المترونيدازول والسبيراميسين ينتقلان إلى حليب الثدي، يجب تقادي أخذ هذا الدواء في خلال فترة الإرضاع.

يجب عليك دائما استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أيّ دواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

يجب لتف انتباه سائقي السيارات ومستعملي الآلات إلى خطر تعرّضهم لدوار أو تشوُّش أو هوسات أو اختلاجات أو اضطرابات في الرؤية بسبب استعمال هذا الدواء.

يحتوي رودوجيل على 8 ملغ من السوربيتول في القرص الواحد.

- كيف يُؤخّذ رودوجيل**

إحرص دائما على أخذ هذا الدواء بالتحديد تماما بتعليمات الطبيب أو الصيدلي. إسأل الطبيب أو الصيدلي في حال التلش.

مقدار الجرعة

على سبيل الإشارة، تبلغ الجرعة العادية ما يلي:

• البالغون والأطفال فوق عمر الـ15 سنة: من 4 إلى 6 أقراص في اليوم على مرّتين، أو 3 مرّات.

• الأطفال:

• من 6 سنوات إلى 10 سنوات: قرصان في اليوم

• من 10 إلى 15 سنة: 3 أقراص في اليوم

على مرّتين أو ثلاثة.

• دوار؛

• اختلاجات؛

• تشوُّش؛

• اضطرابات عصبيةّ تُسمّى اعتلالات دماغية أو متلازمة المخيخ، تظهر عبر حالة تشوُّش

واضطرابات في الوعي والسلوك وصعوبة في تنسيق الحركات واضطرابات في اللفظ واضطرابات

في السير وحركات غير إرادية في العينين وارتعاشات. عادة ما تزول هذه الاضطرابات عند إيقاف

العلاج ويمكن أن تكون مرتبطة بتغييرات في الصور الطبيّة. أفيد عن حالات وفاة استثنائية (راجع

قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل»؛

• التهاب السحايا غير الميكروبي.

اضطرابات نفسيّة

• هوسات؛

• اضطرابات في الشخصية (إرتياب، هذيان) يمكن أن تتراقف مع أفكار أو أفعال انتحارية (راجع قسم

«ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل»؛

• ميل إلى الاكتئاب.

اضطرابات بصريّة

• اضطرابات بصريّة عابرة مثل تشوُّش الرؤية وازدواج الرؤية وقصر النظر وضعف النظر وتغيير

في رؤية الألوان؛

• إصابة / التهاب العصب البصري.

اضطرابات في الدم

• فقر دم مع تدمير محتمل للكريات الحمراء (راجع قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل»؛

• قلة الكريات البيضاء (انخفاض عدد الكريات البيضاء)، قلة العدلات (كميّة غير كافية من بعض الكريات البيضاء في الدم)؛

• مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الصفائح الدموية في الدم، مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي أو انخفاض كبير في عدد بعض كريات الدم البيضاء (العدلات).

اضطرابات الكبد

• زيادة انزيمات الكبد (نقلات الأمين، الفوسفاتاز القلوية)؛

• حالات نادرة جدًا من مرض خطير في الكبد (مع يرقان أحيانًا) بخاصة حالات قصور في الكبد تتطلب زرعًا.

التأثير على القلب والأوعية

• إطالة فارق كيو تي (تشوّه يظهر على مخطط كهربيّته القلب)، قلب يديق بسرعة أو يببطه كبير أو بشكل غير منتظم (عدم انتظام دقّات القلب البطني)، دقّات قلب سريعة بشكل غير طبيعي (تسارع دقّات القلب البطني)، اضطرابات خطيرة في النظم القلبي (التواء أطراف البطنين بسبب كثرة خفقاتها) (راجع قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل»).

إضطرابات جهاز المناعة

• مرض التهابي في الأوعية الدموية الصغيرة يتميّز ببقع أرجوانية على الجلد (التهاب الأوعية الدموية)، صدمة ذات أصل تحسسي يمكن أن تسبّب الوفاة (راجع قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رودوجيل»).

اضطرابات أخرى

• تحوّل لون البول إلى بنيّ حممّر بسبب الدواء.

THIS MEDICAMENT
Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. <p>Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.</p> <ul style="list-style-type: none">The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed. Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. Keep all medicaments out of reach of children.
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists.

ان هذا الدواء
<p>مستحضر بوثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك. الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي نفعه وضرره.</p> <ul style="list-style-type: none">لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك. لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب. لا تترك الادوية في متناول الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيداللة العرب

المصنّع

Sanofi S.p.A
S.S. 17 KM 22
67019 - Scoppito (AQ)
Italy

التاريخ الأخير الذي تمت فيه مراجعة هذه النشرة: كانون الثاني/يناير 2020

نصائح صحيّة / تثقيف صحي

ما الذي يجب عليك معرفته حول المضادات الحيويّة

إن المضادات الحيويّة فعّالة في مقاومة حالات العدوى التي تسببها البكتيريا، وهي ليست فعّالة في مقاومة حالات العدوى التي تسببها الفيروسات.

لذلك فقد اختار طبيبك وصف المضاد الحيوي هذا لك لأنه يناسب حالتك ويناسب المرض الذي تعاني منه حاليًا.

إن البكتيريا قادرة على البقاء أو على التكاثر بالرغم من مفعول المضاد الحيوي. يُعرف هذا بالمقاومة ويجعل بعض العلاجات بالمضادات الحيويّة غير فعّال.

تزداد هذه المقاومة بسبب استعمال المضادات الحيويّة كثيرًا أو استعمالها بشكل غير مناسب.

قد تمزّر نموّ البكتيريا المقاومة وتبثّى بالتالي شفاهك، أو حتّى قد تجعل هذا الدواء غير فعّال في حال لم تتقدّم بما يلي:

- الجرعة الموصوفة،
- أوقات تناول الصحيحة،
- مدّة العلاج.

لذلك، بغية الحفاظ على فعّاليّة هذا الدواء :

1 – استعمل فقط مضادًا حيويًا عندما يصفه لك طبيبك.

2 – تقيّد بدقة بالوصفة.

3 – لا تستعمل مجددًا مضادًا حيويًا بدون وصفة طبيّة حتّى إذا كنت تعتقد أنك تستطيع مقاومة مرض يبدو مماثلاً.

4 – لا تعط أبداً مضادك الحيويّ لأحد آخر. فقد لا يلائم مرضه.

5 – عند انتهاء علاجك، أعد كّن العبء المفتوحة إلى الصيدلي لكي يتخلّص من هذا الدواء بالطريقة المناسبة.