نشرة العلبة: معلومات للمستعمل

فيدازا 25 ملغم/ملليليتر
مسحوق للتعليق للحقن
أزاسيتيدين

إقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بإستعمال هذا الدواء.
- إحتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقرائتها مرة أخرى.
- إن كان لديك أي أسئلة أخرى، فإسأل طبيبك، الصيدلي أو الممرضة..
- لقد تم وصف هذا الدواء لك. لا تمرره للآخرين. فقد يضرهم، حتى وإن كانت أعراضهم مشابهة لأعراضك.
- إذا أصبحت أي من الأعراض الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، فالرجاء أن تخبر طبيبك، الصيدلي أو الممرضة.

في هذه النشرة:

1. ما هو فيدازا ولأي غرض يستعمل
2. قبل أن تستعمل فيدازا
3. كيف تستعمل فيدازا
4. تأثيرات جانبية محتملة
5. كيف يخزن فيدازا
6. معلومات إضافية

1. ما هو فيدازا ولأي غرض يستعمل

ما هو فيدازا
فيدازا هو عامل مضاد للسرطان وينتمي لمجموعة من الأدوية تعرف باسم "مضادات المستقلبات". يحتوي فيدازا على المادة الفعالة 'أزاسيتيدين '.

لأي غرض يستعمل فيدازا
يستعمل فيدازا لدى المرضى البالغين الذين لا يمكن أن يخضعوا لعملية زرع الخلية الجذعية لعلاج:

- متلازمات خلل التنسج النخاعي عالية الخطورة (MDS).
- لوكيميا الدم الوحيدي النقوي المزمن (CMML).
- لوكيميا نخاعي حاد (AML).

تؤثر هذه الأمراض على نخاع العظم كما يمكن أن تسبب مشاكل في عملية إنتاج خلايا الدم الطبيعية.

كيف يعمل فيدازا
يعمل فيدازا من خلال منع نمو الخلايا السرطانية. يصبح أزاسيتيدين مندمج في المادة الوراثية للخلايا (الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA)). ويعتقد أنه يعمل بواسطة تغيير طريقة الخلية لتحويل الجينات في داخلها وخارجها، وأيضا عن طريق التداخل مع إنتاج RNA وDNA الجديد. ويعتقد أن هذه الإجراءات هي لتصحيح مشاكل نضوج ونمو خلايا الدم الحديثة في نخاع العظام التي تسبب اضطرابات خلل التنسج النقوي، وقتل الخلايا السرطانية في سرطان الدم.
تحدث إلى طبيبك أو الممرضة إن كان لديك أي أسئلة عن كيفية عمل فيدازا أو لماذا تم وصف هذا الدواء لك.

2. قبل أن تستعمل فيدازا

لا تستعمل فيدازا
- إذا كانت لديك حساسية لأزاسيتيدين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في الجزء 6).
- إن كنت مصاباً بسرطان الكبد المتقدم.
- إذا كنت ترضعين

خذ عناية خاصة عند إستعمال فيدازا
تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة قبل إستعمال فيدازا في الحالات التالية:
- إنخفاض في عدد الصفيحات الدموية أو كريات الدم الحمراء أو البيضاء.
- إن كنت تعاني من مرض كلوي.
- إن كنت تعاني من مرض كبدي.
- إذا كان لديك في أي وقت مضى حالة قلبية أو نوبات قلبية أو أي تاريخ من أمراض الرئة.

إختبارات الدم
ستجرى لك إختبارات الدم قبل بدأ علاجك بفيدازا وفي بداية كل فترة علاجية (تسمى "الدورة"). وهذا للتحقق من أن لديك كريات دم كافية وأن كبدك والكلى تعمل بشكل صحيح.

الأطفال والمراهقين
لا يوصى بإستعمال فيدازا في الأطفال والمراهقين من هم أقل من 18 عاماً من العمر .

أدوية أخرى وفيدازا
أخبرطبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، أخذت مؤخراً أو ممكن أن تأخذ أي أدوية أخرى. ذلك لأن فيدازا قد يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية الأخرى. وكذلك لأن بعض الأدوية الأخرى قد تؤثر على طريقة عمل فيدازا.

الحمل، الرضاعة الطبيعية والخصوبة

الحمل
يجب أن لا تستعملي فيدازا أثناء الحمل لأنه قد يكون ضاراً بالطفل.
إستعملي طريقة فعالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج ولغاية 3 أشهر بعد توقف العلاج.
أخبري طبيبك حالاً إن أصبحت حاملاً أثناء العلاج.

إن كنت حاملاً أو ترضّعين، أو تعتقدين بأنك حاملاً أو تخططي أن يكون لك طفلاً، فإسألي طبيبك أو الصيدلي للنصح قبل أن تستعملي هذا الدواء.

الرضاعة الطبيعية
يجب أن لا ترضعي طفلك إن كنت تستعملين فيدازا. إنه من غير المعروف إن كان هذا الدواء يفرز في حليب الإنسان.

الخصوبة
يتعيّن على المرضى الذكور الذين يقيمون علاقات جنسيّة مع امرأة في سنّ الإنجاب أن يتوخوا الحذر لأنه غير مسموح للشريكة أن تصبح حاملا أثناء فترة العلاج بفيدازا. يجب إستعمال طريقة فعالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج ولغاية 3 أشهر بعد توقف العلاج بهذا الدواء.

تحدث مع طبيبك إن كنت ترغب بالحفاظ على حيواناتك المنوية قبل بدء هذا العلاج.

قيادة العربات وإستخدام الآلات
لا تقود عربة أو تستعمل أي آلة إذا عانيت من تأثيرات جانبية كالتعب.

3. كيف تستعمل فيدازا

قبل إعطاءك فيدازا

سيعطيك طبيبك دواء آخر لمنع الغثيان والقئ عند بداية كل دورة علاجية.

- الجرعة الموصى بها هي 75 ملغم لكل متر مربع من مساحة سطح الجسم. سيقرر طبيبك جرعة هذا الدواء إعتماداً على حالتك العامة والطول والوزن. سوف يتحقق طبيبك من تحسنك وقد يغير الجرعة إن كان ذلك ضرورياً.

- يعطى فيدازا كل يوم لأسبوع واحد، يتبع ذلك فترة إستراحة لمدة 3 أسابيع. ستعاد "الدورة العلاجية" هذه كل 4 أسابيع. وعادة ما يعطى لك 6 دورات علاجية على الأقل.

سيعطى لك هذا الدواء على شكل حقنة تحت الجلد من قبل طبيب أو ممرضة. قد يعطى لك تحت الجلد في منطقة الفخذ أو البطن أو أعلى الذراع.

إسأل طبيبك، الصيدلي أو الممرضة إن كان لديك أي أسئلة أخرى حول إستعمال هذا الدواء.

4. تأثيرات جانبية محتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء تأثيرات جانبية، بالرغم من أنها لا تحصل للجميع.

أخبر طبيبك حالاً إذا لاحظت أي من التأثيرات الجانبية التالية:
- **النعاس، الرجفة، اليرقان، إنتفاخ البطن وسهولة التكدم.** قد تكون هذه أعراض الفشل الكبدي وقد تكون مهددة للحياة.
- **تورم الساقين والقدمين، ألم في الظهر، قلة التبول، زيادة في العطش، سرعة في النبض، دوخة وغثيان، تقيؤ أو إنخفاض الشهية والشعور بالإلتباس والقلق أو التعب.** قد تكون هذه أعراض الفشل الكلوي وقد تكون مهددة للحياة.
- **حمى.** ربما تكون بسبب عدوى نتيجة وجود مستويات منخفضة من كريات الدم البيضاء، وقد تكون مهددة للحياة.
- **ألم في الصدر أو ضيق في التنفس والذي قد يكون مصحوباً مع حمى.** قد يكون هذا بسبب التهاب يصيب الرئة ويسمى "الإلتهاب الرئوي"، وقد يكون مهدداً للحياة.
- نزيف. مثل دم في البراز بسبب نزف في المعدة أو الأمعاء، أو نزيف داخل الرأس. وقد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض صفائح الدم.
- **صعوبة التنفس، تورم الشفتين، حكة أو طفح جلدي.** وقد تكون هذه بسبب تفاعلات حساسية (فرط الحساسية).

تشمل التأثيرات الجانبية الأخرى:

تأثيرات جانبية شائعة جدا (تؤثر على أكثر من 1 من بين 10أشخاص)
- إنخفاض عدد كريات الدم الحمراء (فقر دم). قد تشعر بالتعب والشحوب.
- إنخفاض عدد كريات الدم البيضاء. وهذه قد تكون مصحوبة مع حمى. وتكون أيضاً أكثر إحتمالاً للإصابة بعدوى.
- إنخفاض عدد الصفيحات الدموية (قلة الصفيحات). تكون أكثر عرضة للنزف والتكدم.
- الإمساك، الإسهال، الغثيان، التقيؤ.
- الإلتهاب الرئوي.
- ألم في الصدر وضيق في التنفس.
- إرهاق .
- رد فعل في موقع الحقن ويشتمل على الإحمرار، الألم أو ردود فعل جلدية.
- فقدان الشهية.
- ألم في المفاصل.
- تكدم.
- طفح جلدي.
- بقع حمراء أو أرجوانية تحت جلدك.
- ألم في بطنك
- حكة.
- حمى.
- تقرح في الأنف والحنجرة.
- دوخة.
- صداع.
- اضطرابات النوم (الأرق).
- نزيف الأنف (رعاف).
- آلام العضلات.
- الضعف (الوهن)
- فقدان الوزن.
- انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.

تأثيرات جانبية شائعة (قد تؤثر لغاية 1 من بين 10أشخاص)
- نزيف داخل رأسك.
- عدوى تصيب الدم تسببه بكتريا (إنتان). وهذه قد تكون بسبب مستويات منخفضة من الكريات البيضاء في دمك.
- فشل نخاع العظام. وقد يسبب هذا مستويات منخفضة من كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفيحات الدموية.
- نوع من فقر الدم حيث تنخفض كريات دمك الحمراء والبيضاء والصفيحات الدموية.
- عدوى في البول.
- عدوى فيروسية مسببة قرح الزكام (هربس).
- نزيف اللثة، نزيف في المعدة أو الأمعاء، ونزيف من حول مخرجك بسبب البواسير (نزف باسوري)، نزيف في عينك، نزيف تحت جلدك أو داخل جلدك (ورم دموي).
- دم في البول.
- تقرحات في فمك أو لسانك.
- تغييرات على جلدك في موقع الحقن. وتشتمل تورم، كتلة صلبة، تكدم، نزيف داخل جلدك (ورم دموي)، طفح جلدي، حكة وتغييرات في لون الجلد.
- إحمرار جلدك.
- عدوى في الجلد (إلتهاب الهلل).
- عدوى في الأنف والحنجرة أو إلتهاب الحلق.
- إلتهاب أو سيلان الأنف أو من الجيوب الأنفية (إلتهاب الجيوب الأنفية).
- إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم.
- تعاني من ضيق في التنفس عندما تتحرك.
- ألم في حنجرتك و في الأوتار الصوتية.
- عسر الهضم.
- خمول.
- شعور عام بعدم الارتياح.
- قلق
- الشعور بالإلتباس.
- فقدان الشعر.
- فشل كلوي.
- جفاف.
- طبقة بيضاء تغطي اللسان، والخدين من الداخل، وبعض الأحيان على أعلى الفم، واللثة واللوزتين (العدوى الفطرية بالفم).
- الإغماء.
- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف هبوط ضغط الدم الإنتصابي، مما يؤدي إلى دوخة عند الحركة للوقوف أو الجلوس.
- نعاس، دوخة (النيمومة)
- النزيف نتيجة لتوصيل القسطرة.
- مرض قد يؤثر على الأمعاء ويسبب الحمى، والقيء، وآلام المعدة (التهاب الرَتْج).
- تكون سوائل حول الرئتين (انْصباب جَنْبي).
- رعشة) قشعريرة(
- تشنج بالعضلات.
- ارتفاع الطفح الجلدي والحكة (الشَرَى).
- تجمّع السوائل حول القلب (انصباب تاموري)

تأثيرات جانبية غير شائعة (قد تؤثر لغاية 1 من بين 100أشخاص)
- تفاعلات حساسية (فرط الحساسية).
- رجفة.
- فشل في الكبد.
- بقع كبيرة برقوق ملونة ، ارتفاع أثار بقع مؤلمة على الجلد مع حمى.
- تقرّح جلدي مؤلم (بيوديرما جنجرينوزوم)

تأثيرات جانبية نادرة (قد تؤثر لغاية 1 من بين 1000أشخاص)
- سعال جاف.
- تورم غير مؤلم في أطراف الأصابع (تعجّر).
- متلازمة إنحلال الورم - تعقيدات أيضية يمكن أن تحدث أثناء علاج السرطان وأحيانا حتى من دون العلاج. وتحدث هذه المضاعفات نتيجة منتج الخلايا السرطانية الميتة ويمكن أن تشتمل على ما يلي: تغييرات في كيمياء الدم، إرتفاع البوتاسيوم والفوسفور وحمض اليوريك وانخفاض في الكالسيوم مما يؤدي بالتالي إلى تغييرات في وظائف الكلى، ضربات القلب، نوبات تشنجية، وأحيانا الموت.

غير معروفة (لا يمكن تقييم تواترها من المعلومات المتوفرة)
- عدوى الطبقات العميقة للجلد التي تنتشر بسرعة مسببة ضرراً للجلد والأنسجة والتي قد تكون مهددة للحياة (التهاب اللفافة)

الإخبار عن التأثيرات الجانبية
إذا حصلت لك أي من الأعراض الجانبية، فتحدث إلى طبيبك، الصيدلي أو الممرضة. وهذا يشتمل على أية تأثيرات جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. بإمكانك أيضاً الإخبار عن التأثيرات الجانبية بشكل مباشر كما هي موصوفة في الجزء 6. بإخبارك عن التأثيرات الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير معلومات أكثر عن أمان هذا الدواء.

5. كيف يخزن فيدازا

يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

يخزن بدرجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ إنتهاء المفعول والمذكور على ملصق القنينة والعلبة. تاريخ الإنتهاء هو آخر يوم من الشهر المذكور.

إن طبيبك، الصيدلي أو الممرضة هم المسؤولون عن تخزين فيدازا. وكذلك هم مسؤولون عن تحضير والتخلص بشكل صحيح من أي فيدازا غير مستعمل.

عند إستعماله فوراً
حالما يكون فيدازا جاهزاً للتعليق، يجب أن يعطى خلال 45 دقيقة.

عند إستعماله لاحقاً
إذا تم تحضير معلق فيدازا بإستعمال ماء الحقن الذي لم يكن مبرداً، فإن المعلق يجب أن يوضع في الثلاجة (2 إلى 8 درجة مئوية) مباشرة بعد تحضيره ويحفظ في مكان بارد لمدة تصل إلى حد أقصى قدره 8 ساعات.
إذا تم تحضير معلق فيدازا بإستعمال ماء الحقن الذي كان مخزوناً في الثلاجة (2 إلى 8 درجة مئوية)، فيجب وضع المعلق في الثلاجة (2 إلى 8 درجة مئوية) مباشرة بعد تحضيره و يحفظ في مكان بارد لمدة تصل إلى حد أقصى قدره 22 ساعة.

ينبغي أن يسمح للمعلق بأن تصل درجة الحرارة لحوالي(20 إلى 25 درجة مئوية) بتركه لمدة 30 دقيقة قبل إعطاءه.

إذا وجدت جزيئات كبيرة في المعلق فيجب التخلص منه.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي فيدازا
- المادة الفعالة هي أزاسيتيدين. تحتوي القارورة الواحدة على 100 ملغم من أزاسيتيدين. بعد التذويب بـ 4 ملليليتر من ماء للحقن، يحتوي المعلق المحضر على 25 ملغم/ملليليتر من أزاسيتيدين.
- المكون الأخر هو المانيتول (E421).

ما هو شكل فيدازا وما هي محتويات العلبة
فيدازا هو مسحوق أبيض للتعليق للحقن وهو مجهز بقارورة زجاجية تحتوي على 100 ملغم من أزاسيتيدين. تحتوي كل علبة على قارورة واحدة من فيدازا.

صنع من قبل:
Baxter Oncology GmbH, Halle/Westfalen, Germany

حامل تصريح التسويق:
Celgene Europe B.V., Netherlands

تاريخ المراجعة الأخير 07/2018

للإخبار عن أي تأثير/تأثيرات جانبية:

المملكة العربية السعودية:
- مركز الوطني للتيقظ الدوائي والسلامة
  - فاكس: 7662-205-11-966+
  - إتصل بمركز التيقظ الدوائي والسلامة الوطني على رقم: 2038222-11-966+ أرقام الخطوط: 2340-2356-2317
  - هاتف مجاني: 8002490000
  - بريد إليكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
  - موقع الإنترنت: www.sfda.gov.sa/npc

الإمارات العربية المتحدة:
قسم اليقظة الدوائية والأجهزة الطبية
ص.ب: 1853
هاتف: 80011111
بريد إلكتروني: pv@moh.gov.ae
إدارة الأدوية
وزارة الصحة والوقاية
دبي

عمان:
دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية
المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
وزارة الصحة، سلطنة عمان
هاتف: 0096822357686/0096822357687
فاكس: 0096822358489
البريد الإلكتروني: dg-padc@moh.gov.om
الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.om

أقطار أخرى:
- يرجى الإتصال بالسلطة المختصة ذات الصلة.

هذا دواء
- الدواء هو منتج يؤثر على صحتك، وتناوله على عكس التعليمات يشكل خطراً عليك.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باع لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي خبراء في الدواء وبفوائده ومخاطره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون إستشارة طبيبك.

إحفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال وأي شخص آخر غير مشترك مباشرة بالعلاج

مجلس وزراء الصحة العرب
إتحاد الصيادلة العرب

AZA1000ABPLØØØØV04H03

فيدازا 25 ملغم/ملليليتر

نشرة العلبة: معلومات للمستعمل

Vidaza™ 25 mg/mL

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

المعلومات التالية مقصودة لمهنيي الرعاية الصحية فقط:

<u>توصيات للتعامل الآمن</u>
إن فيدازا هو منتج طبي سام للخلايا، لهذا وكما هو الحال مع غيره من المركبات السامة المحتملة، ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع أزاسيتيدين وتحضير معلقاته. ينبغي تطبيق إجراءات التعامل السليم والتخلص بشكل صحيح من المنتجات الطبية المضادة للسرطان.
إذا لامس أزاسيتيدين المحضر الجلد، فيجب غسله فورا وجيدا بالماء والصابون. إذا لامس الأغشية المخاطية، يجب غسلها جيداً بالماء.

<u>عدم التوافق</u>
لا يجب خلط هذا المنتج الطبي مع منتجات طبية أخرى بإستثناء تلك المذكورة تحت (أنظر "طريقة التحضير").

<u>طريقة التحضير</u>
يجب تحليل فيدازا مع ماء للحقن. ويمكن تمديد مدة التخزين للمنتج المحلل بإستعمال ماء للحقن مبرد (2 الى 8 درجات مئوية). أدناه تفاصيل تخزين المنتجات المحللة.

1. ينبغي تجميع التجهيزات التالية:
   - قنينة/قناني أزاسيتيدين؛ قنينة/قناني ماء للحقن؛ قفازات جراحية غير معقمة؛
   - مناديل كحولية؛ حقنة/حقن 5 ملليليتر للحقن مع الإبرة/الإبر.
2. ينبغي سحب 4 ملليليتر من ماء الحقن في الحقنة مع التأكد من إزالة أي هواء محبوس داخل الحقنة.
3. ينبغي إدخال إبرة الحقنة التي تحتوي على 4 ملليليتر من ماء الحقن من خلال الرأس المطاطي العلوي لقنينة أزاسيتيدين يليها حقن ماء الحقن إلى داخل القنينة.
4. بعد إزالة الحقنة والإبرة، ينبغي رج القنينة بقوة حتى يتم الحصول على معلق معتم متجانس. بعد التحليل، سيحتوي كل ملليليتر من المعلق على 25 ملغم أزاسيتيدين (100 ملغم/4 ملليليتر). يكون المنتج المحلل متجانس، معلق معتم، وخالي من المكومات. <u>يجب التخلص من المنتج إذا كان يحتوي على جزيئات كبيرة أو مكومات. لا ترشح المعلق بعد التحليل لأن ذلك يمكن أن يزيل المادة الفعالة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المرشحات موجودة في بعض الملئمات والحسكات والنظم المغلقة؛ لذا لا ينبغي إستخدام أنظمة كهذه لإعطاء المنتج الدواءي بعد التحليل.</u>
5. يجب تنظيف الرأس المطاطي العلوي ويتم إدخال سرنجة ذات إبرة جديدة في القارورة . ينبغي بعد ذلك قلب القنينة رأساً على عقب، والتأكد من أن طرف الإبرة تحت مستوى السائل. وينبغي بعد ذلك سحب المكبس مرة أخرى لسحب كمية من المنتج الطبي المطلوب للجرعة المناسبة، مع التأكد من إزالة أي هواء محبوس داخل الحقنة. كما وينبغي بعد ذلك سحب الحقنة مع الإبرة من القنينة والتخلص من الإبرة.
6. ينبغي بعد ذلك ربط إبرة تحت الجلد جديدة بقوة مع الحقنة (يستحسن قياس 25). لا ينبغي تنظيف الإبرة قبل الحقن، وذلك للحد من وقوع ردود فعل موضعية في موقع الحقن.
7. عند إستعمال أكثر من قارورة واحدة ينبغي إعادة كل الخطوات المذكورة أعلاه لإعداد المعلق. وللجرعات التي تتطلب أكثر من قارورة واحدة، ينبغي تقسيم الجرعة بالتساوي على سبيل المثال، جرعة 150 ملغم = 6 ملليليتر، حقنتين تحتوي كل منهما على 3 ملليليتر. قد لا يكون من الممكن سحب كل التعليق من القارورة، بسبب المخلفات في القارورة والإبرة.
8. يجب إعادة تعليق محتويات حقنة التجريع على الفور قبل الإعطاء. وينبغي أن تكون درجة حرارة المعلق في وقت الحقن حوالي 20 إلى 25 درجة مئوية. ولإعادة التعليق، لف الحقنة بقوة بين راحتي اليدين حتى يتم الحصول على معلق متجانس ومعتم. <u>يجب التخلص من المنتج إذا كان يحتوي على جزيئات كبيرة أو مكومات.</u>

<u>تخزين المنتج المحلل</u>
للاستعمال الفوري:
يمكن تحضير معلق فيدازا فوراً قبل الإستعمال، وينبغي إعطاء المعلق في غضون 45 دقيقة. إذا كان الوقت المنقضي أكثر من 45 دقيقة، فيجب التخلص من المعلق بشكل مناسب، وتحضير جرعة جديدة.
للاستعمال لاحقاً:
عند التحليل بإستعمال ماء للحقن لم يبرد مسبقاً، فيجب وضع المعلق المستنشأ في البراد (2 الى 8 درجات مئوية) فوراً بعد التحليل، ويحفظ في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 8 ساعات. إذا كان الوقت المنقضي في الثلاجة أكثر من 8 ساعات، فيجب التخلص من المعلق بشكل مناسب، وتحضير جرعة جديدة.

عند التحليل بإستعمال ماء للحقن مبرد (2 الى 8 درجات مئوية)، فيجب وضع المعلق المستنشأ في الثلاجة (2 الى 8 درجات مئوية) فورا بعد التحليل ، ويحفظ في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 22 ساعة. إذا كان الوقت المنقضي في الثلاجة أكثر من 22 ساعة، فيجب التخلص من المعلق بشكل مناسب، وتحضير جرعة جديدة.

ينبغي ترك المحقنة المملوءة بالمعلق لمدة 30 دقيقة قبل الإعطاء وذلك من أجل الوصول إلى درجة حرارة حوالي 20 إلى 25 درجة مئوية. إذا كان الوقت المنقضي أكثر من 30 دقيقة، ينبغي التخلص من المعلق بشكل مناسب، وتحضير جرعة جديدة.

<u>حساب الجرعة الفردية</u>
يمكن حساب الجرعة الكلية، وفقاً للمساحة السطحية للجسم (BSA) ، على النحو التالي:

الجرعة الكلية (ملغم) = الجرعة (ملغم/متر مربع)× المساحة السطحية للجسم (متر مربع)

الجدول أدناه يعرض فقط مثالاً عن كيفية حساب جرع أزاسيتيدين الفردية إعتماداً على قيمة 1.8 متر مربع كمتوسط للمساحة السطحية للجسم.

الجرعة ملغم/متر مربع (النسبة المئوية لجرعة البداية الموصى بها)	الجرعة الكلية إعتماداً على قيمة 1.8 متر مربع كمساحة سطحية للجسم	عدد القناني المطلوبة	الحجم الكلي للمعلق المطلوب
75 ملغم/متر مربع (100%)	135 ملغم	قنينتان	5.4 ملليليتر
37.5 ملغم/متر مربع (50%)	67.5 ملغم	قنينة واحدة	2.7 ملليليتر
25 ملغم/متر مربع (33%)	45 ملغم	قنينة واحدة	1.8 ملليليتر

<u>طريقة الإعطاء</u>
لا ترشح المعلق بعد التحليل.
ينبغي حقن فيدازا المحلل تحت الجلد (أدخل الإبرة بزاوية 45 إلى 90درجة) بإستعمال إبرة قياس 25 في أعلى الذراع أو الفخذ أو البطن.

ينبغي حقن الجرع التي تزيد عن 4 ملليليتر في موقعين منفصلين.

يجب أن تكون مواقع الحقن بالتناوب. وينبغي أن يكون موقع الحقن الجديد بمسافة لا تقل عن 2.5 سم من الموقع السابق وليس على الإطلاق في مناطق يكون فيها الموقع ليّن أو مرضوض أو أحمر أو متصلب.

يجب التخلص من أي منتج غير مستعمل أو مواد النفايات وفقاً للمتطلبات المحلية.