

كريم ديرموفيت

بروبيونات كلوبيتاسول

يُرجى قراءة كامل محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى إعادة قراءتها لاحقاً.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يُرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا توصي الآخرين باستخدامه ولا تمنحه للغير، فقد يسبب لهم الضرر، حتى لو كانت أعراض المرض لديهم هي نفسها التي تظهر لديك.
- إذا عانيت من أي آثار جانبية، استشر طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

محتويات هذه النشرة:

- ما هو ديرموفيت وما هي دواعي الاستخدام
- ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديرموفيت
- كيفية استخدام ديرموفيت
- الآثار الجانبية المحتملة
- كيفية تخزين ديرموفيت
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1- ما هو ديرموفيت وما دواعي استخدامه

يحتوي ديرموفيت على مادة تسمى بروبيونات كلوبيتاسول. تنتمي هذه المادة إلى مجموعة من الأدوية تسمى السموم المنشطة (ستيرويد). هذه المادة تساعد في تقليل التورم والتهيج.

يستخدم ديرموفيت للمساعدة في تقليل الاحمرار والحكة الناتجة عن بعض مشاكل الجلد. تشمل مشاكل الجلد هذه على:

- الأكزيما المتكررة
- الصدفية (يقع سمكة مع احمرار والتهاب في الجلد، وغالبًا ما تغطيها قشور فضية)، باستثناء الصدفية اللويحية الواسعة الانتشار.
- الحزاز المسطح (مرض جلدي يسبب نتوءات مسطحة أرجوانية حمراء مسببة للحكة على الرسغين أو الساعدين أو أسفل الساقين).
- الذئبة الحمامية القرصية (مرض جلدي يصيب أغلب الأحيان الوجه والأذنين وفروة الرأس مما يسبب تندب وزيادة حساسية الجلد المسبب لأشعة الشمس).
- التهاب الجلد وأمراض الجلد الأخرى التي لم تستجب إلى كريمات أو مراهم الستيرويد المعتدلة.

2- ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديرموفيت

موانع استخدام ديرموفيت:

لا يستخدم لمن لديهم حساسية (تحسس شديد) من مادة بروبيونات كلوبيتاسول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6)

- لا يستخدم للأطفال ممن هم دون السنة.
- لا يستخدم لعلاج أي من مشاكل الجلد التالية، فقد يزيد الأمر سوءًا:
 - حب الشباب
 - احمرار شديد في الجلد داخل الأنف وحوله (الوردية)
 - طفح جلدي أحمر حول فمك (التهاب الجلد حول الفم)

- يمنع استخدام الكريم للأشخاص الذين يعانون من حكة حول الشرج أو بمناطق الأعضاء التناسلية (المضو الذكري أو المهبل).
- الدوى الجلدية (ما لم يتم علاج الدوى عن طريق الأدوية المضادة للدوى في نفس الوقت)
- حكة في الجلد غير ناتجة عن التهابات
- الصدفية اللويحية، باستثناء حالات فردية.

لا تستخدم ديرموفيت إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل الاستخدام.

التحذيرات والاحتياطات

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ديرموفيت في الحالات التالية:

- قد تعاني من الألم حديثة في العظام أو قد تتفاقم أي من أعراض الألم العظام التي كنت تعاني منها

للأطفال من عمر سنة 1- 10 سنوات

عمر الطفل	عدد وحدات القياس بطرف الإصبع المطلوبة			
	الوجه والرقبة	الذراع واليد	الرجل والقدم	الصدر
2-1 سنة	1.5	1.5	2	2
3-5 سنوات	1.5	2	3	3
6-10 سنوات	2	2.5	4.5	3.5

استخدام ديرموفيت للأطفال

- لا تستخدمه للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة.
- من المهم بشكل خاص في حال استخدامه للأطفال ألا يتجاوز الكمية المحددة.
- يجب ألا تستمر مدة العلاج الأطفال ممن هم فوق العام أكثر من 5 أيام ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. يفضل مراجعة طبيب الطفل كل أسبوع، أثناء استخدام الكريم.
- يجب عدم استخدام الضمادات أو العصابات عند الاستخدام للأطفال في أماكن وضع الكريم.

إذا كان لديك الصدفية

إذا كانت لديك بقع سمكية من الصدفية في المرفقين أو الركبتين، فقد يشير إليك الطبيب بوضع الكريم تحت ضمادة محكمة الغلق. توضع الضمادة فقط في الليل لمساعدة الكريم في بده العمل. بعد فترة قصيرة من الوقت سوف تقوم بوضع الكريم بشكل طبيعي.

عند استخدام ديرموفيت على وجهك

يجب عليك وضع الكريم على وجهك فقط بناءً على تعليمات طبيبك. يجب أن لا يزيد استخدامه عن 5 أيام فقط لأنه يؤدي إلى ترقيق جلد وجهك بدون شك. لا ينبغي استخدام الضمادات أو العصابات على الوجه في مكان وضع الكريم. لا تدع الكريم يدخل في عينيك. إذا حدث ذلك، فقم بغسله بكمية كبيرة من الماء.

في حال استخدمت جرعة زائدة من ديرموفيت

إذا وضعت كمية كبيرة أو إذا تم ابتلاع الكثير من الكريم عن غير قصد، فقد يسبب لك ذلك الإصابة بالمرض. استشر طبيبك أو أذهب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

إذا نسيبت استخدام جرعة ديرموفيت

إذا نسيبت وضع الكريم، فقم بوضعه بمجرد أن تتذكره. إذا كان الوقت الذي تذكرت فيه قريبًا من وقت الجرعة التالية، فانتظر حتى هذا الوقت. لا تستخدم جرعة إضافية من ديرموفيت لتعويض جرعة فلتة.

إذا توقفت عن استخدام ديرموفيت

إذا كنت تستخدم ديرموفيت بانتظام فلابد من استشارة طبيبك قبل التوقف عن استخدامه لأن التوقف المفاجئ ربما يؤدي إلى تفاقم حالتك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بخصوص استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4- الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع.

توقف عن استخدام ديرموفيت وأخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن في الحالات التالية:

- عندما تجد أن مشكلة جلدك تزداد سوءًا أو تتطور إلى طفح جلدي معمم أو أن جلدك يتورم أثناء العلاج. قد تكون لديك حساسية من الكريم، أو لديك عدوى أو تحتاج إلى علاج آخر.
- إذا كنت تعاني من مرض الصدفية فقد تصاب ببثور و صديد تحت الجلد. يمكن أن يحدث هذا أثناء أو بعد العلاج ويعرف باسم الصدفية البثرية.

الآثار الجانبية الأخرى التي قد تلاحظها عند استخدام ديرموفيت تشمل:

- آثار شائعة (قد تظهر على شخص واحد من كل 10 أشخاص)
- الشعور بالحرقة أو الألم أو التهيج أو الحكة في مكان وضع الكريم.

آثار غير شائعة (قد تظهر على شخص واحد من كل 100 شخص)

- ترقق الجلد، وهذا قد يسبب ظهور علامات تمدد
- قد تصبح الأوعية الدموية تحت سطح جلدك أكثر وضوحًا.

نادرة جدًا (قد تظهر على شخص واحد من كل 10000 شخص)

استخدام ديرموفيت لفترة زمنية طويلة، أو استخدامه تحت ضمادة محكمة الغلق، قد يسبب الأعراض التالية:



- زيادة الوزن
- استدارة الوجه (وجه القمر)
- بقاثة
- ترقق الجلد
- تجاعيد الجلد
- جفاف الجلد
- تغير لون بشرتك
- زيادة شعر الجسم
- تساقط الشعر / نقص نمو الشعر / الشعر التالف المظهر
- الفتاعلات الجلدية الجلدية النادرة الأخرى التي قد تحدث هي:
- حساسية في منطقة وضعة الكريم
- تفاقم الحالة
- تهيج في مكان وضع الكريم/ الألم
- احمرار
- الطفح الجلدي أو خلايا النحل
- إذا كنت تعاني من مرض الصدفية فقد تصاب ببثور و صديد تحت الجلد. يمكن أن يحدث هذا أثناء أو بعد العلاج ويعرف باسم الصدفية البثرية.
- التهاب الجلد
- حب الشباب

عند الأطفال، ابحث أيضًا عن الآثار التالية:

- تأخر زيادة الوزن
- تباطؤ النمو

آثار جانبية نادرة جدًا قد تظهر في اختبارات الدم أو عند الفحص الطبي من قبل طبيبك:

- انخفاض مستوى هرمون الكورتيزول في الدم
- زيادة مستويات السكر في الدم أو في البول
- ارتفاع ضغط الدم
- عدسة غائمة في العين (إعتام عدسة العين)
- زيادة الضغط في العين (الجلوكوما)
- مشاكل في الرؤية ناجمة عن انفصال شبكية العين (اعتلال المشيمية والشبكية المصلي المركزي)
- ضعف العظام من خلال فقدان التدرجي للعادن (مشاشة العظام)؛ قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات إضافية بعد الفحص الطبي الخاص بك لتأكيد ما إذا كان لديك هذه الحالة.

آثار غير معروفة (لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة)

عدم وضوح الرؤية

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فيادر باستشارة طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. للإبلاغ عن الشكاوى أو الأحداث السلبية المرتبطة باستخدام منتج/منتجات جلاكوسميثكلاين، يرجى الاتصال بنا عبر: gulf.safety@gsk.com عندما يُبلغ عن الآثار الجانبية، فانت تساهم في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5- كيفية حفظ ديرموفيت

- يحفظ هذا الدواء بعيدًا عن أنظار ومتناول الأطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور في ملصق الزجاجة أو العبوة الكرتون بعد كلمة (EXP). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.
- لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو الغليات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. من شأن هذه التدابير أن تساهم في حماية البيئة.

6- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات ديرموفيت

- المادة الفعالة هي بروبيونات كلوبيتاسول. كل 1 جرام يحتوي على 0.5 ملجم من بروبيونات كلوبيتاسول (0.05٪ وزن / وزن).
- المكونات الأخرى هي:
 - كحول سيتوستيريلي (انظر القسم 2)،
 - أحادي ستيارات الجليسيريل 40-55،
 - اراسيلول 165،
 - بديل شمع العسل 6621،
 - البروبيلين جليكول (انظر القسم 2) ،
 - الكوروكيسول (انظر القسم 2)،
 - سترات الصوديوم،
 - حمض الستريك
 - ماء مقطر.

كيف يبدو ديرموفيت ومحتويات العبوة

يوجد داخل كل عبوة كرتون أنبوب ذو غطاء بلاستيكي يحتوي على 30 جم من الكريم.

الشركة المصنعة

Glaxo Operations UK Limited,

Barnard Castle

United Kingdom

روجعت هذه النشرة في ٢٢ مارس ٢٠٢١

العلامات التجارية مملوكة أو مرخص بها لمجموعة شركات جلاكوسميث كلاين (GSK).

© ٢٠٢١ مجموعة شركات جلاكوسميث كلاين (GSK) أو مرخصها.

هذا منتج دوائي
المنتج الدوائي هو منتج يؤثر على صحتك ويعد استهلاكه بخلاف التعليمات أمر خطير بالنسبة لك.
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باع لك الدواء.

- يُعد الطبيب والصيدلي خبراء في الأدوية وفوائدها ومخاطر استخدامها.
- لا تقاطع فترة العلاج الموصوفة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة الطبيب.
- احتفظ بجميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدالة العرب.

3- كيفية استخدام ديرموفيت

استخدم دائمًا هذا الدواء حسب تعليمات الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

طريقة استخدام هذا الدواء

- توضع عادة طبقة رقيقة من ديرموفيت، مرة أو مرتين في اليوم. قد تقل عدد مرات استخدامه كلما بدأت بشرتك في التحسن أو تتوقف عن تمام التحسن. قد يصف لك طبيبك الستيرويد الأضعف لكي تستخدمه بدلًا من ديرموفيت.
- إذا كنت تستخدم مرطبًا اترك فترة كافية من الوقت قبل وضع المرطب حتى يتم امتصاص ديرموفيت.
- هذا الكريم هو للاستخدام على الجلد فقط.
- لا يستخدم لأكثر من أربعة أسابيع دون استشارة الطبيب. إذا كنت بحاجة إلى علاج لفترة طويلة ، فقد يقرر طبيبك أنك بحاجة إلى استخدام كريم أو مرهم أكثر اعتدالًا.
- إذا تفاقت مشكلة جلدك أو لم تتحسن في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، استشر طبيبك. الجراثيم التي تسبب التهابات تفصل البيئة الدافئة والرطبة تحت الضمادات. إذا تم توجيهك لتغطية المنطقة المعالجة بضماد، فقم دائمًا بتظيف الجلد قبل وضع ضمادة جديدة للمساعدة في منع إصابة الجلد أسفل الضمادة.
- إذا كنت تضع الكريم لشخص آخر، فتأكد من غسل يديك بعد الاستخدام أو ارتداء القفازات البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة فقط.

إرشادات تتعلق بكيفية استخدام الكريم

- اغسل يديك قبل استخدام الكريم
- ضع طبقة رقيقة على المنطقة (المناطق) المتأثرة و قم بتدليك الجلد برفق حتى تختفي تمامًا. توضع الكمية المناسبة للاستخدام من ديرموفيت على أنملةك. تستخدم كمية كريم أقل للأطفال مع استخدام إصبع شخص بالغ لقياس وحدة الأنملة. هذه الصورة تبين وحدة أنملة واحدة.



3- ما لم يُقصد من وضع الكريم على يديك استخدامه في علاج اليد، اغسل يديك مرة أخرى بعد استخدام الكريم.

للبالغين



لا تعلق إذا وجدت أنك تحتاج إلى أكثر أو أقل قليلاً من هذه الجرعة. هذا دليل تقريبي فقط.