

أورادوس ب**أقراص ذات تحرر مديد لفترة ١٢ ساعة**

(ديسلوراتادين وبسودايفيدرين كبريتات)

اقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- إنحنيط بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، ينبغي عليك طرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- هذا الدواء قد تؤديه لك فلاتر بمفعوله للأ الآخرين، فإنه قد يلحق الضرر بهم حتى لو كان لديهم نفس الأعراض التي تعاني منها.
- إذا أصببت بأي من الآثار الجانبية فإذا لاحظت أي آثار جانبية ليست مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

١. ما هو أورادوس ب وما هي دواعي استعماله
٢. ما عليك معرفته قبل تناول أورادوس ب
٣. كيفية تناول أورادوس ب
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية حفظ أورادوس ب
٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية

١. ما هو أورادوس ب وما هي دواعي استعماله

تحتوي أقراص أورادوس ب ذات التحرر المديد لفترة ١٢ ساعة على خليط اثنين من المكونات الفعالة، ديسلوراتادين وهو مضاد للهيستامين وبسودايفيدرين كبريتات وهو مضاد للإحتقان. مضادات الهيستامين تساعد على تقليل أعراض الحساسية عن طريق منع آثار مادة تسمى هيستامين، التي ينتجه الجسم. تساعد مضادات الإحتقان على إزالة الإحتقان الأنف (اسداد الأنف).

تحخف أقراص أورادوس ب ذات التحرر المديد لفترة ١٢ ساعة الأعراض المترافق مع حساسية الانف الموسمية (حمى القش)، مثل العطس، أو سيلان أو حكة الأنف وحكة العين، عندما تكون مصحوبة مع احتقان انفي عند الكبار والبالغين من ٢ سنة وأكبر.

٢. ما عليك معرفته قبل تناول أورادوس ب

- لا تتناول أورادوس ب:
- إذا كنت تعاني من حساسية على ديسلوراتادين، لوراتادين بسودايفيدرين كبريتات، الأدوية الادرينالية، أو أي من مكونات هذا الدواء (المبينة في الفقرة ٦).
- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، مرض قلبي أو عروق دموي أو سرقة سكتة دماغية.
- إذا كنت تعاني من الزرق، صعوبة في التنفس، اسداد اسالك الابولية، او فرط نشاط الغدة الدرقية.
- إذا كنت تأخذ مثبط موتو امين او كسيدايز (ماو) (فئة من الأدوية المضادة للاكتتاب) او توقفت عن تناول هذه الأنواع من الأدوية خلال الأيام ١٤ الماضية.

التحذيرات والاحتياطات:

هناك حالات معينة قد تجعلك تتحسس بشكل غير عادي من مضاد الإحتقان بسودايفيدرين كبريتات الذي يدخل في تركيب هذا الدواء.

- آخر الطبيب أو الصيدلي قبل البدء بتناول أورادوس ب:
- إذا كنت تبلغ ٦٠ عاماً من العمر أو أكثر، قد يكون كبار السن أكثر تحسساً لآثار هذا الدواء.
- إذا كنت مصاباً بداء السكري.
- إذا كنت تعاني من قرحة معوية تؤدي إلى تضييق المعدة، الامعاء الدقيقة أو المريء (قرحة هضمية متضيقة).
- إذا كنت تعاني من انسداد معوي (اسداد بواي أو اتشي عشرى).
- إذا كنت تعاني من انسداد عنق المثانة.
- إذا كان لديك مشاكل في الكبد، الكلية، أو المثانة.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني أو تم تشخيص اصابتك بأي من الحالات التالية، يجب أن تخبر الطبيب أو الصيدلي الذي سينصحك بالتوقف عن تناول أقراص أورادوس ب:
- ارتفاع ضغط الدم
- نصبات قلب سريعة
- نظم قلب غير طبيعي
- شعور بالمرض أو الصداع أو زيادة الصداع أثناء تناول أقراص أورادوس ب.
- إذا كان من المقرر ان تجري عمل جراحي، يمكن ان ينصحك الطبيب بالتوقف عن تناول أورادوس ب قبل ٢٤ ساعة.
- أحد المكونات الفعالة في أقراص أورادوس ب، بسودايفيدرين كبريتات، يمكن ان يساء استعماله والجرعات الكبيرة من بسودايفيدرين كبريتات يمكن ان تكون سامة.
- ان الاستعمال المستمر قد يؤدي لأخذ المزيد من أقراص أورادوس ب من الجرعة الموصى بها للحصول على التأثير المطلوب، حيث ينتج عن ذلك خطير الجرعة الزائدة.
- ان التوقف المفاجئ عن العلاج، يمكن ان يسبب الاكتتاب.

الفحوص المخبرية

توقف عن تناول أقراص أورادوس ب على الأقل ٤٨ ساعة قبل اجراء أي اختبار جلدي نظراً لأن مضادات الهيستامين يمكن أن تؤثر على نتيجة الاختبار.

قد تكون نتائج اختبارات المنشطات إيجابية عند الرياضيين الذين يتناولون أقراص أورادوس ب.

الأطفال والبالغين:

ينبغي عدم وصف هذا الدواء للأطفال ما دون ١٢ سنة من العمر.

أورادوس ب وأدوية أخرى:

ينبغي اطلاع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت في وقت قريب أو يمكن أن تتناول أي دوائية أخرى.

هذا الأمر ذات أهمية خاصة في حال تناول:

- ديجيتان، دواء يستعمل لعلاج بعض اضطرابات القلب

- أدوية ضغط الدم (مثلاً ميتيل دوبا، ميكيلامين، ريزرين، قلويات فيراتروم وغوانيتدين)

- مضادات الإحتقان عن طريق الفم أو الأنف (مثلاً فنيل بروبانولامين، فنيل إفرين، إفردين، أوكيسي ميتازولين، نافازولين)

- أمفيتامينات

- أدوية الصداع النصفي مثلاً قلويات الإرغوت (مثلاً دي هيدروإرغوتامين، ارغوتامين ، أو ميتيل إرغومترين)

- أدوية داء باركنسون أو العقم مثلاً بروموكربيتين، كابرغولين، ليزوريد وبيرغوليد

- مضادات حموضة لسر الهضم أو مشاكل المعدة

- دواء للإسهال يدعى كاؤلان

- مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقة (مثل فليوكستين)، مضادات هيستامين (مثل سيتريزين وفسوفينادين).

أورادوس ب مع الطعام:

يمكن تناول أقراص أورادوس ب مع أو بدون طعام.

أورادوس ب مع الكحول:

ينبغي التحدث مع الطبيب أو الصيدلي فيما يتعلق بما إذا كان يمكن شرب الكحول أثناء تناول أقراص أورادوس ب. لا يوصي بشرب الكحول أثناء تناول أقراص أورادوس ب.

الحمل والإرضاع:

في حالة الحمل أو الإرضاع، أو إذا كان هناك تفكير في إمكانية الحمل أو تحطيمه للحمل، يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي لأخذ النصيحة قبل تناول هذا الدواء.

لا يوصي بتناول أقراص أورادوس ب في حالة الحمل.

لقد تسجل انخفاض في إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات عند تناول بسودايفيدرين كبريتات، أحد مكونات أقراص أورادوس ب. ديسلوراتادين وبسودايفيدرين كبريتات كلها يفرزان في الحليب البشري.

لا يوصي بتناول أقراص أورادوس ب خلال فترة الرضاعة.

الخصوصية:

لا توجد بيانات متاحة على خصوصية الذكور والإناث.

القيادة وتشغيل الماكينات:

في الجرعة الموصى بها، من غير المتوقع أن يؤثر هذا الدواء على القدرة على القيادة أو تشغيل الماكينات.

بالرغم من أن معظم الناس لا يعلون من النعاس، من المستحسن عدم الانحراف في النشاطات التي تتطلب اليقظة العقلية، مثل قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات لحين الاستجابة للمنتج الجلي.

٣. كificية تناول أورادوس ب

ينبغي تناول هذا الدواء دائمًا حسب إرشادات الطبيب.

يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي في حال عدم التأكد.

الكبار والبالغين ١٢ سنة وما فوق:

إن الجرعة الموصى بها هي حبة واحدة مرتبة يومياً مع كوب من الماء، مع أو بدون طعام.

هذا الدواء يستخدم عن طريق الفم.

ينبغي بلع الحبة كاملة: دون سحق، كسر أو مضاعق قبل البلع.

يجب عدم تناول أقراص أكثر من الموصى به على النشرة.

يجب عدم تناول هذا الدواء لمدة أكثر من ١٠ أيام باستمرار ما لم يخبرك الطبيب أن تفعل ذلك.

في حال تناول أورادوس ب بكمية أكبر مما يجب

في حال تناول كمية أكبر مما يجب من أقراص أورادوس ب، ينبع الإتصال بالطبيب أو الصيدلي فوراً.

في حال نسيان تناول أورادوس ب

في حال نسيان الجرعة في الوقت المحدد، ينبع تناولها في أقرب وقت ممكن ثم العودة إلى الجدول الزمني العادي.

يجب عدم تناول جرعة مزدوجة للتعويض عن الجرعة المفقودة.

في حال التوقف عن تناول أورادوس ب

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية، فإن هذا الدواء يمكن أن يسبب آثاراً جانبية، ولكن ليس من الضروري أن يصاب بها كل المرضى.

لقد شوهدت الآثار الجانبية التالية بشكل شائع في الدراسات: تسارع في ضربات القلب، ارقة مع زيادة في حرارة الجسم، جفاف فم، دوخة، التهاب بالحلق، فقدان شهية، امساك، تعب، صداع، اضطرابات النوم، المصبية والنعاس.

لقد سجلت آثار جانبية أخرى غير شائعة: ضربات قلب غير طبيعية، تزايد حرارة الجسم، توهج، هبات ساخنة، خلط ذهني، رؤية مشوهة، جفاف عين، نزف.

أتفقي، تخrier أثني، عطش، مشاكل في التبول، تغير في تواتر التبول، حكة، تشقق، تناقص أحساس الشم، فحوصات الوظيفة الكبدية غير طبيعية، إثارة، قلق، هياج.

لقد سجلت الآثار الجانبية النادرة التالية: تفاعلات تحبسية شديدة (صعوبة في التنفس، أزيز، حكة، شرى ووذمة) طفح، أهبة، هلوسة، ألم عضلات، اخلاص، التهاب كبد، فحوصات الوظيفة الكبدية غير طبيعية.

إذا لوحظت أي آثار جانبية، يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي. هذا يتضمن أي من الآثار الجانبية المحتملة غير الواردة في هذه النشرة.

٥. كificية حفظ أورادوس ب

يتحقق حفظ هذا الدواء بعده من مرآي ومتناول الأطفال.

لا تستخدمنه في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية. أبعده عن الرطوبة.

لا تستخدمنه في حال ملاحظة علامات واضحة للتخرّب.

لاتقوم برمي أي دواء في مياه الصرف الصحي، أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه المعايير سوف تساعد في المحافظة على البيئة.

٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية**محتوى أورادوس ب**

- المادة الفعالة هي ديسلوراتادين وبسودايفيدرين كبريتات.

- يحوي كل قرص على ٢,٥ ملغ من ديسلوراتادين و١٢٠ ملغ من بسودايفيدرين كبريتات.

- المكونات الأخرى هي: ميكروكريستالين سليلور، شفاء جيلاكتيكي، ادتا ثائي الصوديوم، حمض الليمون، انديغوتين (١٢٢ E)، حمض الشمع، هيبرومليوز، ثانوي أوكسيد السيليكون الغروي، شمعات المنغروف.

شكل أورادوس ب ومحفوظ العبوة

أقراص اثنان في طبقتين طبقيتين يحيط بهنها شفاف.

ذات لون أزرق من جانب ولون أبيض من الجانب الآخر.

أورادوس ب متوفّر في علب تحتوي على ١٠ أو ٣٠ قرص.

حامل إذن التسويق والشركة المصنعة

فارمالين ش.م.ل. - لبنان

صندوق بريد ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

للتواصل معنا: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

هذه المنتج هو دواء

الدواء منتج يُؤثر على محتوى دمك ويُنصح بتناوله على مدار يومي.

يجب اتباعه وتحليمه بشكل يناسبك ودمك وفقاً لطريق الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي يعطيك الدواء.

الاطباء والصيادلة خبراء في الأدوية ونطقوها ومخذلتها.

لا توقفوا قطعاً العلاج المحدد لكم من تناقضه تسلكه.

لا تقوموا بتكرار الوصفة الطبية من دون استشارة الطبيب.