

إيكاسيل®

0.5 g/5 ml

حامض ترينيكرايميك
 محلول الحقن (الوريدي)

- الرجال، أن تقرأ بدقة هذه النشرة كاملة قبلتناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.

- في حال كان لديك أسلمة أخرى أو شكلوك، ما، استرش طبيبك أو صيدلي المزدوج من المعلومات.

- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لأي أحد آخر حتى ولو كانت عوارضه مثل عوارضك لأنه قد يسبب له الآذى.

التعريف بدواء

التركيز

حامض ترينيكرايميك..... 0.5 g.....

الأسوجة: حامض كوليوريديك مركز بكمية كافية للحصول على حموضة 7.0 - 7.5 ماء لإعداد محليل الحقن بكمية كافية للحصول على 5 مل.

الشكل الصيدلي والتقدم

محلول الحقن الوريدي
علبة من 5 أمولات من 5 مل

التصنيف الصيدلي العلاجي
مضاد لانحلال الليفيين

حامل الرخصة/الموزع

sanofi-aventis france
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris - France

المصنع

Sanofi Winthrop Industrie
6, boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny - France

الحالات التي تستدعي استخدام هذا الدواء

هذا الدواء هو عامل مضاد للتزيف يوصى به لمعالجة بعض أنواع النزف.

تنبيه!

الحالات التي تمنع استخدام هذا الدواء
لا يجوز استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:

* إذا كنت تعاني أو عانيت سابقًا من تجمد الدم الشرياني أو الوريدي (الثقب الوريدي، انصمام رئوي، نوبة صدرية، احتشاء

عضلي قلبي، سكتة دماغية).

* التجلط المترافق داخل الأوعية (اضطرابات حادة في تجلط الدم).

* القصور الحاد في وظيفة الكلى

* إن كنت تعاني أو عانيت سابقًا من احتلالات.

* الحقن في الطبلتين وداخل الغمد وداخل المخ (إذا كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ).

* في حال الشك، لا بد من طلب رأي طبيبك أو الصيدلي.

التغيرات الخارضة

لا يجوز حقن الدواء عبر العضل.

لا يجوز حقن الدواء في الطبلتين أو داخل الغمد أو داخل المخ (إن كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ)

كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ

أعلم طبيبك.....

* إذا كنت تعاني أو عانيت سابقًا من احتلالات أو إذا كنت تأخذ دواء مضاداً للصرع

* إن كان لديك أثار دم في البول،

* إن كنت تتناولين مواد حمل قوية أو تتضمنين لعلاج بديل بالبوريومات لانقطاع المenses.

أعلم طبيبك فوراً في حال ظهور العوارض التالية:

* لم غير اعتيادي في الطبلتين، ضغف في الأطراف، ألم في الصدر، نبض ضعيف، ضيق نفس مفاجئ، فقدان وعي، احتلالات دهني،

* صداع حاد غير اعتيادي، دوار، اضطرابات بصيرة، بطيء في

التنفس أو فقدان القدرة على النطق.

* أيق دائماً الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

احتياطات الاستخدام

تعذر الجرعة لدى المرضى الذين يعانون من احتلال مزمن في وظيفة الكلى.

في حال الشك، لا تتردد في استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

التفاعلات مع الآدوية وتفاعلات أخرى

للقادري التفاعلات المحمومة بين عدة آدوية، يجرد بك تلقائياً إعلام الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تتناول أي آدوية أخرى.

الحمل والرضاعة

هذا الدواء عدم إستعمال هذا الدواء خلال الفصل الأول من فترة الحمل.

الرعاية

إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشيري طبيبك في أسرع وقت ممكن، لأن وحدة القادر على تكيف العلاج مع حالتك الصحية.

لا ينصح بالإرضاخ أثناء العلاج.

بصورة عامة، يجب عليك دامماً استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل والإرضاخ.

سائق السيارات وممنوع الآلات
يجب لفت انتباه سائق السيارات ومت Specialty الآلات إلى مخاطر الإصابة بالدوران بعد تناول هذا الدواء.
كيفية استخدام هذا الدواء

الجرعات
لدى البالغين، لا يجوز تخطي 4 غ كل 24 ساعة
في الحالات كافة، يجب التقى تقدماً صارماً بوصفة الطبيب.

طريقة ووسيلة تناول الدواء
عن طريق الحقن في الوريدي، حقن بطيء وصارم.

وتيرة وأوقات استخدام الدواء
يُقسم إلى حقتين أو 3 حقات كل 24 ساعة.

مدة العلاج
في الحالات كافة، يجب التقى تقدماً صارماً بوصفة الطبيب.

الآثار الجانبية غير المرغوبه والمزعجة
مثل كل مستحضر ضائع، قد تؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص، إلى حدوث رذرات فعل مزعجة بعض الشيء؛
ردات الفعل هذه نادرة وقد تتضمن العوارض التالية:

* غثيان وقيء،
* إسهال،
* توسيع مع هبوط في ضغط الدم، يمكن أن يرافقه فقدان وعي،
* احتقاح،
* تفاعلات مع النوع التحسسي (صدمة استهدافية، شرى أو خرب،
وعائي، طفح جلدي)،
* عوارض انصمام خارجي تكون خثارات في الدم (يمكن أن تصيب أي قسم من الجسم،
الرجل أن تعلم طبيبك أو الصيدلي بأي رد فعل غير مرغوبه
ومزعجة غير مذكورة في هذه النشرة).

الحفظ

لا تتحفظ تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.

احتياطات خاصة للحفظ
يُحفظ الدواء في مكان تقل حرارته عن 25 درجة مئوية.

160986

تاريخ مراجعة النشرة
حزيران 2005