

Sustanon®**سوستانون®****الاستخدام غير اللائق**

استخدام الأندروجين بصورة خاطئة لتعزيز القدرة في الألعاب الرياضية يحمل مخاطر صحية كبيرة ولا يُنصح به.

استخدام أدوية أخرى

قد تؤثر الأدوية الأخرى على مفعول سوستانون ٢٥٠، أو قد يؤثر سوستانون ٢٥٠ على الأدوية الأخرى. يجب أن تخبر طبيبك الخاص أو الصيدلي إن كنت تستخدم (أو تنوى استخدام) أدوية مضادة لمرض السكر أو مضادة للتجلط.

كيفية استخدام سوستانون ٢٥٠

يُعطى هذا الدواء بواسطة طبيب أو مرضة فقط.

تعطى الحقن بعمق في العضل (على سبيل المثال في الأرداف، أعلى الساق أو أعلى الذراع). عادةً ما تكون الجرعة حفنة واحدة ١ مللي كل ثلاثة أيام.

إن كان لديك اخبطاع أن مفعول سوستانون ٢٥٠ قوي جداً أو ضعيف جداً، تحدث مع طبيبك فوراً.

إن استخدمت سوستانون ٢٥٠ أكثر مما ينصح:

لا ينطبق.

إذا نسيتأخذ سوستانون ٢٥٠ :

لا ينطبق.

الأثار عند وقف العلاج بسوستانون ٢٥٠ :

آثار سوستانون لا تتوافق مباشرةً عند وقف العلاج، لكنها تتراجع تدريجياً.

الأثار الجانبية المحتملة

شأنه شأن جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب سوستانون ٢٥٠ في آثار جانبية.

الأثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها مع العلاج بالستوستيرون بصفة عامة هي:

• حكة.

• حب الشباب.

• غثيان.

• تغير في اختبارات وظائف الكبد.

• تغير في مستويات الكوليستيرول (تغير في أيض الدهون) :

• اكتئاب، عصبية، اضطرابات مزاجية.

• أمراض العضلات (ألم عضلي) :

• احتجاز السوائل بالأنسجة، تتميز عادة بتورم الكاحل أو الأقدام؛

• ارتفاع ضغط الدم.

• زيادة في عدد خلايا الدم الحمراء (الخلايا التي تحمل الأكسجين في دمك)

• تغير في الرغبة الجنسية:

• انتصاب متعد غير طبيعي ومؤلم للقضيب؛

• اضطراب في تكوين السوارات المنوية؛

• ظهور سمات أنوثة (تضخم في الثدي)؛

• نمو البروستاتا حرجاً مملاً للمجموعة العصرية المعنية؛

• زيادة في نمو ورم سرطاني غيري بالبروستاتا (ارتفاع PSA)؛

• زيادة في نمو ورم سرطاني غيري بالبروستاتا لم يتم بعد اكتشافه (تطور لورم سرطاني دون إكتينيك بالبروستاتا).

نظرًا لطبيعة سوستانون ٢٥٠، لا تتعكس الآثار الجانبية بسرعة عند وقف الدواء. الأدوية المحظوظة بصفة عامة قد تتسبب في تفاعل مرضي في مكان الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية لم يرد ذكرها في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك الخاص أو الصيدلي.

تخزين سوستانون ٢٥٠

يُحفظ سوستانون ٢٥٠ بعيداً عن متناول ومرأى الأطفال.

إذا كان لديك مزيد من الأسئلة أو تطلب المعلومات التفصيفية الكاملة الخاصة بسوستانون ٢٥٠، برجهاء استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

ان. ف. أورجانون،
٦ كولسترشتر،
٥٤٣٩ اي بي اوين، هولندا

آخر مراجعة لهذه النشرة في يونيو ٢٠٠٦

إن هذا الدواء

الدواء مستحضر يوثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبراء بالدواء وبينهم وضرره.

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من نقاط نسake.

لا تكرر дование بدون وصفة طبيب.

لا ترك الدواء في متناول أيدي الأطفال.

برجاء قراءة كل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باخذ هذا الدواء.

• احتظر بهذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك مزيد من الأسئلة، برجهاء سؤال طبيبك الخاص أو الصيدلي.

• لقد تم وصف هذا الدواء لك شخصياً ولا ينبغي أن تعطيه لآخرين، قد يسبب ضرر

لهم، حتى لو كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في هذه النشرة:

١- ما هو سوستانون ٢٥٠ وفيم يستخدم

٢- قبل استخدام سوستانون ٢٥٠

٣- كيفية استخدام سوستانون ٢٥٠

٤- الآثار الجانبية المحتملة

٥- تخزين سوستانون ٢٥٠

سوستانون ٢٥٠، محلول للحقن.

• المادة الفعالة هي: استيرات التستوستيرون

كل مليلتر من المحلول الذي يحتوى على:

٣٠ مجم (مليجرامات) بروبيونات التستوستيرون

٦٠ مجم فينيل بروبيونات التستوستيرون

٦٠ مجم ايرو كابرات التستوستيرون

١٠٠ مجم ديكانوات التستوستيرون

• المكونات الأخرى هي:

محلول الحقن يحتوى على زيت الأراكن والكحول البنزيلي.

١- ما هو سوستانون ٢٥٠ وهو يستخدم

تتحول المواد الفعالة لسوستانون إلى تستوستيرون في جسمك. تستوستيرون هو الهرمون الذكري الطبيعي الذي يفرز بواسطة الخصيتيين، وهو ضروري للنمو الطبيعي، التطور ووظيفة الأعضاء الجنسية الذكرية والخصائص الثانوية الذكرية الجنسية. إنه ضروري لنمو شعر الجسم، تطور العظام والعضلات، وهو يحفز انتاج خلايا الدم الحمراء، إنه يعمل أيضاً على تقليل مستوى الرجال. تستخدم المستحضرات التي تحتوى على تستوستيرون في تقويض التستوستيرون عند الأشخاص الذين يعانون من عدم وجود تستوستيرون طبيعي أو قليل (وهي حالة معروفة بالقصور الناتجي).

سوستانون ٢٥٠ محلول للحقن، محلول شفاف، لونه أصفر باهت.

٢- قبل استخدام سوستانون ٢٥٠، لا تستخدم سوستانون ١٤٠، ٢٠٠،

• كان لديك الآن في أي وقت مضى ورم بالبروستاتا أو التندى

• تعانى من حساسية تجاه واحد أو أكثر من مكونات المنتج

• تبلغ أقل من ٣ سنوات

٣- تعامل بعناية خاصة مع سوستانون ٢٥٠

المتابعة الفاتحة من جانب الطبيب ضرورية لعلاج الميغة الصغار بما أن استخدام

الستوستيرون يمكن أن يتسبب في تطور منسبي مبكر واضطراب في النمو. المتابعة

الافتتاحية من جانب الطبيب ضرورية أيضاً في المرضى المتسنين، بما أن الهرمونات الذكرية

يمكن أن تزيد من حجم غدة البروستاتا. بالإضافة لذلك، سيمت عمل اختبارات دم على

فترات منتظمة، للتأكد من مستوى المادة الخامala للأكسجين في خلايا دمك الحمراء

(الهيوجلوبين). في حالات نادرة جداً، يزيد عدد خلايا الدم الحمراء بصورة مفرطة

ما يؤدي إلى مضاعفات. قد تكون الفحوصات الطبية ضرورية أيضاً في بعض الحالات

الأخرى. لذلك، لذلك، ابلغ طبيبك إن كان لديك الآن في أي وقت مضى:

• مرض بالقلب؛

• مرض الكلى؛

• مرض كبد؛

• ارتفاع في ضغط الدم؛

• شوك في البروستاتا، على سبيل المثال مشاكل في ادرار البول.

إذا كنت تعانى من ارتفاع النوم (ارتفاع مؤقت بالتنفس أثناء النوم)، قد يزداد

هذا الأمر سوءاً بسبب استخدامك لم المنتجات التي تحتوى على المستوستيرون. اخبر طبيبك

إن كنت قلقاً بهذا الشأن.

٤- استخدام سوستانون ٢٥٠ مع الطعام والشراب

لا ينطبق.

الحمل

استشر طبيبك الخاص أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

إذا كنت حاملاً، أو تطئين إنك ربما حامل، لا تستخدمي سوستانون ٢٥٠.

الرضاعة

استشر طبيبك الخاص أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

إذا كنت ترضعين، لا تستخدمي سوستانون ٢٥٠.

القيادة واستخدام الآلات

على قدر ما هو معروف، سوستانون ليس له آثار مناوية على الانتباة أو الترکيز.

معلومات مهمة يخصosity بعض مكونات سوستانون ٢٥٠

يحتوى سوستانون على الكحول البنزيلي لذلك لا يجب اعطائه للأطفال الذين يبلغون

أقل من ٣ سنوات.