

أجوات

أجوات
أجوات 40 ملجم
أجوات 80 ملجم
أجوات 120 ملجم
فييو كسوستات

قم بقراءة هذه النشرة جيدا قبل تناول هذا الدواء.

– احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقا.

– في حال كان لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

– إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصا لك بناء على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص فقد تسبب له الأذى حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

– قم بالأصاا لطبيبك أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتي هذه النشرة على:

1- ما هو أجوات و ما هي ادواعي استعماله.

2- قبل القيام بتناول أجوات.

3- طريقة استخدام أجوات.

4- الأعراض الجانبية.

5- ظروف تخزين أجوات.

6- معلومات إضافية.

1- ما هو أجوات و ما هي ادواعي استعماله

تحتي أقراص أجوات علي المادة الفعالة (فيوكسوستات) والتي تستعمل لعلاج حالات النقرس و هي حالات نتجم عن حدوث زيادة في تركيز مادة كيميائية تدعى حمض اليوريك (يورات) داخل جسم الإنسان. إن حالة بعض المرضى تصبح كمية حمض اليوريك في الدم مرتفعة جدا فبدأ بالتربس، وعند ذلك تبدأ بالوروث يورات بالتكون في كل من المفاصل والكلي وحوهلها. هذه البلورات قد تسبب بشكل مفاجيء؛ حدوث ألم شديد، احمرار، سخونة وتورم في المفصل (تدعى توية النقرس). إن إهمال علاج هذه الحالات يؤدي إلى تكون تراكمات كبيرة تدعى حصية (توفي) في المفاصل وحوهلها. هذه الحصية قد تؤدي إلى التسبب بحدوث تلف في المفصل والعظم.

أجوات يعمل على تقليل مستوى تركيز حمض اليوريك في الدم. إن المحافظة على هذا المستوى المنخفض من تركيز حمض اليوريك باستخدام أجوات مرة واحدة يوميا يمنع من تكون هذه البلورات ومع مرور الوقت تبدأ الأعراض بالاختفاء. كما أن المحافظة على مستوى تركيز حمض اليوريك منخفضا في الدم لفترة زمنية طويلة يؤدي أيضا إلى تقلص حجم الحصية.

يستخدم أجوات 120 ملجم أيضا لعلاج ومنع ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم الذي قد يحدث عند البدء في تلقي العلاج الكيميائي لسرطان الدم.

عندما يتم إعطاء العلاج الكيميائي، ويتم تدمير الخلايا السرطانية، قد تزيد مستويات حمض اليوريك في الدم تبعاً لذلك، ما لم يتم منع تكوين حمض اليوريك.

أجوات هو دواء للبالغين.

2- قبل القيام بتناول أجوات.

مواع تناول أجوات

• إذا كنت تعاني من فرط الحامض (التائق) من مادة فيوكسوستات أو لأي من مكونات أجوات الأخرى.

الإحتياطات عند تناول أجوات

قم باستشارة طبيب قبل البدء بتناول أجوات إذا:

• كنت مصابا أو أصبت سابقا بقصور القلب أو بحدوث مشاكل في القلب.

• إذا كان لديك أو كنت تعاني من مرض الكلي / أو رد فعل حساسية خطير للابويورينول (وهو دواء يستخدم لعلاج النقرس).

• إذا كان لديك أو كنت تعاني من مرض كبدى أو اضطرابات في اختياريات و وظائف الكبد.

• كنت قد خضعت سابقا للعلاج من ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم الناتج عن الإصابة بالسرطان أو متلازمة ليش نيهان (مرض وراثي نادر الحدوث يتميز بارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم).

• كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.

• إذا حدث لك تجربة رد فعل حساسية تجاه أجوات، توقف عن تناول هذا الدواء (انظر أيضا القسم 4).

الأعراض المحتملة من الحامضية قد تكون:

• الطغخ الجلدى بما في ذلك أشكال حادة (مثل بثور أو عقيدات، حكة، طفح متقرش)، والحكة

• تورم في الأطراف أو الوجه

• صعوبات في التنفس

• الحمى مع تضخم الغدد الليمفاوية

• ولكن أيضا حالات حساسية خطيرة تهدد الحياة مع السكتة القلبية والدورة الدموية.

قد يقرر الطبيب إلى إيقاف العلاج بـ أجوات بشكل دائم.

كانت هناك تقارير نادرة من الطغخ الجلدي مهددة للحياة (متلازمة ستيفنز جونسون) مع استخدام أجوات، والتي تظهر في البداية ك بقع حمراء تشبه الهدف أو البقع البثرية في كثير من الأحيان مع طفح المركزية على العنق. ويمكن أن تشمل أيضا تقرحات في الفم والحلق والألف والأعضاء التناسلية والتهاب الملتحمة (عين حمراء ومنتفخة). قد يتطور الطغخ الجلدى إلى ظهور تقرحات أو تقرح الجلد على غطاء واسع.

إذا حدث لك متلازمة ستيفنز جونسون مع استخدام فيوكسوستات، يجب أن لا تتناول أجوات مرة أخرى في أي وقت. إذا حدث لك طفح جلدى أو هذه الأعراض الجلدية،اطلب المشورة الفورية من طبيبك وق له أنك تتناول هذا الدواء.

• كنت تتعرض حاليا لتوية نقرس (توية مفاجئة من الألم الشديد، التشنج، الاحمرار، السخونة، و تورم المفاصل) انتظر حتى تنتهي التوية لديك قبل البدء بتناول أجوات.

في حالة عرض المرضى قد يصاحب البدء بتناول أدوية من مجموعة الأدوية المنخفضة لحمض اليوريك في الدم حدوث توبات شديدة من النقرس (توهجات). لكن ليس بالضرورة حدوث ذلك في حالة جميع المرضى. لذا قد يصاحب تناول أجوات حدوث توبات شديدة من النقرس (توهجات) خصوصا خلال الأسابيع والأشهر الأولى من بدء العلاج. من المهم جدا الاستمرار في تناول أجوات حتى لو تحدثت لك مثل هذه التوبات عند تناول أجوات. لأن أجوات سيقوم بتخفيض مستوى حمض اليوريك لديك مع مرور الوقت ستخفف حدة توبات النقرس كما سيقبل معدل تكرارها في حالة استمرارك بتناول أجوات.

كما أن طبيبك سوف يقوم بوصف أدوية أخرى مع أجوات إذا كنت بحاجة إلى ذلك لتخفيف أو منع ظهور أعراض توية النقرس (مثل أعراض الألم وتورم المفصل). قد يطلب منك طبيبك القيام بفحص مستويات أنزيمات الكبد في الدم للتأكد من عمله بشكل طبيعي.

الأطفال والمرافقين

لا تعطى الدواء للأطفال تحت سن 18 سنة لأنه لم يتم تأسيس السلامة والفعالية.

التداخلات الدوائية من أخذ هذا الدواء مع أي أدوية أو أعشاب أو مكملات غذائية فضلا أغير الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخرا أي دواء آخر يشمل ذلك الأدوية التي تصروف بدون وصفة.

ترداد أهمية ذلك لأن بخير طبيبك أو الصيدلي ليقيم بالإجراء المناسب إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية:

• ميركاتوبورين (يستخدم في علاج السرطان).

• آزوثيوبورين (يستخدم كعلاج لتقليل الاستجابة المناعية).

• ثيوفولين (يستخدم في علاج الربو).

إذا قد تحدث بعض التداخلات الدوائية وذلك عند تناول أجوات بشكل متزامن مع هذه الأدوية.

تناول أجوات مع الطعام والشراب
يجب تناول أجوات عن طريق الفم. ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه.

الحمل والرضاعة

من غير المعروف فيما إذا كانت مادة فيوكسوستات تؤدي الأجنة.

استشرى طبيبك على الفور إذا أصبحت حاملا، أو كنت تكترين أو تخطفئين للحمل أثناء تناول أجوات. يجب عدم تناول أجوات في حالة الحمل.

من غير المعروف فيما إذا كان مادة فيوكسوستات تفرز في حليب الأم.

يجب عدم تناول أجوات في حالة الإرضاع أو إذا كنت تخطفئين للإرضاع.

تأثير أجوات على القيادة واستخدام الآلات

لم يتم دراسة تأثير مادة فيوكسوستات على قدرة الإنسان على القيادة واستخدام الآلات. بالرغم من ذلك يجب أخذ الحيطه والحذر وعدم القيادة واستخدام الآلات إذا شعرت بالدوخة، النعاس والتنبثل أو الإحساس بالخزخز عند تناول أجوات.

معلومة هامة حول بعض مكونات أجوات

يحتوي أجوات على لانتروز. استشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء، إذا كان قد أخبرك سابقا بأنك تعاني من مشكلة عدم التحمل لبعض أنواع السكر.

3- طريقة استخدام أجوات

دائما يتوجب عليك تناول أجوات حسب الجرعة الموصوفة من قبل طبيبك، لذا يتوجب عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي في حالة عدم تأكدك من الجرعة.

• الجرعة عادة تكون حبة واحدة يوميا.

• يجب تناول أجوات عن طريق الفم، ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه.

النقرس:

أجوات متوافر على هيئة أقراص بترابزو 40 ملجم، 80 ملجم أو 120 ملجم.

إن طبيبك سوف يقوم بتحديد التركيز المناسب لحالتك.

دوام على تناول أجوات كل يوم حتى لو كنت تعاني من توية نقرس.

الوقاية والعلاج من ارتفاع مستويات حمض اليوريك في المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي لسرطان

أجوات متوفر على هيئة أقراص بتركيز 120 ملجم.

ابدأ بتناول أجوات قبل يومين من العلاج الكيميائي واستمر باستخدامه وفقا لمشورة الطبيب. يكون

العلاج عادة على المدى القصير.

يجب عدم التوقف عن تناول أجوات ما لم يطلب منك طبيبك ذلك.

استمرعلى تناول أجوات بشكل يومي حتى في الفترات التي لا تعرض فيها لتوبات نقرس أو توهجات.

الجرعة الزائدة من أجوات

في حالة تناولك جرعة زائدة من أجوات بالخطأ، اتصل بطبيبك أوإذهب إلى أقرب وحدة طوارئ في الحال.

نسيان تناول جرعة من أجوات

في حالة نسيان جرعة من أجوات تناول هذه الجرعة فور تذكرها إلا إذا كان ذلك في وقت الجرعة التالية في هذه الحالة خذ الجرعة التالية فقط وأكمل كالمعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها.

التوقف عن تناول أجوات

لا تتوقف عن تناول أجوات ما لم يطلب طبيبك منك ذلك حتى لو شعرت بالتحسن. إن التوقف عن تناول أجوات قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك لديك من جديد وبالتالي تبدأ الأعراض

بالظهور من جديد أو قد تزداد سوءا نتيجة لتكون بلورات يورات جديدة في كل من المفاصل والكلي وحوهلها.

إذا كانت لديك أية استفسارات إضافية حول هذا الدواء فضلا استشر طبيبك أو الصيدلي.

4- الأعراض الجانبية

كما هو الحال في جميع الأدوية، فإن تناول أجوات قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي ليس بالضرورة أن تظهر عند كل من يتناول أجوات.

توقف عن تناول هذا الدواء واتصل بطبيبك فوراً أو اذهب إلى قسم الطوارئ في مكان قريب إذا حدث أى من الأعراض الجانبية النادرة (قد تؤثر على ما يصل إلى 1 في 1000 شخص). لأن رد فعل تحسسي خطير قد يتبع ذلك:

• ردود فعل تحسسية، وفرط حساسية للأدوية (انظر أيضا القسم 2 «تحذيرات واحتياطات»)

• الطغخ الجلدى المهدد للحياة الذي يتميز بتكوين بثور وسفك الجلد والأسطح الداخلية للتجويف الجسم، على سبيل المثال. الفم والأعضاء التناسلية وقرح مؤلمة في الفم و / أو المناطق التناسلية، يرافقه حكة، والتهاب الحلق وتعب (متلازمة ستيفنز جونسون / احتلال البشرة السام)، أو عن طريق تضخم الغدد الليمفاوية، تضخم الكبد، والتهاب الكبد (إلى فشل الكبد)، زيادة عدد خلايا الدم البيضاء (رد فعل الأدوية ب فرط الحساسية وأعراض الطفامية) (انظر القسم 2).

• الطغخ الجلدي المعمم.

أعراض جانبية شائعة (سجل ظهورها بمعدل أكثر من حالة لكل مئة مريض ولكن أقل من حالة لكل عشرة مرضى):

• تغيرات في نتائج قيم اختبارات وظائف الكبد في الدم.

• الإسهال.

• الصداع.

• طفح جلدي.

• الغثيان.

• زيادة في ظهور أعراض النقرس.

• تورم موضعي بسبب احتباس السوائل في الأنسجة (وذمة).

أعراض جانبية غير شائعة (سجل ظهورها بمعدل أكثر من حالة لكل ألف مريض ولكن أقل من حالة لكل مئة مريض):

• فقدان الشهية، تغير مستويات السكر في الدم (يشبه السكري) و الذي قد تكون اعراضه زيادة الشعور بالعطش، ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

• فقدان الدافع الجنسي.

• صعوبة في النوم، الأرق.

• دوخة، خدر، وخز، اختلال في الإحساس (كلال الحس اللمسي أو التمثل)، اختلال أو ضعف في حاسة السمع.

• تغيرات في قيم التخطيط الكهربائي للقلب (ECG)، اختلالات في نظم القلب، الشعور بنض القلب.

• توردات ساخنة أو احمرار (مثل احمرار الوجه أو الرقبة)، ارتفاع ضغط الدم.

• معال، فقدان السمع، ألم أو ضيق في الصدر، التهاب الغانة التنسية و / أو الحنجرة (التهاب الجهاز التنفسي العلوي)، التهاب القصبات الهوائية.

• خنق الفم، ألم في البطن / اضطرابات أو ريع، حرقة الفؤاد/ عسر الهضم، الإمساك، التبرز المتكرر، فقر، ضيق في المعدة.

• حكة شري، التهاب الجلد أو تضخمه، أشكال أخرى من مشاكل الجلد.

• تشنج العنجل، ضعف العنجل، ألم / حكة في المفاصل والمضلات، التهاب كبسي أو التهاب المفاصل يكون مصحوبا عادة بألم، تورم و أو تضصلب، ألم في الأطراف، ألم في الظهر، تشنج عضلي.

• وجود دم في البول، تبول متكرر بشكل غير طبيعي، تغيرنتائج قيم فحص البول (زيادة مستويات البروتين في الدم)، وضعف في وظائف الكلي

• تعب، تورم موضعي نتيجة لعودة السوائل إلى الأنسجة (وذمة)، ألم في الصدر، ضيق في الصدر. تكون حصي في المرارة أو القناة الصفراوية (الحصى الصفراوية).

• تغيرات في نتائج قيم اختبارات كيمياء الدم أو عد كريات الدم والصفائح الدموية (اختلال قيم فحوصات الدم).

• حمى الكلي.

• صعوبات الانصاب.

أعراض جانبية نادرة (سجل ظهورها بمعدل أكثر من حالة لكل 10.000 مريض ولكن أقل من حالة لكل ألف مريض):

• عفاطات فرط الحامض (مثل طفح الجلد، الحكة، التورم).

• طفح الجلد المتعمم.

يجب عليك أن تتوقف عن تناول أجوات وتراجع الطبيب في الحال إذا ظهرعندك أي من الأعراض الجانبية السامة؛ فقد تكون علامات لحدوث تفاعلات فرط تحسس خطيرة.

• الحمى.

• الشعور بالعطش.

• صعوبة الانتصاب.

• طنين في الأذن.

• تساقط الشعر.

• تقرحات في الفم.

• التهاب البكتيريان؛ ومن أعراضه ألم في البطن، غثيان، قيء.

• زيادة العرق.

• تغير الوزن (زيادة أو نقصان)، زيادة الشهية، فقدان الشهية غير المسيطرعليه (قلة الشهوة للطعام).

• تشنج المفاصل و / أو العضلات.

• انخفاض غير طبيعي في عد كريات الدم (كريات الدم البيضاء أو كريات الدم الحمراء).

• الحاجة الملحة للبول.

• تغيرات أو نقص في كمية البول بسبب التهاب في الكلي (التهاب الكلية الأنويبي القراحي).

• التهاب الكبد (التهاب الكبد).

• اصفرار الجلد (اليرقان).

• فلف الكبد.

إذا ازدادت شدة إحدى هذه الأعراض ، أو أصبت بأية أعراض جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة، أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي.

5- ظروف تخزين أجوات

يخفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

6- معلومات إضافية

ما هي محتويات أجوات؟

المادة الفعالة: فيوكسوستات. كل قرص مغلف بطبقة رقيقة يحتوي على 40 ملجم، 80 ملجم، 120 ملجم فيوكسوستات.

المكونات الأخرى:

حشوة القرص: لانتروز، ميكروكريبتالين سيليلوز، ستيرات المغنسيوم، هيدروكسي بروبيل سيليلوز، كروسكولموزور الصوديوم، ثنائي أوكسيد السيليكون الغرواني.

قدرة القرص: أوباديرتي 0V-37202صعبة غامقة، ماء نقي.

ما هو الشكل الصيدلاني لمستحضر أجوات ووصفه وحجم عبوته:

إن أجوات ٤٠ متوافر على شكل أقراص مغلفة بطبقة رقيقة ذات شكل مستطيل محدد الوجهين لونها يتراوح بين اللون البني الفاتح والبني، منقوش على احدي جانبيها رقم «٢٢» وجليية السطح على الجانب الأخرى.

إن أجوات ٨٠ متوافر على شكل أقراص مغلفة بطبقة رقيقة ذات شكل مستطيل محدد الوجهين لونها يتراوح بين اللون البني الفاتح والبني، منقوش على احدي جانبيها رقم «٢٣» وجليية السطح على الجانب الأخرى.

إن أجوات ١٢٠ متوافر على شكل أقراص مغلفة بطبقة رقيقة ذات شكل مستطيل محدد الوجهين لونها يتراوح بين اللون البني الفاتح والبني، منقوش على احدي جانبيها رقم «٢٤» وجليية السطح على الجانب الأخرى.

في عبوات سعة ٣٠ قرص مغلف بطبقة رقيقة.

إنتاج الدوائية

مصنع الأدوية بالقصيم

الشركة السعودية للمصانع الدوائية والمستلزمات الطبية.

المملكة العربية السعودية

النسخة: 1.

تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ فبراير 2017.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية
– المركز الوطني للتبقيط والسلامة الدوائية:
فاكس: +966 11 2057662
للاتصال بالأداة التنفيذية للتبقيط و إدارة الأزمات.
هاتف: +966 11 2038222 تحويلة: 2340-2353-2317-2345-2334
الهاتف المجاني: 8002490000
البريد الالكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa
الموقع الإلكتروني: www.sfd.a.gov.sa/npc

إن هذا الدواء

– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

– اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الموصوف عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

– الطبيب والصيدلاني هما الخياران بالذواء وينبغي وضروه.

– لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

– لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

و اتحاد الصيدالاة العرب