

## قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل إستعمال أو تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالإتصال بطبيبك المعالج أو مقدم الرعاية الصحية في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

### في هذه النشرة:

١. ما هو هذا الدواء وقيم يستخدم.
٢. قبل تناول هذا الدواء.
٣. كيفية تناول هذا الدواء.
٤. الآثار الجانبية المحتملة.
٥. كيفية تخزين هذا الدواء.
٦. مزيد من المعلومات.

### ١. ما هو هذا الدواء وقيم يستخدم.

يحتوي هذا الدواء على الجلوكوز والأملاح المختلفة التي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى الالكترولايت والتي تؤخذ عن طريق الفم وتعمل على استبدال السوائل والمعادن والكربوهيدرات (مثل الصوديوم واليوتاسيوم دكستروز) المفقودة بسبب الإسهال والقيء. يساعد على منع أو علاج فقدان الكثير من ماء الجسم (الجفاف). وجود كمية مناسبة من السوائل والمعادن أمر مهم للأداء الطبيعي للجسم.

### ٢. قبل تناول هذا الدواء.

يمكن تناول هذا الدواء من قبل البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة. ومع ذلك ، لا ينبغي إعطاء هذا الدواء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة ما لم ينصح الطبيب بذلك. إذا كان طفلاً صغيراً (وخاصة طفل يقل عمره عن ٦ أشهر) مصاب بالإسهال و / أو يجب طلب المشورة من الصيدلي أو الطبيب أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية. إذا كان الإسهال و / أو المرض شديداً ، فيجب على الطبيب أن يرى الطفل في أسرع وقت ممكن.

لا تأخذ بيبي لايت إذا:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات
- إذا كنت تعاني من الجفاف الشديد
- إذا كان لديك انسداد جزئي أو كامل (انسداد) في الأمعاء
- إذا كنت تعاني من بيلة الغنيل كيتون (يحتوي هذا الدواء على الأسبارتام ، وهو مصدر للغنيل ألانين)
- إذا كنت تعاني من عدم تحمل بعض السكريات ، إلا إذا أخبرك الطبيب بذلك (تحتوي كل كيس على ٣,٥٨ غرام من الجلوكوز)!
- تحدث إلى الصيدلي أو الطبيب:
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ، بما في ذلك إنتاج القليل من البول أو عدمه. • إذا كنت تعاني من الإسهال والمرض الحاد والمستمر.
- إذا كنت تعاني من مرض السكري
- إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً قليل الملح (الصوديوم) (تحتوي كل كيس على ٢٧٦ ملغ من الصوديوم ، مما قد يضر بك)
- إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً منخفض اليوتاسيوم (تحتوي كل كيس على ١٥٧ ملغ من اليوتاسيوم ، مما قد يضر بك)
- يمكنك تناول هذا الدواء إذا كنت حاملاً ومرضعاً.

### المحاذير والإحتياطات

محظور في المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لأي من المكونات.

العلاج عن طريق الفم غير مناسب في حالات مثل الجفاف الشديد ، وهو ما يتطلب علاج السوائل

الوريدية أو انسداد الأمعاء. إذا لم يكن هناك تحسن خلال ٢٤-٤٨ ساعة فيجب استشارة الطبيب.

للرضع دون سن ١٢ شهراً ، استخدم فقط مع المشورة الطبية.

في حالة وجود غثيان وقيء مع الإسهال ، فيجب شرب كميات صغيرة ولكن متكررة من بيبي لايت في البداية.

للاستخدام في كبار السن لا توجد احتياطات محددة ضرورية. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر عند إعطاء محاليل الجلوكوز الالكترولايت في حالات القصور الكلوي أو الكبدية الوخيم أو الحالات الأخرى التي قد يتم فيها توزيع توازن الإلكتروليت الطبيعي.

الإشراف الطبي ضروري في المرضى الذين يعانون من مرض كلوي ، بما في ذلك انقطاع البول وقلة البول لفترات طويلة.

هذا المنتج يحتوي على سكر العنب(دكستروز). المرضى الذين يعانون من سوء امتصاص السكر النادر الجلوكوز لا ينبغي أن يأخذون هذا الدواء.

### الأدوية الأخرى وهذا المنتج.

ليس من المتوقع أن يؤثر هذا الدواء على أي أدوية أخرى قد تتناولوها. إذا كنت غير متأكد من التفاعلات مع أي أدوية ، فتحدث إلى الصيدلي. يشمل ذلك الأدوية التي يصفها طبيبك والأدوية التي اشتريتها لنفسك ، بما في ذلك العلاجات العشبية والمثلية.

### الحمل والرضاعة الطبيعية

اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

### الحمل

إذا كنت تعتقد أنك من المحتمل أن تكوني حامل ، أخبر طبيبك على الفور. يمكن إعطاء هذا الدواء أثناء الحمل إذا رأى طبيبك أنه ضروري.

### الرضاعة الطبيعية

إذا كنت ترضعين طفلك ، أخبر طبيبك على الفور. يمكن إعطاء هذا الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية إذا رأى طبيبك أنه ضروري.

### القيادة واستخدام الآلات

هذا الدواء ليس له تأثير على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

### ٣. كيفية تناول هذا الدواء.

#### الجرعة

الوحدة الأساسية للجرعة هي ٢٤٠ مل من الماء.

يجب أن يتم تقديم بيبي لايت بشكل متكرر بناءً على درجة الجفاف والاستجابة للعلاج والكمية الذي يمكن تحملها.

### الأطفال

الأطفال دون سن الثانية - قبل الاستخدام ، استشر طبيبك أولاً.

الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين - يقدم بيبي لايت كل ٣ أو ٤ ساعات.

يجب تناول ١ إلى ٢ لتر (من ٤ إلى ٨ زجاجات) كل يوم بينما يستمر الإسهال.

إذا استمر الإسهال لأكثر من ٢٤ ساعة أو كان هناك قيء أو حمى ، فيجب اتخاذ تدابير أخرى في الاعتبار.

إذا تلتقيت كمية من هذا الدواء أكثر مما يجب

تحدث إلى الصيدلي أو الطبيب.

### ٤. الآثار الجانبية المحتملة.

ليس من المتوقع أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية. إذا لاحظت أي آثار جانبية ، فتحدث إلى الصيدلي أو الطبيب.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.

### ٥. كيفية تخزين هذا الدواء.

تخزين في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية.

بعد الفتح ، يجب حفظ الزجاجات في الثلاجة ثم التخلص من الكمية غير المستخدمة بعد ٤٨ ساعة.

### ٦. مزيد من المعلومات.

ماذا يحتوي هذا المستحضر

كل لتر يحتوي على:

- سكر العنب (دكستروز) ٢٧,٥ جرام [أي ما يعادل سكر العنب ٢٥ غرام]
- كلوريد الصوديوم ٢,٠٤٥ جرام
- سيترات اليوتاسيوم ٢,١٦٢ جرام
- سيترات الصوديوم ٠,٩٨٠ جرام
- ماء للحقن حتى ١٠٠٠ مل

### كيف يبدو هذا المستحضر وما هي محتويات العبوة

محلول معقم عديم اللون واضح

متوفر في: قوارير زجاجية مع غطاء بلاستيكي ٢٤٠ مل.

### اسم وعنوان مالك رخصة التسويق والمصنع:

مصنع المحاليل الطبية.

العنوان: المنطقة الصناعية، المرحلة الثانية.

طريق رقم ٢٠٨، شارع ٢٠٣

صندوق بريد ١٧٤٧٦ جدة ٢١٤٨٤.

المنطقة الغربية

المملكة العربية السعودية

الهاتف: ٩٦٦٦-١٢-٦٣٦١٣٨٣

الفاكس: ٩٦٦٦-١٢-٦٣٧٩٤٦٠

الموقع الإلكتروني: <http://www.psilt.com>

### للإبلاغ عن أي أعراض جانبية:

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية
فاكس: ٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢+
هاتف مجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠
تلفون: ٠٠٩٦٦-١١-٢٠٣٨٢٢٢
تحويل: ٢٣٤٠، ٢٣٣٤، ٢٣٥٤، ٢٣١٧، ٢٣٥٦، ٢٣٥٣
البريد الإلكتروني : <a href="mailto:npc.drug@sfd.gov.sa">npc.drug@sfd.gov.sa</a>
الموقع الإلكتروني : <a href="http://www.sfd.gov.sa/npc">www.sfd.gov.sa/npc</a>

دول الخليج الأخرى:

الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة.

## ( إن هذا الدواء )

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك

فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضربه.

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

## لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

وإخاد الصيادلة العرب



مصنع المحاليل الطبية  
Pharmaceutical Solutions Industry

Jeddah, Saudi Arabia  
[www.psi.com.sa](http://www.psi.com.sa)