

## نشرة العبوة: معلومات للمريض

أقراص إرليدا المغلفة بطبقة رقيقة بتركيز 60 مجم  
أبالوتاميد

- يرجى قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء نظراً لاحتواه على معلومات تهمك.
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قرأتها مرة أخرى.
  - إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فاطرحها على طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.
  - تم وصف هذا الدواء لك فقط. فلا تسمح للأخرين بتناوله. فقد يضر بهم، حتى إذا نشابت علامات المرض لديك.
  - إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك . ويتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

### محتويات هذه النشرة

- |   |   |
|---|---|
| ما هو إرليدا وما هي دواعي استعماله        | 1 |
| ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول إرليدا | 2 |
| كيفية تناول إرليدا                        | 3 |
| الآثار الجانبية المحتملة                  | 4 |
| كيفية تخزين إرليدا                        | 5 |
| محتويات العبوة ومعلومات أخرى              | 6 |

### 1. ما هو إرليدا وما هي دواعي استعماله

#### ما هو إرليدا

إرليدا هو دواء لعلاج السرطان الذي يحتوي على المادة الفعالة أبالوتاميد.

#### ما هي دواعي استعماله

- ويُستخدم لعلاج الرجال البالغين المصابين بسرطان البروستاتا الذي:
- انتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم ولا يزال يستجيب لطرق العلاج الطبية أو الجراحية التي نقل من هرمون التستوستيرون (ويسمى أيضاً سرطان البروستاتا الحساس للهرمونات).
  - لم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولم يعد يستجيب للعلاج الطبي أو الجراحي الذي يخفض هرمون التستوستيرون (يطلق عليه أيضاً سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء).

#### طريقة عمل إرليدا

يعمل إرليدا عن طريق إيقاف نشاط هرمونات تسمى الأندروجينات (مثل التستوستيرون). قد تنتسب الأندروجينات في نمو السرطان. من خلال إيقاف تأثير الأندروجينات، يعمل أبالوتاميد على إيقاف نمو وانقسام خلايا سرطان البروستاتا.

### 2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول إرليدا

#### لا تتناول إرليدا

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة أبالوتاميد أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (مدرجة في القسم 6)
- إذا كنت سيدة حاملاً أو قد تصبحين حاملاً (انتظر لقسم الحمل ووسائل منع الحمل أذناء الحصول على مزيد من المعلومات).

لا تتناول هذا الدواء إذا كانت أي من الحالات المنكورة أعلاه تطبق عليك. إذا لم تكن متتأكداً، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

#### تحذيرات واحتياطات

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء:

- إذا سبق وعانيت في أي وقت مضى من نوبات أو تشنجات.
- إذا كنت تتناول أي أدوية لمنع الجلطات الدموية (مثل وارفارين، أسينوكومارول).
- إذا كنت تعاني من أي مشكلات في القلب أو الأوعية الدموية، بما في ذلك مشكلات اضطراب ضربات القلب (ضربات قلب غير منتظمة).

- إذا أصبت في أي وقت مضى بطفح جلدي واسع الانتشار وارتفاع في درجة حرارة الجسم وتضخم في الغدد الليمفاوية (تفاعل دوائي مع فرط تواجد الحمضات وأعراض في الجسم كله أو DRESS) أو طفح جلدي شديد أو تقرح جلدي أو التقيحات أو / تقرحات في الفم (متلازمة ستيفنز جونسون أو تقرح الأنسجة المتموّلة البشرية التسممي أو SJS/TEN) بعد تناول إرليدا أو أدوية أخرى ذات الصلة.

إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك (أو لم تكن متأكداً)، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

**حالات السقوط وكسور العظام**  
تم ملاحظة حدوث حالات سقوط للمرضى الذين يتناولون إرليدا. توخ الحذر الشديد لتقليل خطر تعرضك للسقوط. تم ملاحظة حدوث حالات كسور بالعظم لدى المرضى الذين يتناولون هذا الدواء.

**أمراض القلب، أو السكتة الدماغية أو السكتة الدماغية العابرة**  
حدث حالات انسداد في شرايين القلب أو في جزء من المخ والتي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأشخاص أثناء تلقى العلاج بدواء إرليدا.

سوف يتبع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ظهور أي علامات أو أعراض لمشكلات القلب أو المخ أثناء فترة علاجك بهذا الدواء.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ على الفور إذا شعرت:

- بألم في الصدر أو عدم راحة أثناء فترات الراحة أو مع ممارسة نشاط
- أو حدوث صبیق في النفس
- أو بضعف عضلي / شلل في أي جزء من الجسم، أو
- صعوبة في الكلام.

إذا كنت تتناول أي أدوية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بزيادة خطر التعرض لنوبات أو النزيف أو أمراض القلب.

**(SCARs) التفاعلات الضارة الجلدية الشديدة**  
تم الإبلاغ عن الإصابة بتفاعلات ضارة جلدية شديدة (SCARs)؛ بما في ذلك التفاعل الدوائي مع فرط الحمضات وأعراض في الجسم كله (DRESS) أو متلازمة ستيفنز جونسون / تقرح الأنسجة المتموّلة البشرية التسممي (TEN/SJS) عند تناول إرليدا. يمكن أن يظهر التفاعل الدوائي مع فرط الحمضات وأعراض في الجسم كله (DRESS) على شكل طفح جلدي واسع الانتشار وارتفاع في درجة حرارة الجسم وتضخم في الغدد الليمفاوية. يمكن أن تظهر الإصابة بمتلازمة ستيفنز جونسون / تقرح الأنسجة المتموّلة البشرية التسممي TEN في البداية في صورة بقع حمراء أو لطخات دانيرية غالباً مع ظهور بثرات مركزية على الجذع. كما يمكن أن تحدث تقرحات في الفم والحلق والألف والأعضاء التناسلية والعيينين (عيون حمراء ومتناقضة). غالباً ما تسبّب هذا الطفح الجلدي الخطير حمى أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أو كلاهما. قد يتتطور الطفح الجلدي إلى تقرح جلدي واسع النطاق ومضاعفات مهددة للحياة أو قاتلة.

إذا حدث لك طفح جلدي خطير أو أي من هذه الأعراض الجلدية، فتوقف عن تناول هذا الدواء واتصل بطبيبك أو اطلب العناية الطبية على الفور.

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تتطابق عليك (أو كنت غير متأكد)، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.  
انظر القسم 4 "الآثار الجانبية الخطيرة" أعلى القسم 4 لمعرفة المزيد من المعلومات.

#### داء الرئة الخلالي

لقد لوحظت حالات إصابة بداء الرئة الخلالي (التهاب غير معدٍ في الرئتين قد يؤدي إلى ضرر دائم) في المرضى الذين يتناولون إرليدا، بما في ذلك الحالات المميتة. وتمثل أعراض داء الرئة الخلالي في السعال وضيق التنفس المصحوب أحياناً بالحمى على أن تكون هذه الأعراض غير ناتجة عن النشاط البدني. تلق الرعاية الطبية العاجلة إذا أصبت بأعراض قد تكون علامات للإصابة بداء الرئة الخلالي.

#### الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للاستخدام في الأطفال والراهقين دون سن 18 عاماً.

- في حالة تناول طفل أو شاب صغير هذا الدواء عن طريق الخطأ:
- توجهه إلى المستشفى على الفور
  - خذ معك نشرة العبوة هذه لعرضها على طبيب الطوارئ.

## الأدوية الأخرى وإرليدا

يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. لأن إرليدا يمكنه أن يؤثر على مفعول بعض الأدوية الأخرى. أيضًا، يمكن لبعض الأدوية الأخرى أن تؤثر على مفعول إرليدا.

على وجه التحديد، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية للحالات التالية:

• خفض مستويات الدهون المرتفعة في الدم (مثل جيمفيبروزيل)

• علاج العدوى البكتيرية (مثل موكيسيفالوكاسين، كلاريثروماسيدين)

• علاج العدوى الفطرية (مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول)

• علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (مثل ريتونافير، إيفافيرينز، دارونافير)

• علاج الفلق (مثل ميدازولام، ديزيبيام)

• علاج الصرع (مثل فينيتوين، حمض الفالبروبك)

• علاج مرض الارتداد المعدى المريئي (حالات تكون فيها كمية الحمض في المعدة كبيرة جدًا) (مثل أو ميبرازول)

• الوقاية من الجلطات الدموية (مثل وارفارين، كلوبوجريل، دابيجاتران إتيكسيلات)

• علاج حمى الكلاً وأنواع الحساسية (مثل فيكسوفينادين)

• خفض مستويات الكوليسترول (مثل "الستاتينات" مثل روسوفاستاتين وسيمفاستاتين)

• علاج المشكلات القلبية أو خفض ضغط الدم (مثل ديجوكسين، فيلوديبين)

• علاج مشكلات اضطراب ضربات القلب (مثل كوبينيين، ديسوبراميد، أميدارون، سوتالول، دوفتيليد، إيبوتيليد)

• علاج حالات الغدة الدرقية (مثل ليفوثيروكسين)

• علاج النقرس (مثل كولشيسين)

• خفض جلوكوز الدم (مثل ريباجلينيد)

• علاج السرطان (مثل لاپاتينيب، ميتوتریکسات)

• علاج إدمان المواد الأفيونية أو الألم (مثل مياثادون)

• علاج الأمراض النفسية الخطيرة (مثل هالوبيريدول)

أنت بحاجة إلى إعداد قائمة بالأدوية التي تتناولها وعرض هذه القائمة على طبيبك أو الصيدلي عند بدء دواء جديد. أخبر طبيبك أنك تتناول إرليدا إذا كان الطبيب يريد بدء علاجك باستخدام أي دواء جديد. قد يلزم تغيير جرعة إرليدا أو أي أدوية أخرى تتناولها.

## معلومات عن الحمل ووسائل منع الحمل للرجال والسيدات

### معلومات للسيدات

• يجب عدم تناول إرليدا لدى السيدة الحامل أو القادرة على الحمل أو التي تقوم بالرضاعة الطبيعية. قد يلحق هذا الدواءضرر الجنين.

### معلومات للرجال – اتبع هذه النصيحة أثناء العلاج ولمدة 3 أشهر بعد إيقافه

• في حالة المعاشرة الجنسية مع امرأة حامل، استخدم واقِيًّا ذكرًيا لحماية الجنين.

• في حالة المعاشرة الجنسية مع امرأة قد تصبح حاملاً ، استخدم واقِيًّا ذكرًيا ووسيلة أخرى عالية الفعالية لمنع الحمل.

استخدم إحدى وسائل منع الحمل أثناء العلاج ولمدة 3 أشهر بعد إيقافه. استشر طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بوسائل منع الحمل.

قد يقلل هذا الدواء من الخصوبة لدى الرجال.

### القيادة واستخدام الآلات لا يُرجح أن يؤثر إرليدا على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات.

تشمل الآثار الجانبية لهذا الدواء نوبات. استشر طبيبك إذا كنت عرضة بنسبة كبيرة لخطر حدوث نوبات (انظر القسم 2 "تحذيرات واحتياطات").

### تحتوي إرليدا على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 مجم) لكل جرعة بتركيز 240 مجم (4 أقراص)، أي أن الدواء يُعد "خاليًا من الصوديوم" في الأساس.

## 3. كيفية تناول إرليدا

تناول هذا الدواء دائمًا وفقًا لتعليمات طبيبك. راجع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

قد يصف طبيبك أيضًا أدوية أخرى أثناء تناولك دواء إرليدا.

#### كمية الجرعة

الجرعة الموصى بها من هذا الدواء هي 240 مجم (أربعة أقراص بتركيز 60 مجم) مرة واحدة يوميًّا.

#### استعمال إرليدا

- تناول هذا الدواء عن طريق الفم.
- يمكنك تناول هذا الدواء مع الطعام أو بين الوجبات.
- ابْلِغُ كُل قرص كاملاً للتأكد من تلقي الجرعة كاملاً. لا تسحق الأقراص أو تقسمها.

#### إذا كنت غير قادر على ابتلاع الأقراص كاملاً

- إذا كنت غير قادر على ابتلاع هذا الدواء كاملاً، يمكنك:
  - مزج الدواء مع أحد المشروبات غير الغازية أو الأطعمة اللينة التالية؛ عصير البرتقال أو الشاي الأخضر أو صلصة التفاح أو الزبادي الصالح للشرب أو كمية إضافية من المياه على النحو التالي:
    - ضع الجرعة الموصوفة بالكامل من دواء إرليدا في كوب. لا تقم بسحق الأقراص أو قسمها.
    - أضف نحو 20 مل (4 ملاعق صغيرة) من المياه غير الغازية لضمان غمر الأقراص بالكامل في المياه.
    - انتظر لمدة دققتين حتى تنكسر الأقراص وتنشر، ثم قلب الخليط.
    - أضف نحو 30 مل (6 ملاعق صغيرة أو ملعقة كبيرة) من أحد المشروبات غير الغازية أو الأطعمة اللينة التالية: عصير البرتقال أو الشاي الأخضر أو صلصة التفاح أو الزبادي الصالح للشرب أو كمية إضافية من المياه وقلب الخليط.
    - ابتلِعُ الخليط على الفور.
    - املأ الكوب بكمية كافية من المياه للتأكد من حصولك على الجرعة الكاملة واتشربه على الفور.
    - لا تحفظ بخليط الدواء/الطعام لاستخدامه لاحقاً.
  - أنووب التغذية: يمكن أيضًا إعطاء هذا الدواء باستخدام أنابيب تغذية معينة. اسأل مقدم الرعاية الصحية عن تعليمات محددة حول كيفية تناول الأقراص بشكل صحيح باستخدام أنابيب تغذية.

#### في حالة تناول جرعة زائدة من إرليدا

إذا تناولت جرعة زائدة، فتوقف عن تناول هذا الدواء واتصل بطبيبك. قد تكون معرضاً لزيادة خطر الإصابة بالأثار الجانبية.

#### في حالة نسيان تناول إرليدا

- في حالة نسيانك تناول هذا الدواء، تناول جرعتك المعتادة فور تذكرها في نفس اليوم.
- في حالة نسيان تناول هذا الدواء طوال اليوم - تناول جرعتك المعتادة في اليوم التالي.
- في حالة نسيان تناول هذا الدواء لأكثر من يوم واحد - فاستشر طبيبك على الفور.
- لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية.

#### إذا توقفت عن تناول إرليدا

لا تتوارد عن تناول هذا الدواء دون مراجعة طبيبك أولاً.

إذا كانت لديك أي أسلمة أخرى بشأن استخدام هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

#### 4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء أثراً جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

#### الآثار الجانبية الخطيرة

توقف عن تناول إرليدا واطلب المساعدة الطبية فوراً إذا لاحظت أيًّا من الأعراض التالية:

- طفح جلدي واسع الانتشار وارتفاع في درجة حرارة الجسم وتضخم في الغدد الليمفاوية (تفاعل دوائي مع فرط الحمضات وأعراض في الجسم كله أو DRESS).
- ظهور بقع غير مرتفعة ذات لون أحمر، تشبه الهدف أو دوائر على الجذع وغالباً ما يكون في منتصفها بثور؛ أو تقرش البشرة؛ أو تقرح الفم والحلق والألف والأعضاء التناسلية والعينين. يمكن أن تكون هذه الحالات الخطيرة من الطفح الجلدي مسبوقة بحمى أو أعراض تشبه أعراض الانفلونزا (متلازمة ستيفنز جونسون، تقرش الأنسجة المتموّنة البشرية التسممي).

أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أيّاً من الآثار الجانبية الخطيرة التالية – قد يقوم طبيبك بإيقاف العلاج:

شائعة جداً: قد تصيب أكثر من شخص واحد من بين كل 10 أشخاص

- السقوط أو الكسور (كسور العظام). قد يرافق مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن كثب إذا كنت معرضاً لخطر الإصابة بالكسور.

شائعة: قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 10 أشخاص

- أمراض القلب، أو السكتة الدماغية أو السكتة الدماغية العابرة . سوف يتبع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ظهور أي علامات وأعراض لمشكلات القلب أو الدماغ أثناء فترة تلقي العلاج. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ على الفور إذا شعرت بألم في الصدر أو عدم راحة أثناء الراحة أو مع ممارسة نشاط، أو حدوث ضيق في النفس، أو إذا أصبحت بضعف عضلي / شلل في أي جزء من الجسم، أو صعوبة في الكلام أثناء فترة علاجك بدواء إرليدا.

غير شائعة: قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 100 شخص

- تشنج أو نوبة سيفونق مقدم الرعاية الصحية الخاص بك هذا الدواء إذا تعرضت لنوبة أثناء العلاج.
- متلازمة تململ الساقين (رغبة ملحة في تحريك الساقين لإيقاف الشعور بالألم أو الشعور الغريب، وغالباً ما تحدث ليلاً).

غير معروفة: لا يمكن تقدير تواتر من البيانات المتوفرة

- السعال وضيق التنفس، ومن المحتمل أن يكونا مصحوبين بالحمى، والتي لا تكون ناتجة عن النشاط البدني (التهاب في الرئتين، المعروف باسم داء الرئة الخلالي).

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا لاحظت أيّاً من الآثار الجانبية الخطيرة المذكورة أعلاه.

#### تشمل الآثار الجانبية :

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لاحظت أيّاً من الآثار الجانبية التالية:

آثار شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص):

- الشعور بالتعب الشديد
- ألم المفاصل
- الطفح الجاهي
- نقص الشهية
- ارتفاع ضغط الدم
- هبات الحرارة
- الإسهال
- كسور العظام
- السقوط
- فقدان الوزن.

آثار شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص):

- تشنجمات العضلات
- الحكة
- تساقط الشعر
- تغير في حاسة التذوق
- اختبار دم يبين ارتفاع مستوى الكوليسترون في الدم
- اختبار دم يبين ارتفاع مستوى نوع من الدهون يسمى "الدهون الثلاثية" في الدم
- أمراض القلب
- سكتة دماغية أو سكتة دماغية عابرة ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ
- انخفاض نشاط الغدة الدرقية الذي قد يجعلك تشعر بمزيد من التعب وصعوبة في النهوض صباحاً، وقد تبين اختبارات الدم أيضاً حدوث انخفاض في نشاط الغدة الدرقية.

آثار غير شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص):

- نوبات / تشنجمات

غير معروفة (لا يمكن تقدير تواتر هذه الآثار من البيانات المتاحة):

- مؤسّم غير طبيعي للقلب في مخطط كهربائية القلب (ECG).

- طفح جلدي واسع الانتشار وارتفاع في درجة حرارة الجسم وتضخم في الغدد الليمفاوية (تفاعل دوائي مع فرط الحمضات وأعراض في الجسم كله أو DRESS).
- يقع حمراء غير مرتفعة، شبيهة بدائرة الهدف أو دائرة على مستوى الجذع، غالباً مع بثور مركزية، وتقرحات في الفم والحلق والأنف والأعضاء التناسلية والعينين يمكن أن تسببها حمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. هذا الطفح الجلدي الخطير قد يكون مميتاً (متلازمة ستيفنز جونسون، تقرح الأنسجة المتموّلة البشرية التسممي)
- طفح بالجلد أو بالأغشية المخاطية (طفح حزاري الشكل).

أخبر رقم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لاحظت أيّاً من الآثار الجانبية المذكورة أعلاه.

#### **الإبلاغ عن الآثار الجانبية**

إذا ظهرت عليك أيّ آثار جانبية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. ويتضمن ذلك أيّ آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية يمكن أن تساعد على توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

#### **5. كيفية تخزين إرليدا**

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن أنظار ومتداول أيدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الحاوية (أشرطة رقائق الألومنيوم والحافظة الداخلية والحافظة الخارجية والزجاجة والعبوة الكرتونية) بعد الحروف EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يُخزن في العبوة الأصلية لحمايتها من الرطوبة. يُحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

لا تتخلص من أيّ أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو المخلفات المنزلية. اسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

#### **6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى**

##### **محتويات إرليدا**

- المادة الفعالة هي أبابلواتاميد. ويحتوي كل قرص مغلف بطبقة رقيقة على 60 مجم من أبابلواتاميد.
- المكونات الأخرى للمادة الأساسية للقرص هي السيليكا اللامائة الغروانية وكروس كارميلوز الصوديوم وسكسينات أسيتات الهيبروميلوز وستيرات المغنيسيوم وسيليولوز بلوري مكرولي وسيليولوز بلوري مكرولي مسلكت. تحتوي الطبقة المغلفة للقرص على أكسيد الحديد الأسود (E172) وأكسيد الحديد الأصفر (E172) ومايكروجول وكحول عديد الفينيل (متحلل جزئياً) والتالكوثاني أكسيد التيتانيوم (E171). (انظر القسم 2، يحتوي إرليدا على الصوديوم).

**شكل إرليدا و محتويات العبوة**  
أقراص إرليدا المغلفة بطبقة رقيقة ذات لون أصفر قليلاً يميل إلى الأخضر الرمادي، مستطيلة الشكل، مغلفة بطبقة رقيقة (17 مم طول × 9 مم عرض)، مكتوب على أحد جانبيها "AR 60".

قد يتم تقديم الأقراص في زجاجة أو عبوة حافظة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات والتركيبات.

##### **قارورة**

يتم تقديم الأقراص في قارورة بلاستيكية مزودة بغطاء مقاوم لعبث الأطفال. تحتوي كل زجاجة على 120 قرص و ما إجماليه 6 جم من المادة المجففة. كل علبة كرتونية تحتوي على زجاجة واحدة. يُخزن في العبوة الأصلية. لا تبلع المادة المجففة أو تتخلص منها.

**عبوة كرتونية تكفي 28 يوماً**  
كل عبوة كرتونية مخصصة لعلاج 28 يوماً تحتوي على 112 قرصاً مغلفاً بطبقة رقيقة في 4 عبوات حافظة من الورق المقوى تضم كل منها على 28 قرصاً مغلفاً بطبقة رقيقة.

**عبوة كرتونية تكفي 30 يوماً**

كل عبوة كرتونية مخصصة لعلاج 30 يوماً تحتوي على 120 قرصاً مغلفاً بطبقة رقيقة في 5 عبوات حافظة من الورق المقوى تضم كلأً منها على 24 قرصاً مغلفاً بطبقة رقيقة.

**حامل الرخصة التسويقية**

جانسن سيلاج انترناشونال ان فى ترنهوتسيج-30-بي-2340 ، بيرس، بلجيكا

**الشركة المصنعة**

جانسن اورثول ل سي، ستات رود 933، كم 0.1 مامي وارد، جورابو، بورتو ريكو، الولايات المتحدة

للتواصل معنا، اذهب إلى [www.janssen.com/contact-us](http://www.janssen.com/contact-us)

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في 18 نوفمبر 2024.

#### هذا دواء

- الدواء هو منتج يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء. الطبيب والصيدلي هما الخبران بالأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر الوصفة الطبية ذاتها دون استشارة طبيبك.
- احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيادلة العرب