

OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que **OSCILLOCOCCINUM®**, granules en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **OSCILLOCOCCINUM®**, granules en récipient unidose ?
3. Comment prendre **OSCILLOCOCCINUM®**, granules en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **OSCILLOCOCCINUM®**, granules en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

OSCILLOCOCCINUM® est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux : fièvre, frissons, maux de tête, courbatures.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE

OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Mises en garde et précautions d'emploi

OSCILLOCOCCINUM® ne peut se substituer à la vaccination contre la grippe saisonnière.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose avec des aliments, des boissons et de l'alcool :

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Compte-tenu de la hauteur de dilution, et malgré l'absence de données expérimentales et cliniques suffisantes, OSCILLOCOCCINUM® peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement.

Liste des excipients à effet notable

OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose contient du saccharose et du lactose.

3. COMMENT PRENDRE OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose ?

Posologie

Le plus tôt possible, dès l'apparition des premiers symptômes de l'état grippal, prendre 1 dose 3 fois par jour, pendant 1 à 3 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, consultez votre médecin.

Mode d'administration

Voie sublinguale.

Chez l'adulte : faire fondre le contenu entier d'une dose sous la langue ou dans un peu d'eau.



- 1- Retirer le récipient unidose de son emballage
- 2- Ouvrir en enlevant le bouchon
- 3- Mettre le contenu entier dans la bouche et laisser fondre sous la langue

Chez l'enfant : avant 6 ans, dissoudre les granules dans un peu d'eau en raison du risque de fausse route.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d'OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://www.ansm.sante.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose :

- **La substance active est :**

Extrait fluide peptoné de foie et de cœur d'*Anas barbariae* dynamisé à la 200^e K.

- **Les autres composants sont :**

Saccharose, lactose.

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect OSCILLOCOCCINUM®, granules en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur

OSCILLOCOCCINUM® se présente sous la forme de granules en récipient unidose. Ils sont conditionnés dans une boîte de 1, 6 ou 30 unidoses.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant

Siège social

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est octobre 2016.