

ما هو عقار باتاتول قطرات العين؟ ومتى يُستخدم؟

يُستخدم عقار باتاتول لعلاج آلام العين الناجمة عن التهاب الملتحمة الفيروسي الموسمي العيون. التهاب الملتحمة الفيروسي، يعرض سطح العين لديك بامتداد إلى ملامسة الهواء من البيئة المحيطة قد تسبب حماسية مثل: جحوب الفلج، أو غبار المنزل أو البقع الحبوبيات فغالباً حماسية على سطح عينك مثل: الحكة والاحمرار والتورم. عقار باتاتول هو دواء يُستخدم لعلاج التهابات التنسيمة التي تسبب العين. يحد عقار باتاتول من مدة شدةالتهاب التنسيمة. لا يُركّز استخدام عقار باتاتول قطرات العين إلا إذا تم وصفه من قبل الطبيب.

ما الذي يتوجب أن تكون على دراية به غير ذلك؟

تم وصف هذا الدواء كخفيف، ويجب ألا تعطه لأخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها أنت.

متى يجب عدم استخدام عقار باتاتول قطرات العين؟

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أولويبتاين أو أي من المكونات الأخرى لعقار باتاتول. يُرجى استشارة طبيبك.

يجب عدم استخدام عقار باتاتول في الأطفال أقل من 3 أعوام

يجب تجنب بوضوح الحذر عند استخدام عقار باتاتول قطرات العين؟

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فم بإزالة عدساتك الالاصقة قبل وضع قطرات العين. انتظر 15 دقيقة بعد وضع قطرات العين قبل إعادة وضع عدساتك الالاصقة. قد تسبب المادة الحافظة بعقار باتاتول (كثوريدين البنزالكونيوم) تهيج العين، وتغير لون العدسات الالاصقة الرقيقة.

- يجب إخبار طبيبك أو الصيدلي الخاص بك في الحالات الآتية:
- إذا كنت تعاني من أية امراض أخرى.
- إذا كنت تحمي من أي نوع من أنواع الحساسيات أو
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية غير الوصفية) أو تستخدم أدوية أخرى في عينك (عيني).
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية غير الوصفية) أو تستخدم أدوية أخرى في القيادة واستخدام الآلات


لا تصحح الرؤية لديك غير واضحة بعد فترة قصيرة من استخدام عقار باتاتول. لنك يجب تجنب ممارسة القيادة أو استخدام الآلات متى تتضح الرؤية لديك.

هل يمكن استخدام عقار باتاتول قطرات العين من قِبل السيدات الحوامل أو المرضعات؟

إذا كنت حاملاً أو ترضع بالحم، ننصحُكي أن تطبيكي قبل استخدام عقار باتاتول. لا تستخدمي عقار باتاتول إذا كنت مرضعة؛ إذ إنه من الممكن أن يمر في لبن الأم.

كيفية استخدام عقار باتاتول قطرات العين

الجرعة المعتادة
قطرة واحدة مرتين يومياً (صباحاً ومساءً) في العين (العين) المصابة. اتبع هذه التعليمات ما لم يصف الطبيب جرعة مختلفة. استخدم عقار باتاتول في كلتا العينين فقط إذا أخرجك طبيبك بالقيام بذلك. استخدم عقار باتاتول للعدة التي وصفها لك طبيبك. عقار باتاتول قطرات العين مُصنَّع للاستخدام في العين فقط. تم تب دراسة استخدام وأمان عقار باتاتول قطرات العين في الأطفال بعمر أقل من 3 سنوات. كيفية وضع عقار باتاتول



1
2
أحضر زجاجة عقار باتاتول ومررة.

- اغسل يديك.
- فك الغطاء.
- أمسك الزجاجة بين إبهامك وأصبعك الأوسط مع توجيه الطرف لأسفل.

• قم بإمالة رأسك إلى الخلف. اجذب جفنتك لأسفل بإصبعك نظيف. إن أن تتشكل فجوة بين جفنتك وعينك، هذا هو الوضع الذي يجب أن توضع القطرة فيه (شكل 1).

• اجعل طرف القطارة قريباً من عينك قبل وضع القطرة. استخدم مرارة إذا كان ذلك سيحدث وضع القطرة أيسر.

• لا تسمح بلامسة طرف القطارة لعينك أو جفنتك أو المنطقة المحيطة بعينك أو أي أسطح أخرى؛ إن هذا قد يسمح بدخول الجراثيم إلى القطرات.

• اصطف برفق على الجزء السفلي من الزجاجة لإخراج قطرة واحدة من عقار باتاتول. لتستعجباً إن الضغط بقوة، الزجاجة تشتممة بحيث لا يستلم الأمر سوى شحنة خفيفة على فمها (شكل 2).

• إذا كنت تستخدم القطرات في كلا العينين، كرر الخطوات أعلاه بالعين الأخرى.

• أغلق الزجاجة بإحكام فوراً بعد الاستخدام.

• بعد فتح الزجاجة لأول مرة، قم بإزالة الحلقة البلاستيكية الشفافة، قبل الاستخدام.

• إذا استخدمت كمية كبيرة من القطرة إلى عينك، ناشطف عينك بماء فاتر. لا تستخدم المزيد من القطرات حتى يتحول موعده جرعتك التالية.

إننا أفقت استخدام عقار باتاتول قطرات العين. ضع قطرة واحدة بمجرد أن تدرك أنك أفقت استخدام عقار باتاتول ثم اصطلح علاجك على النحو المأمور. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أفقتها.

إذا كنت تستخدم عقار باتاتول قطرات أخرى عين، فارتك فاصلاً زمنياً قدره 5 إلى 10 دقائق بين استخدام عقار باتاتول قطرات العين وقطرات العين الأخرى.

لا تغير الجرعة الموصوفة من تلقا نفسك.

إذا كنت تعتقد أن تأثير دوائك أقوى من اللازم أو أقل من اللازم، فواصل بطبيبك أو الصيدلي.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تصاحب استخدام عقار باتاتول قطرات العين؟
تعرض بعض المرضى الذين يستخدمون عقار باتاتول قطرات العين للآثار الجانبية. على الرغم من أن هذا الأمر قد يُؤذي العين، فهو العفوي المصاحب إلا أنه سرعان ما يتلاشى. إذا لم تتعزز لشفاء بعد 7 أيام، فربط بحدوث موصلة العلاج بشكل طبيعي. إذا كانت لديك أية مخاوف، فُرجي الاتصال بالصيدلي الخاص بك.

الآثار الجانبية غير الشائعة:
قد تؤثر على يوصل إلى العين شخص واحد من 100 شخص

الآثار على العين: التهاب العين، حرقان العين، تورم الجفن، إفرازات من العين، الإحساس بوجود جسم غريب بالعين، احمرار العينين، اضطرابات بالجلف، احمرار أو تورم أو تقشر الجفن.

الآثار على الجسم: صداع، مفاك ميه، تعب، جفاف الأنف، التهاب الجلد، احمرار وحكة.

الآثار الجانبية الشائعة:
قد تؤثر على يوصل إلى العين شخص واحد من 1000 شخص

الآثار على العينين: عدم وضوح الرؤية.

الآثار على الجسم: تورم، حرقان العين، التهاب الجلد التناسلي، الحساسية.

تم الإبلاغ أيضاً عن الآثار الجانبية التالية:

الآثار على العينين: زيادة إفراز الدموع.

يُرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة.

مزيد من المعلومات

لمنع تلوث طرف القطارة وقطرات العين، من المهم عدم ملامسة الجفنين والمنطقة المحيطة بعينيك والمواد الأخرى لطرف طرف القطارة. يجب أيضاً ألا يلامس طرف القطارة يديك.

أفقت الزجاجة بإحكام فوراً بعد الاستخدام.

عمر التخزين:

لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (EXP) للطبوع على العبوة.

يجب التخلص من قطرات العين بعد أربعة أسابيع من تاريخ فتح الزجاجة لأول مرة لتجنب الإصابة بعدوى العين. دون تاريخ الفتح في المنطقة الخالية الموجودة على الملصق والعبوة المطوية.

التخزين:
لا تحفظ الدواء في درجة حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية واحفظه بعيداً عن أشعة الشمس.

بمجرد انتهاء العلاج، يُرجى إعادة الدواء إلى الشخص الذي قدمه لك (طبيبك أو الصيدلي الخاص بك) بحيث يمكن التخلص منه بشكل مناسب.

سيتمكن طبيبك أو الصيدلي الخاص بك من إعطائك المزيد من المعلومات. سوف يكون متأكنا لهم الوصول إلى المعلومات التفصيلية.

معلومات إضافية عن عقار باتاتول قطرات العين؟
منحوي كل ملل لتر من عقار باتاتول محلول معقم للعين 0.1% من 1.11 جم ميم أولويبتاين هيدروكلوريد بما يُعادل 1.11 جم ميم أولويبتاين كل ملل لتر كمنادة فعالة لهذا الغرض.

يحتوي عقار باتاتول على كمادة حافظة من 0.01% كمادة حافظة كما يحتوي على مواد غير فعالة: فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة، كلوريد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك/هيدروكسيد الصوديوم (لتعديل الحماسية)، وماء منقّى.

من أين يمكنني الحصول على عقار باتاتول قطرات العين؟ ما هي أحجام العبوات المتوفرة؟

يمكن الحصول على عقار باتاتول قطرات العين فقط من الصيدلية بناءً على وصفة الطبيب. تتوفر عبوات بأحجام 5 ملل لتر.

تم التقييم معقوداً
أفقت المردودة لأبحاث فورت وورث، تكساس 76134، الولايات المتحدة الأمريكية لصالح توفارتس فارما ايه جي، بارل، سويسرا.

تمت آخر مراجعة لنشرة العبوة هذه في فبراير 2016.

هذا منتج دولي
- الدواء منتج يُؤثر على صحتك وتتأوله على نحو متواصل للمعلومات تعرّضت للخطر.
- اتبع التعليمات الطبية بدقة وطريقة الاستخدام والتعليمات الصيدلي التي يعطاك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبراء في الأدوية وفوائدها وسلامتها.
- لا تتوقف عن تلقا شدة فترة العلاج التي تم وصفها لك.
- لا تكرر نفس العملية الطبية دون استشارة طبيبك.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن أشعة الشمس