

دكزامتازون ميديس

دكزامتازون فوسفات

الشكل والتّقديم :

دكزامتازون ميديس : حباية محلول للحقن 4 مغ / 1 مل - علبية تحتوي على 50 حباية 1 مل.

التركيبية :	دكزامتازون ميديس
دكزامتازون فوسفات الصوديوم	4,37 مغ
ب- هيدروكسيبنزوات الميثيل	1,5 مغ
ب- هيدروكسيبنزوات البروبيل	0,2 مغ
السواغات : ايديتات ديسوديوم، سترات الصوديوم تريباربيك ديهيدرات، كريباتينين ك ك ماء مستنظر الحقن ك ك كل	1 مل

الخصائص الدوائية :

ستيرويد اصطناعي مضاد للإلتهاب

دواعي الاستعمال :

حالات العلاج الكورتيكويدى النظامي أو العرضي في حالات العلاج السريع أو المكثف.

موانع الاستعمال : الخاصة بالعلاج الكورتيكويدى وعلى وجه الخصوص حساسية لأحد عناصر هذا الدواء.

استعمال التلقيح ذات الفيروس الحي.

حالات التعفن أو الإصابة الفطرية أو الفيروسية الغير مسيطر عليها بالدواء. القفرس.

القرح الهضمي النامي.

حالة الهديان.

التلّيف الكبدي نتيجة الإدمان على الكحول.

كباد حاد فيروسي أ ب ج.

الإصابات الجلدية الصّبحية.

احتياطات الاستعمال : في حالة تورّم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحنجرة، اتصل فوراً بالطبيب.

يوجب الحذر في الحالات التالية : مرض السكري، قصور الكلى، التهاب القزولون، اعتلال عضلي حاد، قرحة هضمية، ارتفاع الضّغط الشراييني، تخلل العظم، انسداد حاد لشرايين القلب.

بالنسبة للحقن الموضعي يجب تجنّب الحقن في المفاصل غير المستقرّة.

في حالة الحقن الموضعي وعند ظهور تورّم أو ارتكاء المفصل أو حمّى أو أي انزعاج كان، يجب اشعار الطبيب المباشر.

الحمل : بالنسبة للجنس البشري لم تظهر الدرّاسات أي تفاعل عند الجنين في حالة استعمال الدّواء في الثلاث أشهر الأولى من الحمل لكن يمكن حصول قصور في السورينال عند المولود الجديد في حالات الإفراط في الجرّع.

الإرضاع : يجب تجنّب الإرضاع عند تناول الدّواء لأنه يتسرّب مع حليب الأم. **التداخلات الدوائية :**

ينبغي اعلام الطّبيب في حالة الخضوع لعلاج منتظم أو عرضي، خاصّة بالنسبة للأدوية التالية : دواء القلب، دواء مخفض لبوتاسيوم الدم، أسبيرين، دواء مضاد التخثّر، دواء مخفض للسكري، فينوبريبيطال، فينيوبيطال، فينيوتوان، برميديون، ريفاميسين.

أبلغوا طبيبك إذا ما كنتم في فترة التلقيح.

التأثيرات الجانبية : خاصّةً بالعلاج الكورتيكويدى خاصّةً انحباس الصّوديوم، ارتفاع الضّغط الشراييني، قصور قلبي، تخلل العظم، قرحة هضمية، بطئ التئام الجروح، اشتداد داء السكري، اختلال العادة الشهرية، تقلّص مقاومة العدوى، ازدياد الوزن، زرق العين.

في حالة حدوث هذه الأعراض اتصلوا بالطبيب حالا.

المقادير وطريقة الاستعمال : يجب التقيّد بالوصفة الطبية.

الحقن في العضل، في الوريد مباشرة، حقن موضعي (مفصل...).

طريقة الصرف : قائمة I (جدول أ) يصرف بوصفة طبية.

طريقة الحفظ : بعيداً عن الضّوء، عن الحرارة والبرد.

التّقديم :

دكزامتازون ميديس علبية ذات 50 حباية 1 مل تأشيرية رقم 2H 313 923

إن هذا دواء

- الدواء، مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء، مستحضر يؤثّر على صحكتك وإستهلاكك خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
- قدّم تعليمات الصيدلاني التي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء، وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

Médis