

Dexaméthasone MediS 4 mg/1ml

Dexaméthasone Phosphate

FORME ET PRESENTATION :

● Dexaméthasone MediS Ampoule injectable de 4 mg/1ml - Boîte de 50 ampoules de 1 ml.

COMPOSITION :

		Dexaméthasone MediS
Dexaméthasone phosphate Sodique		4,37 mg
P-hydroxybenzoate de méthyle		1,5 mg
P-hydroxybenzoate de propyle		0,2 mg
Excipients	Edétate disodique, citrate de sodium tribasique dihydrate, créatinine q.s	
E.P.P.I.q.s.p		1 ml

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :

Stéroïde de synthèse utilisé pour son action anti-inflammatoire.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Celles de la corticothérapie par voie générale ou locale lorsqu'une corticothérapie rapide et intense est recherchée.

CONTRE INDICATIONS :

Hypersensibilité à l'un des composants de ce médicament, administration de vaccins à virus vivant., états infectieux ou mycosiques non contrôlés par un traitement, goutte, ulcère gastro-duodéal évolutif., états psychotiques graves., cirrhose alcoolique, hépatite aiguë à virus A,B,C, purpura thrombopénique (voie IM).

Aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie

Brève ou d'indication vitale.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est conseillé de diminuer, voir de supprimer l'apport de sel dans l'alimentation et suivre un régime riche en protéine, en calcium et pauvre en glucose.

- Utiliser avec prudence chez l'enfant, la femme ménopausée, en cas d'antécédents ulcéreux, d'antécédents psychiatriques, d'HTA, de diabète, d'ostéoporose, de colite ulcéreuse, d'épilepsie.

-Traiter toute infection pouvant être favorisée par la corticothérapie.

- La corticothérapie, surtout à long court entraîne une inertie de l'axe hypothalamo - hypophysaire. Le traitement ne doit donc pas être arrêté brutalement sous peine de voir apparaître une insuffisance surrénalienne aiguë.

Grossesse : Dans l'espèce humaine, les études rétrospectives n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre. Une insuffisance surrénalienne néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées.

Allaitement : il est préférable de ne pas allaiter sous traitement car les corticoïdes passent dans le lait maternel.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Vous devez informer votre médecin des médicaments que vous prenez

déjà et spécialement s'il s'agit d'un médicament cardiologique, de médicament diminuant le potassium sanguin, d'aspirine, anticoagulant, anti diabétique, phénobarbital, phénitoïne, primidone ou rifamycine.

Prévenez votre médecin si vous êtes en période de vaccination.

EFFETS INDESIRABLES :

Ceux de la corticothérapie, y compris rétention sodée et hydrique, hypertension, insuffisance cardiaque congestive, ostéoporose, ulcère gastro-duodéal, retard de cicatrisation, aggravation du diabète. Irregularités menstruelles, diminution de la résistance à l'infection, prise de poids et glaucome.

Signalez sans tarder à votre médecin toute sensation inhabituelle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Mode d'administration : Voie intraveineuse ou intramusculaire, injection locale (intra-articulaire, tissus mous).

Posologie : Conformez-vous strictement à la prescription médicale.

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

Liste I, tableau A, sous ordonnance médicale.

CONSERVATION :

Conservez le produit à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

PRESENTATION :

Dexaméthasone MediS Boîte de 50 ampoules de 1 ml

AMM N° 923 313 2 H

Fabricant et Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant :

LES LABORATOIRES MEDIS

Route de Tunis - KM 7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie

Tel : (216) 72 23 50 06. Fax: (216) 72 23 50 16.

E-mail : contact@labomedis.com

Date de la dernière révision : 09/2019

Ceci est un médicament

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé, et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation, et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

NO 00047
V02

