

دكز اميديس[®] - دكز اميديس فور[®]

دكز اميتازون فوسفات

الشكل والتقديم :

دكز اميديس : حبة محلولة للحقن 4 مغ / 1 مل.

دكز اميديس فور : حبة محلولة للحقن 8 مغ / 2 مل.

التركيبية :	دكز اميديس	دكز اميديس فور
دكز اميتازون فوسفات الصوديوم	4,37 مغ	8,74 مغ
ب- هيدروكسيبنزوات الميثيل	1,5 مغ	3,0 مغ
ب- هيدروكسيبنزوات البروبيل	0,2 مغ	0,4 مغ
السواغات : ايديتات ديسوديك، سيترات الصوديوم تريبيزنيك ديهيدرات، كرياتينين ك.ك		
ماء مستنزر الحقن ك.ك.ل	1 مل	2 مل

الخصائص الدوائية :

ستيرويد اصطناعي مضاد للإلتهاب

دواعي الاستعمال :

حالات العلاج الكورتيكوستيرويدي النظامي أو العرضي في حالات العلاج السريع أو المكثف.

موانع الاستعمال : الخاصة بالعلاج الكورتيكوستيرويدي وعلى وجه الخصوص حساسية لأحد عناصر هذا الدواء.

استعمال التلقيح ذات الفيروس الحي.

حالات التعفن أو الإصابة الفطرية أو الفيروسية الغير مسيطر عليها بالدواء.

النقرس.

القرح الهضمي النامي.

حالة الهذيان.

التليف الكبدي نتيجة الإدمان على الكحول.

كبد حاد فيروسي أ. ب. ج.

الاصابات الجلدية الصمغية.

احتياطات الاستعمال : في حالة تورّم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحنجرة، اتصل فوراً بالطبيب.

يوجب الحذر في الحالات التالية : مرض السكري، قصور الكلى، التهاب القزول، اعتلال عضلي حاد، قرحة هضمية، ارتفاع الضغط الشرياني، تخلل العظم، انسداد حاد لشرايين القلب.

بالنسبة للحقن الموضعي يجب تجنّب الحقن في المفاصل غير المستقرّة.

في حالة الحقن المفصلي وعند ظهور تورّم أو ارتكاع المفصل أو حمّى أو أي

انزعاج كان، يجب اشعار الطبيب المباشر.

الحمل : بالنسبة للجنس البشري لم تظهر الدراسات أي تفاعل عند الجنين في حالة استعمال الدواء في الثلث أشهر الأولى من الحمل لكن يمكن حصول قصور في السورينال عند المولود الجديد في حالات الإفراط في الجرع.

الإرضاع : يجب تجنّب الإرضاع عند تناول الدواء لأنه يتسرّب مع حليب الأم.

التداخلات الدوائية :

ينبغي اعلام الطبيب في حالة الخضوع لعلاج منتظم أو عرضي، خاصة بالنسبة للأدوية التالية : دواء القلب، دواء مخفض لبوتاسيوم الدم، أسبيرين، دواء مضاد التخثر، دواء مخفض للسكري، فينوبريبتال، فينيوبيبتال، فينيوتوان، برميديون، ريفاميسين.

أبلغوا طبيبك إذا ما كنتم في فترة التلقيح.

التأثيرات الجانبية : خاصة بالعلاج الكورتيكوستيرويدي خاصة انحباس الصوديوم، ارتفاع الضغط الشرياني، قصور قلبي، تخلل العظم، قرحة هضمية، بطئ التئام الجروح، اشتداد داء السكري، اختلال العادة الشهرية، تقلص مقاومة العدوى، ازدياد الوزن، زرق العين.

في حالة حدوث هذه الأعراض اتصلوا بالطبيب حالا.

المقادير وطريقة الاستعمال : يجب التقيد بالوصفة الطبية.

الحقن في العضل، في الوريد مباشرة، حقن موضعي (مفضل...).

طريقة الصرف : قائمة أ (جدول أ) يصرف بوصفة طبية.

طريقة الحفظ : بعيداً عن الضوء، عن الحرارة والبرد.

التقديم :

دكز اميديس علبه ذات 10 حبابات 1 مل تأشيرة رقم 1 923 313

دكز اميديس فور علبه ذات حبابه واحده 2 مل تأشيرة رقم 3 923 313

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
- تتبّد تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء، وينبغي وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج الممددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.