

DEXAMEDIS® - DEXAMEDIS Fort®

Dexaméthasone Phosphate

FORME PHARMACEUTIQUE :

- DexamédiS Ampoule injectable de 4 mg/1ml.
- DexamédiS Fort Ampoule injectable de 8 mg/2ml.

COMPOSITION :

	DexamédiS	DexamédiS Fort
Dexaméthasone phosphate Sodium	4,37 mg	8,74 mg
P-hydroxybenzoate de méthyle	1,5 mg	3 mg
P-hydroxybenzoate de propyle	0,2 mg	0,4 mg
Excipients	Edeate disodique, citrate de sodium tribasique dihydraté, créatine q.s	
E.P.P.I.q.s.p	1 ml	2 ml

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :

Séroïde de synthèse utilisé pour son action anti-inflammatoire.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Celles de la corticothérapie par voie générale ou locale lorsqu'une corticothérapie rapide et intense est recherchée.

CONTRE INDICATIONS :

Hypersensibilité à l'un des composants de ce médicament, administration de vaccins à virus vivant., états infectieux ou mycosiques non contrôlés par un traitement , goutte, ulcère gastro-duodénal évolutif., états psychotiques graves., cirrhose alcoolique, hépatite aiguë à virus A,B,C, purpura thrombopénique (voie IM).

Aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie Brève ou d'indication vitale.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est conseillé de diminuer , voir de supprimer l'apport de sel dans l'alimentation et suivre un régime riche en protéine, en calcium et pauvre en glucose.

-Utiliser avec prudence chez l'enfant, la femme ménopausée, en cas d'antécédents ulcéreux, d'antécédents psychiatriques, d'HTA, de diabète, d'ostéoporose, de colite ulcéreuse, d'épilepsie.

-Traiter toute infection pouvant être favorisée par la corticothérapie.

- La corticothérapie, surtout à long court entraîne une inertie de l'axe hypothalamo - hypophysaire. Le traitement ne doit donc pas être arrêté brutalement sous peine de voir apparaître une insuffisance surrenalienne aigüe.

Grossesse : Dans l'espèce humaine, les études rétrospectives n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre. Une insuffisance surrenalienne néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées.

Allaitement : il est préférable de ne pas allaiter sous traitement car les corticoïdes passent dans le lait maternel.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Vous devez informer votre médecin des médicaments que vous prenez déjà et spécialement s'il s'agit :d'un médicament cardiologique , de médicament diminuant le potassium sanguin, d'aspirine, anticoagulant, anti diabétique, phénobarbital, phénitoïne, primidone ou rifamycine.

Prévenez votre médecin si vous êtes en période de vaccination.

EFFETS INDESIRABLES :

Ceux de la corticothérapie, y compris rétention sodée et hydrique, hypertension, insuffisance cardiaque congestive, ostéoporose, ulcère gastro-duodénal, retard de cicatrisation, aggravation du diabète. Irrégularités menstruelles, diminution de la résistance à l'infection, prise de poids et glaucome.

Signalez sans tarder à votre médecin toute sensation inhabituelle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Mode d'administration : Voie intraveineuse ou intramusculaire, injection locale (intra-articulaire, tissus mous).

Posologie : Conformez-vous strictement à la prescription médicale.

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

Liste I, tableau A, sous ordonnance médicale.

CONSERVATION :

Conservez le produit à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

PRESENTATION :

DexamédiS Boîte de 10 ampoules de 1 ml

AMM N° 923 313 1

DexamédiS Fort Boîte de 1 ampoule de 2 ml

AMM N° 923 313 3

Fabricant et Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant :

LES LABORATOIRES MEDIS

Route de Tunis - KM 7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie

Tel : (216) 72 23 50 06. Fax: (216) 72 23 50 16.

E-mail : contact@labomedis.com

Date de la dernière révision : 09/2019

Ceci est un médicament

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé, et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation, et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

NO 0006
V08

 MédiS