نشرة معلومات المريض

أكتوس مت ١٥ ملغم/٨٥٠ ملغم أقراص مغطاة بطبقة رقيقة

بيوغليتازون وهيدروكلوريد الميتفورمين

اقرأ هذه النشرة جيداً قبل تناول هذا الدواء لإنها تحتوي على معلومات مهمة لك.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها لاحقاً.
- في حال كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- لقد تم صرف هذا الدواء لك فقط بناءً على وصفة طبية، فلا تعطه لأي شخص آخر. لأنه قد يؤذيه، حتى لو تشابهت لديكم علامات المرض.
- يرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلي، في حال ظهور أية آثار جانبية. وذلك يتضمن أي آثار جانبية محتملة لم يتم ذكرها في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

يعرف هذا المستحضر بالاسم المذكور أعلاه لكن سيتم الإشارة إليه بـأكتوس مت ضمن هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:
١. ما هو أكتوس مت وما هي دواعي استخدامه
٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول أكتوس مت
٣. طريقة تناول أكتوس مت
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. ظروف تخزين أكتوس مت
٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية

١. ما هو أكتوس مت وما هي دواعي استخدامه

يحتوي أكتوس مت على بيوغليتازون وميتفورمين. وهو دواء خافض للسكر يُستخدم لدى البالغين لعلاج داء السكري من النوع الثاني (الغير معتمد على الانسولين) عندما لا يكون العلاج بميتفورمين أثر جانبي نادر كافياً. وعادة ما يتطور داء السكري من النوع الثاني في مرحلة البلوغ بشكل خاص نتيجة للوزن الزائد، وحيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الانسولين (الهرمون الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم)، أو عندما لا يمكنه استخدام الانسولين الذي ينتجه بشكل فعال. سيتحقق طبيبك من أنك كنت مصاباً بالسكري بعد فترة من ٣ إلى ٦ أشهر من بدء تناوله.

يساعد أكتوس مت على التحكم في مستوى السكر في الدم عندما تكون مصاباً بداء السكري من النوع الثاني من خلال مساعدة جسمك على الاستفادة من الانسولين الذي ينتجه بشكل أفضل.

٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول أكتوس مت

لا تتناول أكتوس مت
- إذا كنت تعاني من حساسية للبيوغليتازون، لميتفورمين أو لأي من المواد الأخرى المستخدمة في تركيبة هذا الدواء (المذكورة في القسم ٦).
- إذا كنت تعاني من فشل القلب أو سبق وعانيت من فشل القلب في الماضي.
- إذا أصبت مؤخراً بنوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل شديدة في الدورة الدموية بما في ذلك الصدمة، أو من صعوبات في التنفس.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكبد.
- إذا كنت تفرط في تناول الكحول (سواء بشكل يومي أو من وقت لآخر فقط).
- إذا كنت تعاني من داء سكري يصعب السيطرة عليه، مصحوب، على سبيل المثال، بارتفاع شديد في الجلوكوز في الدم (جلوكوز الدم المرتفع)، عثيان، قيء، إسهال، خسارة سريعة في الوزن، الحماض اللاكتيكي (انظر في قسم "خطورة الحماض اللاكتيكي") أو الحماض الكيتوني. الحماض الكيتوني عبارة عن حالة تتراكم فيها مواد تسمى "الأجسام الكيتونية" في الدم بحيث تؤدي إلى مُقَمّنة غيبوبة السكري. تتضمن الأعراض ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الشعور بالنعاس أو أن في نفسك رائحة فاكهية غير اعتيادية.
- إذا كنت تعاني من سرطان المثانة أو عانيت منه مسبقاً.
- إذا كان لديك دم في البول لم يفحصه الطبيب.
- إذا كنت تعاني من انخفاض شديد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من عدوى شديدة أو من الجفاف.
- إذا كنت ستخضع لنوع معين من التصوير بواسطة الأشعة السينية والتي تشمل الحقن بصبغة. قم بالتحدث إلى طبيبك، حيث يجب أن تتوقف عن استخدام أكتوس مت لفترة معينة من الوقت قبل وبعد الفحص.
- إذا كنت ترضعين طبيعياً.

الاحتياطات والتحذيرات
تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أكتوس مت (انظر أيضاً القسم ٤):
- إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب. بعض المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني طويل المدى وأمراض القلب أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية سبقاً وتم علاجهم ببيوغليتازون والانسولين معاً، عانوا من الإصابة بفشل القلب. قم بإبلاغ طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا عانيت من علامات فشل القلب مثل ضيق غير عادي في التنفس أو زيادة سريعة في الوزن أو تورم موضعي (ونمة).
- إذا كنت تعاني من احتباس الماء في الجسم (احتباس السوائل) أو تعاني من مشاكل فشل القلب، خصوصاً إذا كنت بعمر يتجاوز ٧٥ عاماً. إذا كنت تتناول أدوية مضادة للالتهابات والتي يمكن أيضاً أن تسبب احتباس السوائل والتورم، فيجب عليك أيضاً إخبار طبيبك بذلك.
- إذا كنت تعاني من نوع خاص من اعتلال الشبكية السكري يسمى الوذمة البقعية (تورم الجزء الخلفي من العين)، تحدث مع طبيبك إذا لاحظت أي تغير في الإبصار لديك.
- إذا كنت تعانين من أكياس على المبايض (متلازمة تكيس المبايض). قد تزيد احتمالات حدوث حمل حيث قد تحدث الإباضة من جديد عندما تتناولين أكتوس مت. إذا كان هذا ينطبق عليك، فاستخدمي وسائل منع الحمل المناسبة لتجنب احتمال حدوث حمل غير مخطط له.
- إذا كنت تعاني من مشكلة في الكبد. قبل البدء بتناول أكتوس مت، سيتم سحب عينة دم منك لفحص وظائف الكبد. وينبغي تكرار هذا الفحص على فترات. أبلغ الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من أعراض تدل على وجود مشكلة في الكبد (مثل الغثيان الغير مفسر، القيء، ألم في المعدة، التعب، فقدان الشهية وألو البول الداكن) حيث يجب فحص وظائف الكبد.
قد تعاني أيضاً من انخفاض في عدد خلايا الدم (الأنيميا).
خطورة الحماض اللاكتيكي
يمكن لأكتوس مت أن يسبب أثر جانبي نادر جداً، ولكن خطير يسمى الحماض اللاكتيكي، خاصةً إذا كانت كليتيك لا تعملان كما ينبغي. خطورة حدوث الحماض اللاكتيكي ترتفع أيضاً مع داء السكري الذي يصعب السيطرة عليه، الالتهابات الخطيرة، الصيام لأوقات طويلة أو تناول الكحول، الجفاف (انظر المزيد من المعلومات أدناه)، مشاكل في الكبد وأي حالة صحية يكون فيها جزء من الجسم يعاني من نقص في إمداد الأكسجين (مثل مرض القلب الحاد الشديد).
إذا كان أي من المذكور أعلاه ينطبق عليك، تحدث إلى طبيبك للمزيد من التعليمات.
توقف عن تناول بيوغليتازون/ميتفورمين لوقت قصير إذا كان لديك حالة صحيّة من الممكن أن تكون مصحوبة بالجفاف (علامات فقدان سوائل الجسم) مثل القيء، الشديد، الإسهال، الحمّى، التعرض للحرارة أو إذا كنت تتناول سوائل بكمية أقل من الطبيعي. تحدث إلى طبيبك للمزيد من التعليمات.
توقف عن تناول بيوغليتازون/ميتفورمين وتواصل مع الطبيب أو أقرب مستشفى على الفور إذا عانيت من بعض أعراض الحماض اللاكتيكي، حيث أن هذه الحالة ممكن أن تؤدي إلى غيبوبة.
أعراض الحماض اللاكتيكي تتضمن:
- قيء
- ألم في المعدة (ألم في منطقة البطن)
- تشنجات في العضلات
- شعور عام بأنك بحالة غير جيدة وإرهاق شديد
- صعوبة في التنفس
- انخفاض في حرارة الجسم ونبض القلب

الحماض اللاكتيكي هو حالة صحية طارئة ويجب أن يتم علاجها في المستشفى
خلال العلاج بأكتوس مت، سيقوم طبيبك بفحص وظائف الكلى مرة سنوياً على الأقل أو بشكل أكثر تكراراً إذا كنت من المسنين و/أو تعاني من تدهور في وظائف الكلى.
عليك إيقاف أكتوس مت خلال أو أحياناً بعد إجراء العملية، إذا كان يجب عليك أن تخضع لعملية جراحية كبيرة. سوف يقرر طبيبك التوقيت الذي سوف تقوم بإيقاف علاجك بأكتوس مت وتوقيت استئنافه.
نقص سكر الدم
إذا كنت تتناول أكتوس مت مع أدوية أخرى لعلاج مرض السكري، فمن المرجح أن تنخفض نسبة السكر في الدم دون المستوى الطبيعي (نقص سكر الدم). إذا عانيت من أعراض نقص سكر الدم، مثل الضعف، الدوخة، زيادة التعرق، سرعة نبضات القلب، اضطرابات الرؤية أو صعوبة في التركيز، فيجب أن تتناول بعض السكر لزيادة مستوى السكر في الدم مرة أخرى. اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات إذا كنت غير متأكد من كيفية التعرف على هذه الحالة. من المستحسن حمل بعض السكر، الحلوى، البسكويت أو عصير فواكه يحتوي على السكر دائماً معك.
كسر العظام
لوحظ حدوث عدد أكبر من كسور العظام في المرضى الذين يتناولون بيوغليتازون، وخاصةً النساء منهم. سيأخذ طبيبك ذلك في الاعتبار عند علاج داء السكري لديك.
الأطفال والمراهقين
لا ينصح باستخدامه للأطفال والمراهقين دون سن ١٨ عاماً.
الأدوية الأخرى وأكتوس مت
عليك التوقف عن تناول أكتوس مت قبل أو عند وقت الحقن، إذا كنت بحاجة لحقن الوسّط التبايُني الذي يحتوي على اليود في مجرى دمك، على سبيل المثال أثناء الفحص عن طريق الإشعاع السيني أو المسح الطمّي. سوف يقرر طبيبك التوقيت الذي سوف تقوم بإيقاف علاجك مع أكتوس مت وتوقيت استئنافه.
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً، أو قد تتناول أية أدوية أخرى. يمكن أن تكون بحاجة لفحص أكثر تكراراً لجلوكوز الدم ووظائف الكلى، أو يمكن أن يحتاج طبيبك لتعديل جرعة أكتوس مت. من المهم جداً أن تقوم بذكر التالي:
- جامفيبروزيل (المستخدم لخفض نسبة الكوليسترول)
- ريفامبيسين (المستخدم لعلاج السل وأنواع أخرى من العدوى)
- سيميتيدين (المستخدم لتقليل حموضة المعدة)
- الكورتيكوتيدات السكرية (المستخدمة لعلاج الالتهابات)
- ناهضات بيتا-٢ (المستخدمة لعلاج الربو)
- الأدوية التي تزيد من إدرار البول (مدرات البول)
- الأدوية التي تستخدم لعلاج الألم والالتهاب (مضادات الالتهاب الغير ستيرودية ومثبطات إنزيمات الأكسدة الحلقية-٢، مثل إيبوبروفين وسيليكوكسيب)
- بعض الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومضاد مستقبل الأنجيوتنسين II)

أكتوس مت مع الحمل
تجنب التناول المفرط للكحول عند تناول أكتوس مت حيث أن الكحول قد يزيد من خطر تطور الحماض اللاكتيكي (انظر "خطورة الحماض اللاكتيكي").
الحمل والرضاعة
- يجب عليك استشارة الطبيب إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حاملاً أو تخططين لذلك. لا يوصى بتناول أكتوس مت أثناء الحمل. إذا كنت ترغبين في الحمل، فينصحك طبيبك بالتوقف عن تناول هذا الدواء.
- لا تقومي بتناول أكتوس مت إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية (انظر قسم "لا تتناول أكتوس مت").

القيادة واستخدام الآلات
لن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات ولكن يجب توخي الحذر إذا كنت تعاني من رؤية غير طبيعية.

يحتوي أكتوس مت على الصوديوم
يحتوي أكتوس مت على الصوديوم. يحتوي كل قرص مغطى بطبقة رقيقة من أكتوس مت ١٥ ملغم/٨٥٠ ملغم أقراص مغطاة بطبقة رقيقة على ٩,٥ ملغم صوديوم تقريباً وهو أقل من ١ ملمول (٢٣ ملغم)، ويعد 'خالٍ من الصوديوم' بشكل أساسي.

٣. طريقة تناول أكتوس مت

قم دائماً بتناول دوائك كما هو مذكور في هذه النشرة أو كما وصفه لك طبيبك أو الصيدلي تماماً. تحقق من طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.
الجرعة الموصى بها هي قرص واحد يتم تناوله مرتين يومياً. إذا لزم الأمر، قد يخبرك طبيبك بتناول جرعة مختلفة. إذا تعاني من انخفاض في وظائف الكلى، يمكن أن يقوم طبيبك بوصف جرعة أقل، بحيث يمكن أن تحتاج أن يتم اعطائك أقراص منفصلة من بيوغليتازون وميتفورمين.
يجب عليك إبلاغ الأقراص مع كوب من الماء. يمكنك أن تأخذ أقراسك مع الطعام أو بعد مباشرة للتقليل من إمكانية حدوث اضطراب في المعدة.
إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً خاصاً لمرضى السكري، فيجب عليك الاستمرار بذلك أثناء تناولك لأكتوس مت.
يجب فحص الوزن على فترات منتظمة. إذا حصلت زيادة في الوزن، عليك إبلاغ الطبيب.
سوف يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات دم بصورة دورية أثناء العلاج بأكتوس مت. وهذا للتأكد من أن كبدك يعمل بشكل طبيعي. لمرة واحدة على الأقل سنوياً (وقد تكون لعدد أكثر من المرات إذا كنت من كبار السن أو تعاني من مشاكل في الكلى) سيتحقق طبيبك من عمل الكليتين بشكل طبيعي.

إذا تناولت أكتوس مت أكثر من اللازم
إذا تناولت جرعة زائدة من الأقراص بطريق الخطأ، أو إذا قام شخص آخر أو طفل بتناول دوائك، فتحدّث إلى طبيبك أو الصيدلي على الفور. قد تنخفض نسبة السكر في الدم دون المستوى الطبيعي ويمكن زيادتها بتناول السكر. من المستحسن حمل بعض السكر، الحلوى، البسكويت أو عصير فواكه يحتوي على السكر دائماً معك.
إذا تناولت أكتوس مت أكثر من اللازم، فقد تعاني من الحماض اللاكتيكي. وتشمل أعراض الحماض اللاكتيكي (انظر قسم "خطورة الحماض اللاكتيكي").
إذا نسيت تناول أكتوس مت
قم بتناول أكتوس مت يومياً كما وصفه الطبيب لك. مع ذلك، في حال نسيت جرعة، تجاهل هذه الجرعة وتابع تناول الجرعة التالية كالمعتاد. لا تقم بتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.
إذا توقفت عن تناول أكتوس مت
يجب تناول أكتوس مت كل يوم حتى يعمل بشكل صحيح. إذا توقفت عن تناول أكتوس مت، فقد ترتفع نسبة السكر في الدم. تحدث مع طبيبك قبل إيقاف هذا العلاج.
إذا كان لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، إلا أنه ليس بالضرورة أن تحدث لدى جميع مستخدمي هذا الدواء.
يمكن أن يسبب بيوغليتازون/ميتفورمين أثر جانبي نادر جداً (قد يؤثر على ما يصل إلى شخص من كل ١٠٠٠٠ شخص)، لكنه خطير، يسمى الحماض اللاكتيكي (انظر قسم "خطورة الحماض اللاكتيكي"). إذا حدث هذا عليك التوقف عن تناول بيوغليتازون/ميتفورمين والتواصل مع طبيبك أو أقرب مستشفى على الفور، بحيث يمكن أن يؤدي الحماض اللاكتيكي إلى غيبوبة.
وقد تمت الإصابة بسرطان المثانة بشكل غير شائع (قد يؤثر على ما يصل إلى شخص من كل ١٠٠ شخص) في المرضى الذين يتناولون بيوغليتازون/ميتفورمين. وتشمل العلامات والأعراض دم في البول، ألم عند التبول أو الحاجة إلى التبول فجأة. إذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض، فتحدّث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن.
تم الإبلاغ عن كسور في العظام بشكل شائع (قد يؤثر على ما يصل إلى شخص من كل ١٠ أشخاص) في المرضى الإناث اللواتي يتناولن بيوغليتازون/ميتفورمين، كما تم الإبلاغ عن ذلك أيضاً لدى المرضى الذكور الذين يتناولون أكتوس مت (لا يمكن تقدير الشيوع من البيانات المتاحة). تحدث إلى طبيبك بأسرع وقت إذا عانيت من هذه الآثار الجانبية.
تم الإبلاغ عن تغيم الرؤية بسبب تورم (أو سوائل) في الجزء الخلفي من العين (الوذمة البقعية) (لا يمكن تقدير الشيوع من البيانات المتاحة). تحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا عانيت من هذه الأعراض لأول مرة. أيضاً، إذا كنت تعاني بشكل مسبق من تغير الرؤية وابتدأت الأعراض بالازدياد سوءاً، فتحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن.
تم الإبلاغ عن حدوث ردود فعل تحسسية بتكرار غير معروف (لا يمكن تقديره من البيانات المتاحة) لدى المرضى الذين يتناولون بيوغليتازون/ميتفورمين. إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي خطير، بما في ذلك الشري وتورم في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق قد يتسبب في صعوبة في التنفس أو البلع، توقف عن تناول هذا الدواء، وتحدث إلى طبيبك على الفور.
وقد وابه بعض المرضى الذين يتناولون بيوغليتازون/ميتفورمين الآثار الجانبية التالية:
شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من شخص من كل١٠ أشخاص)
- ألم المعدة
- الشعور بالرغبة في القيء (الغثيان)
- القيء
- الإسهال
- فقدان الشهية

شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص من كل ١٠ أشخاص)
- تورم موضعي (ونمة)
- زيادة في الوزن
- صداع
- عدوى الجهاز التنفسي
- رؤية غير طبيعية
- ألم في المفاصل
- الحكّة (الضعف الجنسي)
- دم في البول
- انخفاض في عدد خلايا الدم (الأنيميا)
- تململ
- اضطرابات في حاسة التذوق

غير شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص من كل ١٠٠ شخص)
- التهاب الجيوب الأنفية
- غازات
- صعوبة في النوم (أرق)

نادرة جداً (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص من كل ١٠٠٠٠ شخص)
- انخفاض في كمية فيتامين B_{12} في الدم
- احمرار الجلد
- حكة في الجلد
- طفح جلدي ومثير للحكة نتئي عن سطح الجلد (الشرى)

آثار جانبية غير معروفة (لا يمكن تقدير الشيوع من البيانات المتاحة)
- التهاب الكبد
- الكبد لا يعمل بشكل جيد كما يجب (تغيرات في إنزيمات الكبد)

٥. ظروف تخزين أكتوس مت

احفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.
يحفظ عند درجة حرارة أقل من ٣٠° مئوية.
يحفظ داخل العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.
لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية بعد "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت أي علامات تلف واضحة عليه.
لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. هذه الإجراءات ستساعد في الحفاظ على سلامة البيئة.

٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية

ما هي محتويات أكتوس مت
المواد الفعّالة هي هيدروكلوريد البيوغليتازون وهيدروكلوريد الميتفورمين. يحتوي كل قرص مغطى بطبقة رقيقة من أكتوس مت ١٥ ملغم/٨٥٠ ملغم أقراص مغطاة بطبقة رقيقة على هيدروكلوريد البيوغليتازون يكافئ ١٥ ملغم بيوغليتازون و٨٥٠ ملغم هيدروكلوريد الميتفورمين.
المواد الأخرى المستخدمة في التركيبة التصنيعية هي:أب أفرص: سيللوز بلوري مكروي، بوفيدن، كروسكارميللوز الصوديوم وستيرات الماغنيسيوم. غلاف الفرص: هيدروميللوز، ماكروجول، تالك وثاني أكسيد التيتانيوم.
ما هو شكل أكتوس مت ووصفه ومحتويات العبوة
أكتوس مت ١٥ ملغم/٨٥٠ ملغم أقراص مغطاة بطبقة رقيقة هي أقراص ليمون مائل إلى الأبيض المصغر محدبة مستطيلة الشكل مغطاة بطبقة رقيقة، منقوش عليها "15/850" على جهة واحدة و"4833M" على الجهة الأخرى في أشرطة من الألمنيوم-الألمنيوم.
حجم العبوة: ٥٦ قرص مغطى بطبقة رقيقة.
اسم وعنوان مالك رخصة التسويق
الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة الخاصة
صندوق بريد ٤٢
السلط، الأردن
هاتف: ٣٤٩٢٢٠٠ (٥-٩٦٢) +
فاكس: ٣٤٩٢٢٠٣ (٥-٩٦٢) +
الشركة المصنعة
شركة دايتو الدوائية المحدودة
١-١ دوشوماتشي ٤-شتشومي-كو،
أوساكا/ ٥٤٠-٨٦٤٥، اليابان
هاتف: ٢١١١-٦٢٠٤-٨١ +
فاكس: ٢٨٨٠-٦٢٠٤-٨١ +
بترخيص من
شركة تاكيدا الدوائية الدولية المحدودة،
سويسرا
تمت مراجعة هذه النشرة بتاريخ ٢٠٢٢/١١ رقم النسخة JO3.0.
للإبلاغ عن الآثار الجانبية
تحدث إلى الطبيب، الصيدلي، أو الممرض إذا عانيت من أية آثار جانبية. وذلك يشمل أي آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة. كما أنه يمكنك الإبلاغ عن هذه الآثار مباشرةً (انظر التفاصيل المذكورة أدناه). من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة بتوفير معلومات مهمة عن سلامة الدواء.
- الأردن
المؤسسة العامة للغذاء والدواء- قسم الاستخدام الرشيد للدواء واليقظة الدوائية
البريد الإلكتروني: jpc@jfda.jo
الموقع الإلكتروني: https://primaryreporting.who-umc.org/JO
الهاتف: ٥٣٢٠٠٠٥ (٦-٩٦٢) +
رمز الاستجابة السريعة:

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

هذا مستحضر دوائي
- يؤثر المستحضر الدوائي على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات الموصى بها يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة تعليمات الطبيب وطريقة الاستخدام الموصى بها وتعليمات الصيدلي التي قام بصرفه لك.
- إن الطبيب والصيدلي خبيران بالمستحضرات الدوائية وبنفعها وضررها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- احفظ جميع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

112022

Takeda

hikma.