

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SECURITAIRE ET EFFICACE DE
VOTRE MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT À L'INTENTION DES PATIENTS

APO-AMPI

Trihydrate d'ampicilline, USP

Capsules

Poudre pour suspension orale

Veuillez lire attentivement le présent dépliant avant de commencer à prendre APO-AMPI et chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Parlez à votre professionnel de la santé de votre affection médicale et de votre traitement, et demandez-lui s'il existe de nouveaux renseignements au sujet d'APO-AMPI.

Quelles sont les raisons d'utiliser APO-AMPI?

- **On utilise APO-AMPI pour traiter les infections.**
- Les antibactériens, comme APO-AMPI, ne traitent que les infections bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales, comme le rhume.

Comment APO-AMPI agit-il?

APO-AMPI est un antibiotique. Il empêche la croissance des bactéries et les détruit.

Quels sont les ingrédients d'APO-AMPI?

Ingédient médicinal : trihydrate d'ampicilline

Ingédients non médicinaux (capsules) : acide stéarique, croscarmellose sodique, silice colloïdale et talc.

Ingédients non médicinaux (poudre pour suspension) : arôme artificiel de cerise, benzoate de sodium, citrate de sodium, gomme de guar, rouge FD&C n° 40 et sucre.

APO-AMPI est offert dans les formes posologiques suivantes :

En capsules de 250 mg et de 500 mg, et en poudre pour suspension à 125 mg/5 mL et à 250 mg/5 mL.

Ne prenez pas APO-AMPI si :

- vous êtes allergique à la pénicilline;
- vous êtes allergique à une classe d'antibiotiques appelée « céphalosporines ».

Parlez à votre professionnel de la santé avant de prendre APO-AMPI, afin d'éviter la survenue de tout effet secondaire et d'assurer l'utilisation correcte du médicament. Discutez de toute affection ou de tout problème de santé dont vous êtes atteint, notamment si :

- vous avez des allergies;
- vous avez une maladie grave;
- vous avez des problèmes rénaux;
- vous avez pris des antibiotiques pendant une période prolongée;

- vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir;
- vous allaitez.

Vous devez informer votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

Comment prendre APO-AMPI :

- Prenez toujours ce médicament exactement comme vous l'a indiqué votre médecin ou votre pharmacien.
- Il est préférable de prendre APO-AMPI 1 heure avant les repas.
- En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Même si vous vous sentez mieux dès le début du traitement, vous devez prendre APO-AMPI exactement comme on vous l'a prescrit.
- L'utilisation inadéquate ou excessive d'APO-AMPI pourrait contribuer à la croissance de bactéries qui ne seront pas tuées par le médicament (résistance), ce qui signifie qu'APO-AMPI pourrait ne pas être efficace pour vous à l'avenir.
- Ce médicament ne doit pas être partagé avec une autre personne.

Posologie habituelle :

- Votre médecin décidera quelle quantité d'APO-AMPI vous prendrez et pendant combien de temps vous devrez le prendre.

Surdose :

Si vous pensez avoir pris trop d'**APO-AMPI**, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que possible. Si c'est presque l'heure de prendre votre prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et prenez la prochaine dose selon l'horaire habituel.
- Ne prenez pas deux doses d'APO-AMPI en même temps.
- Si vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Quels sont les effets secondaires possibles d'APO-AMPI?

Lorsque vous prenez APO-AMPI, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires pourraient comprendre les suivants :

- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme/effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Cas graves seulement	Dans tous les cas	
Réactions allergiques : difficulté à respirer, difficulté à avaler, fièvre, urticaire, démangeaisons cutanées, éruption cutanée, enflure de la langue ou de la gorge.	√		
Colite pseudomembraneuse (inflammation de l'intestin) : crampes abdominales, douleur ou sensibilité, déshydratation, fièvre, nausées, diarrhée liquide ou sanguine.			√
Glossite (inflammation de la langue) : langue rouge, douloureuse ou enflée.		√	
Langue noire pileuse	√		
Stomatite (enflure et lésions dans la bouche) : sensation de brûlure et douleur dans la bouche, difficulté à manger, enflure ou lésions dans la bouche.			
Éruption cutanée ou peau qui pèle			
Anémie (diminution du nombre de globules rouges) : étourdissements, sensation de fatigue et de faiblesse, manque d'énergie, essoufflement.		√	
Thrombopénie (diminution du nombre de plaquettes dans le sang) : saignements, ecchymoses, fatigue, faiblesse.			
Leucopénie (diminution du nombre de globules blancs) : douleurs, sensation de fatigue, fièvre, syndrome pseudo-grippal, infections.			

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui ne figure pas dans cette liste ou qui devient suffisamment gênant pour compromettre vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Pour déclarer les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé à Santé Canada :

- Consultez la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/meffect-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- Composez le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Conservation :

Conserver à la température ambiante (15 à 30 °C) dans un contenant hermétique.

La suspension reconstituée est stable pendant 21 jours lorsqu'elle est réfrigérée à 4,5 °C. Ne pas congeler.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur APO-AMPI :

- Consultez votre professionnel de la santé.
- Vous pouvez obtenir la monographie de produit complète rédigée pour les professionnels de la santé (qui contient les renseignements sur le médicament à l'intention des patients), en visitant le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>). Vous pouvez obtenir les renseignements sur le médicament à l'intention des patients en consultant le site Web du fabricant (<http://www.apotex.ca/produits>), ou en téléphonant au 1-800-667-4708.

Le présent dépliant a été préparé par Apotex Inc.

Dernière révision : 20 mars 2019