



نشرة العبوة: معلومات للمستخدم إيكلويزج 15 ملغ أقراص مغلفة إيكلويزج 45 ملغ أقراص مغلفة
يوناتينيب

اقرأ جميع محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء ليتناسب مع حالتك فقط، لذا لا تتصغ به الآخرين ؛ فيمكن أن يضرهم، حتى إذا كانت أعراض المرض لديهم مماثلة لأعراض مرضك.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية، فاستشر الطبيب أو الصيدلي، يشمل ذلك أي آثار جانبية مستمرة غير مبررة في هذه النشرة.

ماذا يوجد في هذه النشرة

- الأثار الجانبية الخطيرة.
- ما هوالدواء إيكلويزج وماهي دواعي إستعماله
- ما يجب معرفته قبل أن تتناول الدواء إيكلويزج.
- كيف تستعمل الدواء إيكلويزج.
- الأثار الجانبية المحتملة.
- كيف تخزن الدواء إيكلويزج.
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1. الأثار الجانبية الخطيرة

يمكن لإيكلويزج أن يتسبب في ظهور آثار جانبية خطيرة، على الرغم من عدم تعرض كل الأشخاص الذين يتناولون إيكلويزج لتلك الآثار الجانبية، **الجلطات الدموية أو انسداد الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة)**، يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية أو انسداد الأوعية الدموية إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتات دماغية أو إلى الوفاة.إصابةك بالجلطة الدموية أو انسداد الأوعية الدموية يمكن أن تتسبب في منع تدفق الدم بالشكل الصحيح إلى القلب والمخ والأعضاء (الأمعاء) والساقين واليدين والأجزاء الأخرى من الجسم، وقد تحتاج لإجراء جراحة عاجلة أو علاج سريع في المستشفى.

اطلب المساعدة الطبية على الفور إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية الخطيرة التالية:

- الشعور بألم أو ضغط في الصدر.
- تورم الساق.
- ألم في الذراعين أو الساقين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.
- صعوبة في التحدث.
- خيق في التنفس.
- صداع.

- خدر أو ضعف في أحد جانبي الجسم.
- ألم شديد في منطقة المعدة.
- انخفاض في القدرة على الرؤية أو فقدان البصر.

يمكن أن تحدث الجلطات الدموية أو انسداد الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من وجود عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتضمن ذلك الأشخاص الذين يبلغون الخمسين عامًا أو الأصغر من ذلك، وتتضمن عوامل الخطر الأكثر شيوعًا المنسببة في تلك المشكلات الصحية: وجود تاريخ مرضي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات مرتفعة من الدهون في الدم (فرط كوليستيرول الدم)، وأمراض القلب، وحدثت الجلطات الدموية أو انسداد الأوعية الدموية في الغالب لدى الأشخاص مع تقدمهم في العمر، ولدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بانخفاض تدفق الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو ممن يعانون من مستويات مرتفعة من الدهون في الدم.

مشكلات في القلب، يمكن لإيكلويزج أن يسبب مشكلات في القلب، تتضمن قصور القلب، والتي قد تكون خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، يشير قصور القلب إلى أن القلب لا يضخ الدم بالشكل الكافي، ويمكن لإيكلويزج أيضًا أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب بمعدلات سريعة أو بطيئة، وكذلك حدوث نوبة قلبية، يقوم طبيب فحص مشكلات القلب خلال فترة علاجك بإيكلويزج، **اطلب العناية الطبية فورًا** إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية **الخطيرة التالية**:

- خيق في التنفس.
- ألم في الصدر.
- ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.
- الدوار.
- الشعور بالإنهزام.

مشاكل الكبد: يمكن لإيكلويزج أن يسبب مشكلات في الكبد، تتضمن قصور في الكبد، والذي يمكن أن يكون حالة خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، يقوم طبيبك بإجراء فحوصات للدم قبل وأثناء، لتفليح علاج بإيكلويزج للتحقق من وجود مشاكل في الكبد، **اطلب العناية الطبية فورًا** إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية **الخطيرة التالية** لمشاكل الكبد أثناء العلاج:

اصفرار الجلد أو الجزء الأبيض من العينين (اليرقان).

بول داكن "بولون الشاي".

عشور بالنعاس.

فقدان الشهية.

نزيف أو كدمات.

2. ما هوالدواء إيكلويزج وماهي دواعي إستعماله

- ينتمي إيكلويزج إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات الترويسين كيناز (TKIs)، وإيكلويسو هو أحد الأدوية التي تُمنح تناولها إلا بوصفة طبية، ويستخدم في علاج البالغين الذين يعانون من أي مما يلي:
- المرحلة المتقدمة أو المرحلة المتسارعة أو مرحلة الإصابة بنوبة أرومية من سرطان الدم النخاعي المزمن، أو فيلادلفيا كروموسوم الإيجابية لسرطان الدم اللبغفاوي (البهاغواي المتعاد الذي لا يمكنه تلقي أي من علاجات مثبطات الترويسين كيناز الأخرى.
- نوع معين من اللجين غير الطبيعي (T315- إيجاي) خلال المرحلة المتقدمة أو الإصابة بنوبة أرومية من سرطان الدم النخاعي المزمن أو T3151- إيجاي
- من فيلادلفيا كروموسوم الإيجابية لسرطان الدم اللبغفاوي المتعاد الذي يتضمن وجود اللجين من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية في الدم ونخاع العظم (حيث تتكون خلايا الدم).
- يجب ألا يُستخدم إيكلويزج في علاج المرضى البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم حديثًا في المرحلة المتقدمة من سرطان الدم النخاعي المزمن.
- لا يجب معرفته قبل أن تتناول الدواء إيكلويزج.

لا تتناول إيكلويزج في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني من **الحساسية من يوناتينيب** أو أيًا من المكونات الأخرى لإيكلويزج (المدرجة في القسم 6)

التحذيرات والاحتياطات

قبل أن تتناول إيكلويزج، استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تعاني من أي مما يلي:

- لديك تاريخ من الإصابة بالجلطات الدموية في الأوعية الدموية (الشرايين أو الأوردة).
- لديك مشاكل في القلب، وتتضمن القصور في القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، ومتلازمة كيو تي الطويلة (QT prolongation).
- تعاني من مرض السكري.
- لديك تاريخ من الإصابة بارتفاع الكوليسترول.
- لديك مشاكل في الكبد.
- لديك التهاب في البنكرياس.
- لديك ارتفاع في ضغط الدم.
- لديك مشاكل نزيف.
- تخطط لإجراء أي عملية جراحية.
- تعاني من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) (تحتوي أقراص إيكلويسج على اللاكتوز).

- تشرب عصير الجريب فروت.
- لديك أي حالة مرضية أخرى.
- إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، حيث يمكن لإكلويزج أن يسبب الضرر للجنين.
- إذا كنتِ تمارسين الرضاعة الطبيعية أو تخططين لممارسة الرضاعة الطبيعية.

فحوصات الدم وغيرها من الفحبيحات الصحية

يقوم طبيبك بإجراء ما يلي:

- تقييم وظائف القلب وحالة الأوعية الدموية والشرايين.

- تعداد كامل لكريات الدم؛

يتم تكرار ذلك كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد بدء العلاج، ثم يتم إجراؤه شهريًا بعد ذلك طبقًا ما يحدده الطبيب.

فحص بروتين السيروم المعروف باسم الليباز؛

يتم فحص بروتين السيروم الذي يُدعى الليباز كل أسبوعين خلال أول شهرين، ثم طبقًا ما يحدده الطبيب، قد يحتاج الأمر لإيقافه مرة واحدة شهريًا على الأقل، أو طبقًا ما يحدده الطبيب.

فحوصات الكبد؛

يتم إجراء فحوصات وظائف كبد مرة واحدة شهريًا على الأقل، أو طبقًا ما يحدده الطبيب.

الأطفال والمراهقين

لا يُعطى هذا الدواء للأطفال أقل من 18 عامًا، حيث لا توجد بيانات خاصة بحالات إعطاء الدواء للأطفال.

إيكلويزج مع الأدوية الأخرى أو الأعشاب أو المكملات الغذائية

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو سوف تتناول دواءً آخر، ويشمل ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، يمكن للأدوية التالية أن تؤثر في إيكلويزج أو تتأثر به:

- كينوكوتازول، إيزراكوتازول، فوريكوتازول، بوساكوتازول**: أدوية لعلاج التهابات الفطرية.
- إندينافير، ليفيتينافير، ريتونايفر، ساكوينافير**: أدوية لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.
- كلاريثروميسين، تيليثروميسين**: أدوية لعلاج التهابات البكتيرية.
- نيفازيدون**: دواء لعلاج الاكتئاب.
- عشبة سانت جون**: مُنح عشبي يستخدم في علاج الاكتئاب.
- كاربامازيبين**: دواء لعلاج الصرع ومرامح الانبساط/ اكتئاب وبعض حالات الألم.
- فيتنوتيبين**: دواء لعلاج الصرع.
- ريفامبين**: دواء لعلاج السلّ، أو بعض أنواع العدوى الأخرى.
- بوسيفيريفر، تيليريفير، أدوية لعلاج التهاب الكبد الفيروسي C،**
- كوفيفانتاز**: دواء لعلاج انخفاض مستويات الصوديوم.

إيكلويزج مع الطعام والشراب

تجنب منتجات الجريب فروت مثل عصير الجريب فروت أثناء تناول إيكلويزج.

يمكن تناول إيكلويزج مع الطعام أو بدون ذلك.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنتِ حاملًا أو تخططين للحمل، استشيري طبيبك قبل تناول إيكلويزج.

التحقق من حالة الحمل لدى الإناث اللواتي لديهن إمكانية الحمل قبل بدء العلاج بإيكلويزج.

بالنسبة للنساء اللواتي يمكن أن يُحملن:

- استخدمي وسيلة فعالة من وسائل منع الحمل أثناء العلاج لمدة 3 أسابيع بعد تناولك للجرعة الأخيرة من إيكلويزج.
- استشيري الطبيب أو الصيدلي على الفور إذا أصبحت حاملًا أو إذا كنت تتفكرين أنك قد أصبحت حاملًا أثناء العلاج بإيكلويزج.
- قد يؤثر إيكلويزج على ذرتك على الإحجاب. استشيري الطبيب إذا كان ذلك يمثل مصدر قلق بالنسبة لك.

الرضاعة الطبيعية:

- من غير المعروف ما إذا كان إيكلويزج يُفرز في حليب الأم أم لا، لذلك، لا تقومين بالرضاعة الطبيعية أثناء العلاج لمدة 6 أيام بعد تناولك للجرعة الأخيرة من إيكلويزج.

بالنسبة للرجال:

يُنصح الرجال الذين يتلقون العلاج بإيكلويزج بعدم إيجاب أطفال أثناء العلاج، يجب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء العلاج.

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات

يُنبغي عليك اتخاذ بعض الاحتياطات الخاصة بالقيادة واستخدام الآلات، حيث قد يتعرض المريض الذي يتناول إيكلويزج لضطراب الرؤية أو الدوار أو الشعور بالنعاس أو التعب.

معلومات هامة عن بعض مكونات إيكلويزج

يحتوي إيكلويسج على اللاكتوز، فأبلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تعاني من عدم تحمل سكر الحليب (اللاكتوز)، واستشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

4. كيف تستعمل الدواء إيكلويسج.

تناول إيكلويزج دائماً طبقاً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي، وينبغي عليك أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة المعتادة هي:

قرص مغلف 45 ملغ للجرعة الموصى بها.

قرص مغلف 15 ملغ للجرعة بتعديل الجرعة.

إذا توقفت عن تناول إيكلويزج

لا تتوقف عن تناول إيكلويزج دون أمر الطبيب.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول استخدام هذا المنتج، استشر الطبيب أو الصيدلي.

5. **الآثار الجانبية المحتملة.**

مثل كل الأدوية يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لكل الأشخاص.

الآثار الجانبية الخطيرة (صاعقة جدًا: تصيب أكثر من 1 في 10 مستخدمين).

• الجلطات الدموية أو انسداد الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة)، يمكن للجلطات الدموية أو انسداد الأوعية الدموية أن يمنع تدفق الدم بالشكل الصحيح إلى القلب والمخ والأجزاء الأخرى من الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى موت الأنسجة أو النوبة القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة.

• ارتفاع ضغط الدم، ينبغي فحص ضغط الدم لديك بشكل منتظم، ويجب أن يتم علاج أي ارتفاع.

• اغتال الأعصاب، قد يؤدي إيكلويزج إلى تلف في أعصاب الذراعين أو المخ أو اليدين أو الساقين أو القدمين (اغتيال الأعصاب). استشر الطبيب إذا شعرت بأيٍ من هذه الأعراض أثناء تلقي العلاج

ألم في الصدر أو خيق في التنفس.

• اغتال الأعصاب، قد يؤدي إيكلويزج إلى تلف في أعصاب الذراعين أو المخ أو اليدين أو الساقين أو القدمين (اغتيال الأعصاب). استشر الطبيب إذا شعرت بأيٍ من هذه الأعراض أثناء تلقي العلاج

بإيكلويزج:

- الضعف والوخز والحرقة والألم في العضلات، وفقدان الشعور في اليدين والقدمين.
- ازدواج الرؤية والمشكلات الأخرى في الرؤية أو صعوبة تحريك العينين، وارتفاع جزء من الوجه، وارتفاعه أو سقوط الجفون أو التغير في التظم.
- التأثير على العينين**، قد تحدث مشكلات خطيرة في العينين كالعمى أو عدم وضوح الرؤية عند استعمال إيكلويزج. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أيٍ من الأعراض التالية: نزيف في العين، أو مضات واضحة من الضوء، أو حساسية تجاه الضوء، أو الذبابية الطائرة، أو الجفاف أو الاتهاب ، أو تورم أو حكة في العين، أو تورم أو احمرار منطقة من الجلد تشعر فيها بالحسونة واللين.
- انخفاض عدد خلايا الدم**، قد يتسبب إيكلويزج في انخفاض عدد خلايا الدم. سيقيم طبيبك بفحص عدد كرات الدم لديك بانتظام أثناء العلاج بإيكلويزج. ابلغ طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من الحمى أو أيًا من الأعراض الأخرى لإتهاب أثناء تناولك لإيكلويزج.
- انخفاض عدد كرات الدم البيضاء التي تُسمى الخلايا المتعادلة (neutrophils) (تتضمن الأعراض: زيادة الميل إلى النزيف أو حدوث الكدمات).
- انخفاض عدد الصفائح الدموية (تتضمن الأعراض: نزفاحات طفيفة، الصداع، تورم في اليدين أو القدمين أو الوجه أو تورم في اليدين أو القدمين).
- انخفاض عدد كرات الدم الحمراء التي تُسمى الخلايا المنعدلة (تتضمن الأعراض: زيادة الميل إلى الإصابة بالتهاب).
- النزيف، يمكن لإيكلويزج أن يسبب النزيف الذي يمكن أن يكون خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. استشر طبيبك إذا حدث لديك أي من علامات النزيف أثناء العلاج بإيكلويزج بما في ذلك:

- القيء الدموي أو إذا كان القيء يبدو مثل لفلق القهوة.
- البول الوردي أو البني.
- البراز الأحمر أو الأسود (الذي يبدو مثل القطران).

سعال الدم أو الجلطات الدموية.

• النزيف غير المعتاد أو الكدمات في البشرة.

• نزف الحيض الأشد من المعتاد.

• النزيف المهبلي غير العادي.

• نزيف الأنف الذي يحدث بشكل متكرر.

• النعاس أو صعوبة الاحتفاظ.

• التشنوش.

• الصداع.

• تغير في الكلام.

- مشكلات الكبد**، يمكن لإيكلويزج أن يسبب مشكلات في الكبد بما في ذلك فشل الكبد. أطلب المساعدة الطبية على الفور إذا شعرت بأيٍ من هذه الأعراض:
- اصفرار البشرة أو الجزء الأبيض من العينين (اليرقان).
- البول الداكن "لون الشاي".

• الشعور بالنعاس.

• فقدان الشهية.

• فقدان الوزن.

• خيق التنفس والسعال.

الآثار الجانبية الخطيرة (صاعقة: تصيب من 1 في 10 مستخدمين بين كل 100 مستخدم):

• التهاب البنكرياس: تتضمن الأعراض ألم مفاجئ في منطقة المعدة والفتيان والقيء، يجب على طبيبك إجراء فحوصات للدم للتحقق من وجود التهاب في البنكرياس أثناء العلاج بإيكلويزج.

• الحمى، والتي تظهر في الغالب مع أعراض لإتهاب الأخرى بسبب انخفاض عدد كرات الدم البيضاء.

• احتباس السوائل، قد يحدث جسمك بكمية كبيرة من السوائل (احتباس السوائل). استشر طبيبك على الفور إذا شعرت بأيٍ من الأعراض التالية أثناء العلاج بإيكلويزج.

- تورم في اليدين أو الكاحل أو القدمين أو الوجه أو الجسم بالكامل.
- زيادة الوزن.

• خيق التنفس والسعال.

• مشكلات القلب وعدم انتظام ضربات القلب، يمكن لإيكلويزج أن يسبب مشكلات في القلب، بما في ذلك الإصابة بقصور القلب. يمكن لإيكلويزج أن يسبب أيضًا عدم انتظام ضربات القلب و النوبة القلبية. استشر طبيبك على الفور إذا شعرت بفقدان الوعي أو الضعف أو الدوار أو ألم في الصدر أو غفقا.

الآثار الجانبية الخطيرة (غير معروفة: لا يمكن تقديرها من البيانات المتاحة):

متلازمة انحلال الورم. تحدث متلازمة انحلال الورم بسبب سرعة تكسر الخلايا السرطانية، ويمكن أن تسبب متلازمة انحلال الورم حدوث أي مما يلي:

- الفشل الكلوي والحاجة إلى الفسيل الكلوي.

• ضربات قلب غير طبيعية.

قد يحتاج طبيبك لإجراء فحوصات للدم للتأكد من وجود متلازمة انحلال الورم.

متلازمة اغتال الدماغ العكسية الخلفية، قد يتسبب إيكلويزج في حدوث حالة تُعرف باسم متلازمة اغتال الدماغ العكسية الخلفية، اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت بصداع أو نوبات الصرع أو التوشوش أو تغير في الرؤية أو مشكلات في التفكير.

• مشكلات محتملة في التنام الجروح، إذا كنت تحتاج لإجراء عملية جراحية، أخبر طبيبك أثناء تلقي العلاج بإيكلويزج، ويجب أن تتوقف عن تناول إيكلويزج قبل أسبوع على الأقل من أي عملية جراحية مُحتمَلة لها.

• نزق في جدار المعدة أو جدار الأعصاب (قنب)، استشر طبيبك فورًا إذا شعرت بأيٍ مما يلي:

- ألم حاد في منطقة المعدة (الطن).

• تورم البطن.

• حرارة عالية.

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى التي قد تحدث، طبقًا للتواتر التالي، ما يلي:

آثار جانبية صاعقة جدًا (تصيب أكثر من 1 في 10 مستخدمين):

- إفكار شرابي مزمن.

• ألم في البطن.

• إسهال.

• قيء.

• تقرحات في الفم وألم في الفم.

• التهاب المسالك البولية.

• إتهاب الجهاز التنفسي العلوي .

• صداع.

• دوار.

• سعال.

• صعوبات التنفس.

• الطفح الجلدي والحالات المرتبطة به.

• جفاف الجلد.

• حكة في البشرة.

• آلام المفاصل.

• آلام العضلات.

• تقلصات العضلات.

• آلام في الذراعين أو الساقين.

• آلام الظهر.

• آلام العظام.

• التعب.

• الحمى الشديدة.

• نزلات البرد.

• انخفاض الشهية.

• الأرق.

• ارتفاع مستوى عدد إنزيمات الكبد في الدم التي تُدعى:

• ناقلة أمين الألاتين (Alanine aminotransferase)

• ناقلة أمين الأسبارتات (Aspartate aminotransferase)

• الفوسفاتاز القلوي (Alkaline phosphatase)

• انخفاض مستوى عدد إنزيمات الكبد في الدم التي تُدعى:

• الألبومين

• البيليروبين

• فقر الدم .

• انخفاض عدد خلايا الدم.

• ارتفاع مستوى عدد من إنزيمات البنكرياس في الدم تُدعى:

• الليباز

• الأميلاز

• التغير في مستويات العناصر التالية في الدم:

• الفوسفور (ينخفض)

• الكالسيوم (يرتفع أو ينخفض)

• الصوديوم (يرتفع أو ينخفض)

• الجلكوز (يرتفع أو ينخفض)

• البوتاسيوم (يرتفع أو ينخفض)

• الكرياتينين (يرتفع)

• مستويات العناصر التالية في الدم:

• الكالسيوم (يرتفع أو ينخفض)

• الفوسفور (ينخفض)

• فقدان الوزن.

• زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

إذا حدث تقافق من أيٍّ من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مبررة في هذه النشرة، يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي.

6. كيف تخزن الدواء إيكلويزج.

يُحفظ إيكلويزج بعيدًا عن متناول أيدي ومرأى الأطفال.

يحفظ إيكلويزج في درجة حرارة لا تتخطى 30 درجة مئوية. ويحفظ في العبوة الأصلية.

تحتوي الزجاجاة على عبوة بلاستيكية محكمة الغلق تحتوي على العامل المُجفّف. احتفظ بالعبوة في الزجاجاة. لا تتلغ العامل المُجفّف.

لا تستخدم إيكلويسج بعد تاريخ الانتهاء، الموضح على العبوة بعد كلمة **EXP** . يشير تاريخ الانتهاء إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب عدم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو ضمن النفايات المنزلية. استشر الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد في حاجة إليها، حيث تساعد تلك الإجراءات على حماية البيئة.

7. **محتويات العبوة ومعلومات أخرى**

ما هي محتويات الدواء إيكلويزج

المادة الفعالة هي يوناتينيب.

يحتوي كل قرص مغلف 15 ملغ على 15 ملغ من يوناتينيب (هيدروكلوريد يوناتينيب).

يحتوي كل قرص مغلف 45 ملغ على 45 ملغ من يوناتينيب (هيدروكلوريد يوناتينيب).

مالك ترخيص التصديق هو :
Pharmaceuticals, Inc. (A Wholly-Owned Subsidiary of Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.)
40 Lansdowne Street
Cambridge, MA, 02139
United States

شركة **Biologix FZ Co** مسؤولة على التوزيع وسلامة الدواء

في بلدان منتخبة في الشرق الأوسط

Biologix FZ Co

المنطقة الحرة في دبي، الطريق **WB 21** مخازن ، **C 17** .

صندوق بريد رقم 54405 .

التاور، دبي، الإمارات العربية المتحدة

تم اعتماد هذه النشرة في 2017/12، الإصدار رقم 01

لأي معلومات إضافية عن هذا المستحضر، الرجاء الاتصال بالممثل المحلي

للشركة مالكة رخصة التسويق:

Biologix, FzCo, Dubai Free Zone, Road WB 21

بيولوجيوكس

warehouse C17 PO Box 54405

انخفاض مستوى عدد إنزيمات الكبد في الدم التي تُدعى:

• الألبومين

• البيلي