

# سيديروكت أقماع

## التركيب:

يحتوى كل قمع على:

## المواد الفعالة:

- سينكوكاين هيدروكلوريد 5 مجم
- هيدروكورتيزون 5 مجم
- فراميسيتين سلفات 10 مجم
- ايسكلوسايد 10 مجم

## السواغ:

- دهون صلبة

## دواعى الاستعمال:

الحد من الألم والتورم والبواسير وغيرها من إصابات المستقيم. علاج التهاب المستقيم الغير محدد الحاد والمزمن، البواسير الداخلية الحادة، شروخ ونواسير غير مكتملة ، حكة شرجية داخلية وخارجية. يمكن استخدامه قبل وبعد عمليات استئصال البواسير وفي اصلاح الشروخ.

## موانع الاستعمال والتحذيرات:

- الحساسية لأى من المكونات.
- لايجب استخدام هيدروكورتيزون في وجود الدرن (السل) أوالتهابات الفطرية أوالفيرسية.
- لايستخدم أثناء الحمل وذلك لتأثير الكورتيكوستيرويدات على الأجنة فى حيوانات التجارب. ولم يثبت تأثيره على الأجنة البشرية.
- مثل جميع المستحضرات التى تحتوى على ستيرويدات موضعية يجب أن يوضع فى الاعتبار احتمالات الامتصاص الجهازى. يجب تجنب العلاج الطويل الأمد فى الأطفال.
- يمكن أن يؤدى إلى تثبيط للغدة الكظرية .

## احتياطات:

يجب وقف العلاج اذا حدث أى حساسية منه. لا ينبغى استخدام الهيدروكورتيزون حتى يتم فحص المستقيم والشرج بطريقة كافية وعمل التشخيص. لا يجب تجاهل التدايبير الخاصة الأخرى ضد الالتهابات والحساسية والعوامل العادية الأخرى. يجب الأخذ فى الاعتبار وجود احتمالية، ولو ضئيلة، أن الاستخدام المطول لهذا الدواء قد يؤدى إلى تأثير كورتيكوستيرويدى شامل. ينصح المرضى ببلاغ الأطباء المعالجين عن أى استخدام سابق للهيدروكورتيزون.

## الحمل:

الاستخدام الموضعي الأمن للكورتيكوستيرويدات أثناء الحمل لم يتم التأكد منه تماما. ولذلك، أثناء الحمل، لا ينبغى استخدامهم بغير داع على مساحات واسعة أو بكميات كبيرة أو لفترات زمنية طويلة.

## الآثار الجانبية:

قد يعاني بعض المرضى إحساس محرق خاصة اذا لم يكن الغشاء المخاطى سليماً.

## الجرعة:

قمع واحد فى الصباح وآخر فى المساء وبعد كل عملية إخراج.

## العبوة:

علبة كرتون تحتوي على 6 أقماع فى شريط ألومينيوم + النشرة الداخلية.

## إنتاج:

شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر.

تاريخ الاصدار: 2001 / 1 / 7، تاريخ المراجعة: --/2013

