

## ستيغلوجان 5 ملغم /100 ملغم أقراص مُعلَّفة ستيغلوجان 15 ملغم /100 ملغم أقراص مُغلَّفة إرتوغليفوزين / سيبتاغليتين

▼يضع هذا الدواء لمزيد من المراقبة.
سيتمك ذلك التعرف السريع على معلومات السلامة الجديدة.
يمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أي أعراض جانبية قد تتعرَّض لها.
انظر نهاية الفقرة رقم 4 لتتعرف على كيفية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

**أقرأ هذه التحذرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.**

- لا تأكل دواءً أو شئاً تتعلَّق لها مَنياً مرةً أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة تتعلَّق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرض.
- إن هذا الدواء قد تَمَّ صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبيَّة. ولماذا يجب عليك عدم إعطائه لأيِّ شخصٍ حتَّى وإن كان هذا الشخص يعني من نفس الأعراض التي تعاني منها لأنه قد يضره.
- إذا عانيت من أي أعراض جانبية تكلم مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرض. هذا يتضمن أي أعراض جانبية غير مدرجة في هذه التحذرة، انظر الفقرة رقم 4.

**حتوي هذه التحذرة على:**

- ما هو ستيغلوجان وما هي دواعي استخدامه
- ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تستخدم ستيغلوجان
- كيفية استخدام ستيغلوجان
- الأعراض الجانبية المحتملة
- ظروف تخزين ستيغلوجان
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

**1. ما هو ستيغلوجان وما هي دواعي استخدامه**

**ما هو ستيغلوجان**

يحتوي ستيغلوجان على مديتين فعَّلتين هما إرتوغليفوزين و سيبتاغليتين:

- إرتوغليفوزين ؛ ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تُسمَّى مثبِّطات النقل المشترك للصوديوم/كلوروك-2 (SGLT2) .
- سيبتاغليتين الذي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تُسمَّى مثبِّطات بيتيبتاز ثنائي الببتيديل - 4 "DPP-4".

**دواعي استخدام ستيغلوجان**

يُعالج ستيغلوجان من مستويات السكر في الدم لدى المرضى البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة ونا فوق) المسالمين بمرض السكري من النوع 2.

يمكن استخدام ستيغلوجان بدلاً من استخدام كلٍّ من إرتوغليفوزين و سيبتاغليتين كإقرص منفصلة.

يمكن استخدام ستيغلوجان بمفرده أو مع بعض الأدوية الأخرى التي تُخفض نسبة السكر في الدم.

يحتاج إلى الاستمرار في الالتزام بحِطة الغذاء والنشارين أثناء تناول ستيغلوجان.

**طريقة عمل ستيغلوجان**

يُعمل إرتوغليفوزين عن طريق تثبيط عمل بروتين SGLT2 في الكليتين، مما يؤدي إلى التخلص من سكر الدم عن طريق البول.

يُعمل سيبتاغليتين على زيادة مستويات الأنسولين الذي يُفرَّج بعد تناول الوجبة. كما أنه يقلل من كمية السكر التي يصنعها جسمك.

**ما هو مرض السكري من النوع 2**

مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مرضية يصبح فيها جسمك غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه الجسم لا يعمل كما يجب. يمكن أن يقوم جسمك أيضاً بإنتاج الكثير من السكر. عندما يحدث هذا، يتراكم السكر (الجلوكوز) في الدم مما قد يؤدي إلى مشاكل طبية خطيرة، مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والمى وضعف البورة السوية.

### 2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تستخدم ستيغلوجان

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه إرتوغليفوزين أو سيبتاغليتين أو تجاه أيِّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6).

**المحاذير والاحتياطات**

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض قبل وأثناء استخدام ستيغلوجان إذا كنت:

• تعاني من مشاكل في الكلى.

• تعاني أو سبق وعانيت من عدوى فطرية في المهبل أو الفصيب.

• سبق وأن عانيت من مرض خطير في القلب أو أصبت بسكتة دماغية.

• تعاني أو سبق وعانيت من مرض في البنكرياس (مثل التهاب البنكرياس).

• تعاني من مرض السكري من النوع 1. يجب عدم استخدام ستيغلوجان لعلاج هذه الحالة.

• تتناول أدوية أخرى لعلاج مرض السكري؛ إذ قد تتداخل أدوية نسبة السكر في الدم لديك عند استخدام ستيغلوجان مع بعض الأدوية الأخرى.

• تعرَّض لحطَر حدوث الجفاف (على سبيل المثال، إذا كنت تتناول أدوية تزيد من إنتاج البول [مدرات البول] أو أدوية لعلاج ضغط الدم المُرتفع أو إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا). اسأل طبيبك عن طرق تجنُّب حدوث الجفاف.

• تعاني أو سبق وعانيت من حمى المراة أو الاعتماد على الكحول أو مستويات عالية جدا من الدهون الثلاثية (شكل من أشكال الدهون) في الدم. يمكن أن تزيد هذه الحالات الطبية من فرصة الإصابة بالتهاب البنكرياس (انظر الفقرة رقم 4).

تعرضت لفقدان الوزن السريع، أو الشعور بالمرض أو حدوث المرض، أو ألم البطن، أو العطش الشديد، أو التنفس السريع والعميق، أو الارتباك، أو النعاس أو التعب غير العادي، أو ظهور رائحة حلوة لثقتك (رائحة الفواكه)؛ أو الإحساس بطعم حلز أو معني في فمك أو تغيرَ رائحة البول أو العرق لديك، راجع طبيبك أو أقرب مستشفَى على الفور. قد تكون هذه الأعراض علامة على حدوث "الحمض الكيتوني السكري" - وهي مشكلة يمكن أن تحدث لمرضى السكري نتيجة زيادة مستويات "الأجسام الكيتونية" في البول أو الدم، والتي تظهر في الفحوصات. قد يزداد خطر الإصابة بالحمض الكيتوني السُكري مع الصيام لفترات طويلة، أو الإفراط في استهلاك الكحول، أو الجفاف، أو مع الحلاجات المكثبات ألعى من الأنسولين، أو مع الحلاجة المكثبات كبرى أو التعرُّض لمرض خطير. سبق أن خضعت لخطر أحد الأطراف السفلية

من المهم فحص قدميك بانتظام والتفتد بآلية تصميحة أخرى يعطيك إيها أحصاني الرعاية المسحية بشأن العناية بالقدم والتطبيب المناسب. يجب عليك إخطار طبيبك على الفور في حال لاحظت أية جروح أو تغير في لون البشرة، أو في حال شعرت بأي إيلام أو ألم في قدميك. تشير بعض الدراسات إلى احتمال أن يكون تناول إرتوغليفوزين قد ساهم في زيادة حالات بتر الأطراف السفلية (خاصةً أصبع القدم).

تم الإبلاغ عن حدوث حالات التهاب البنكرياس لدى بعض المرضى الذين يتلقون العلاج بسيبتاغليتين (انظر الفقرة رقم 4).

تحدث مع طبيبك على الفور في حال ينت عليك مجموعة من أعراض الألم، الإلها، الإحمرار أو توروم في الأعضاء التناسلية أو المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج، مع حمى أو الشعور بالإعواء عموماً. فهذه الأعراض قد تشير إلى وجود عدوى فائرة ولكن خطيرة لا بل معدية للغاية، اسمها التهاب الفلغة النخاع في العجان أو غرغرينا فربيديه، والتي تتميز الالتهجة تحت الجلد. يجب معالجة غرغرينا فربيديه على الفور. يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم) عند استخدام هذا الدواء بالاشتراك مع الأنسولين أو الأدوية التي تُعزِّج إفراز الأنسولين من البنكرياس. قد يقلل الطبيب لك جرعة الأنسولين أو أي دواء آخر تتناوله. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

#### سُكر البول

سيُظهر فحص البول لديك نتيجة إيجابية لوجود السكر. أثناء تناولك لهذا الدواء، وذلك بسبب الطريقة التي يعمل بها ستيغلوجان.

**الأطفال والمراهقون**

يجب على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عدم تناول هذا الدواء. إذ من غير المعروف إذا كان هذا الدواء آمنًا وفعالاً عند استخدامه لدى هذه الفئة العمرية.

**استخدام أدوية أخرى مع ستيغلوجان**

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أيَّ أدوية أخرى.

أخبر طبيبك على وجه الخصوص إذا كنت تتناول:

• أدوية تزيد من إنتاج البول (مدرات البول).

• أدوية أخرى تقلل من كمية السكر في الدم، مثل الأنسولين أو الأدوية التي تُعزِّج إفراز الأنسولين من البنكرياس.

• الديدجوكسين (دواء يستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب ومشاكل القلب الأخرى). قد يلام فحص مستوى الديدجوكسين في دمك إذا كنت تتناوله مع ستيغلوجان.

إذا كنت أيِّ من الحالات المذكورة أعلاه تتلحق عليك (أو إذا كنت لست متأكدًا)، أخبر طبيبك.

**الحمل والرضاعة الطبيعية**

إذا كنت حاملًا أو مُرضعًا ، فتعديين لك قد تكونين حاملًا ، أو تحمطين لإجابه طفل ، فليكن استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

من غير المعروف إذا كان ستيغلوجان يضر بعينيك. إذا يجب تجنُّب استخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

من غير المعروف إذا كان هذا الدواء يُفرِّز في حليب الثدي. استسيري طبيبك حول أفضل طريقة لتغذية طفلك الرضيع إذا كنت تتناولين ستيغلوجان. يجب عليك عدم استخدام هذا الدواء إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تحمطين لإرضاع طفلك.

**القيادة واستخدام الآلات**

هذا الدواء ليس له تأثيرٌ يُذكر على القدرة واستخدام الآلات. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حدوث الدوخة والنعاس مع استخدام سيبتاغليتين ، مما قد يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. تجنَّب القيادة واستخدام أي أدوات أو آلات إذا شعرت بالدوار أثناء تناول ستيغلوجان.

يمكن أن يؤدي تناول هذا الدواء إلى جانب الأنسولين أو الأدوية التي تزيد من إفراز الأنسولين من البنكرياس إلى انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم)، مما قد يتسبب في أعراض مثل الإرتعاش أو الترقق أو تغيرات في الرؤية وقد يؤثر على قدرتك على القيادة واستخدام الآلات.

### 3. كيفية استخدام ستيجلوجان

احرص دائمًا على تناول على هذا الدواء حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي تمامًا. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا غيرت مَنَّاك.

**الجرعة**

• الجرعة الموصى بها من ستيغلوجان هي حبة واحدة مرة واحدة في اليوم.

• تعتمد جرعة ستيغلوجان التي تتناولها على حالتك وكمية إرتوغليفوزين وسيتاغليتين اللازمة للتحكم في نسبة السكر في الدم لديك.

• سيوف لك الطبيب الجرعة المناسبة. لا تغير الجرعة إلا إذا أخبرك الطبيب بذلك.

**طريقة تناول الدواء**

• قم بإفلاج القرص كاملًا ؛ إذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاع القرص، فيمكنك كسره أو سحقه.

• تناول قرص واحد كل صباح. حاول أن تتناوله في نفس الوقت من كل يوم ؛ سيساعدك ذلك على تذكر موعد الجرعة.

• يمكنك أن تتناول الأقراص مع أو بدون طعام.

• تحتاج إلى الاستمرار في اتباع حِطة الطعام والنشارين أثناء تناول ستيغلوجان.

**إذا تناولت من ستيغلوجان أكثر مما يجب**

إذا تناولت من ستيغلوجان أكثر مما يجب، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي على الفور.

**إذا نسيت أن تتناول إحدى جرعات ستيغلوجان**

إذا نسيت أن تتناول إحدى الجرعات، خذها حالما تتذكرها، ولكن ، إذا كان الوقت قد حان لتناول جرعتك التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة و عد إلى جدولك المعتاد.

لا تتناول جرعة مضاعفة (جرعتان في اليوم نفسه) لتعويض عن جرعة منسية.

**إذا توقفت عن تناول ستيغلوجان**

لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة طبيبك. قد تزيد مستويات السكر في الدم إذا توقفت عن تناول الدواء.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرض.

### 4. الأعراض الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع سائر الأدوية ، يمكن أن يُسبب هذا الدواء أعراضًا جانبية وإن كانت لا تحدث لدى جميع من يتناوله.

**راجع الطبيب أو أقرب مستشفى على الفور إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية الخطرة التالية:**

• ألم جاد ومستمر في منطقة البطن (منطقة المعدة) الذي قد يمس إلى ظهورك مع أو بدون العثيان والقيء ، • لأن هذه يمكن أن تكون علامات التهاب البنكرياس.

• تغيرات تنمسي خطير (تكرار حدوثه غير معروف) ، يشمل الطغخ الحليدي ، والشرى ، ويؤثر على الجلد.يتمتَّز الجلد وتورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق الذي قد يُسبب صعوبة في التنفس أو البلع. قد يصف لك الطبيب دواء لعلاج رد الفعل التحسسي وأدوية مختلفة لمرض السكري.

إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية الخطرة المذكورة أعلاه، فتوقف عن تناول هذا الدواء وراجع الطبيب أو أقرب مستشفى فورًا.

**راجع الطبيب أو أذهب إلى أقرب مستشفى على الفور إذا ظهرت لديك أيًا من الأعراض الجانبية الخطرة التالية:**

**الحمض الكيتوني السُكريّ (تألد، قد يؤثر على 1 من بين 1.000 شخص)**

الأعراض التالية تُمثل علامات الحمض الكيتوني السُكري (انظر أيضا فقرة "التحذيرات والاحتياطات"):

- زيادة مستويات "الأجسام الكيتونية" في البول أو الدم
- فقدان الوزن السريع
- الشعور بالمرض أو أن تكون مريض
- ألم البطن
- العطش الشديد
- تنفس سريع وعميق
- الارتباك
- النعاس أو التعب غير المعتاد

• رائحة حلوة لتفسيك (رائحة الفواكه) ، أو طعم حلز أو معني في فمك أو تغيرَ رائحة البول أو العرق لديك.

قد يحدث هذا بعض النطر عن مستوى السكر في الدم. قد يفرُّر طبيبك إيقاف علاجك بسيتيغلوجان بشكل مؤقت أو دائم.

**التهاب اللقافة النخاع في العجان أو غرغرينا فوريديه (غير معروفة، لا يمكن تقدير وتيرتها بالإستناد إلى البيانات المتاحة)**

عدوى خطيرة تصيب الأضمة الرخوة الأعضاء التناسلية أو المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج (مراجعة الفقرة بعنوان "المحاذير والاحتياطات" للتعرف على الأعراض).

إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه، راجع الطبيب أو أقرب مستشفى على الفور.

**راجع الطبيب أو أقرب وقت ممكن إذا تعرَّضت للأعراض الجانبية التالية:**

**الجفاف (فقدان كمية كبيرة من الماء من جسمك؛ شائع، قد يؤثر على 1 من بين 10 أشخاص)**

تشتمل أعراض الجفاف ما يلي:

- جفاف الفم
- الشعور بالدوار ، أو الدوخة ، أو الضعف ، خاصة عند الوقوف
- الإعياء

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف إذا كنت:

• تعاني من مشاكل في الكلى

• تتناول الأدوية التي تزيد من إنتاج البول (مدرات البول) أو تلك الخافضة لضغط الدم

• تتلع 65 سنة من العمر أو أكثر

**انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم ؛ شائع)**

سيخبرك الطبيب عن كيفية علاج انخفاض سكر الدم وماذا تفعل إذا كان لديك أي من الأعراض أو العلامات أدناه. قد يقلل الطبيب من جرعة الأنسولين أو أي دواء آخر مضاد للسكري تُستخدمه.

قد تشمل علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

- الصداع
- النعاس
- الهبجان
- الجوع
- الدوخة
- الارتباك
- التعرق
- الشعور بالتوتر الشديد
- الشعور بالضعف
- تسارع نبضات القلب

إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه، راجع طبيبك في أسرع وقت ممكن.

**وتشتمل الأعراض الجانبية الأخرى:**

**شائعة جدًا**

• عدوى الفطريات المهبلية (الفلاج)

• انخفاض سكر الدم

**شائعة**

- عدوى الفطريات في الفصيب
- التغيرات في التبول ، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى التبول المُتكرر ، وبكميات أكبر ، أو في الليل
- العطش
- الحكة المهبلية
- قد تُظهر فحوصات الدم تغيرات في كمية اليوريا في دمك
- قد تُظهر فحوصات الدم تغيرات في كمية الكوليسترول الكلي والسببي (تسمى LDL - نوع من الدهون في دمك)
- قد تُظهر فحوصات الدم تغيرات في كمية كريات الدم الحمراء في الدم (تسمى الهيموغلوبين)
- الإسهال
- الإنتعاش
- تورم في اليدين أو الساقين
- الغثوزا
- الصداع
- عدوى الجهاز التنفسي العلوي
- احترقان أو سيلان الأنف والتهاب الحلق
- التهاب عظمي مفصلي
- ألم الذراع أو الساق
- غثيان/تقيؤ

**غير شائعة (قد تُؤثر على 1 من بين 100 شخص)**

• قد تُظهر فحوصات الدم تغيرات مُعلَّفة بوظائف الكلى (مثل "كرياتينين")

• ألم أثناء التبول

• ألم المعدة

• إسهال

• النعاس

• جفاف الفم

• الدوخة

• الحكة

نفاذة

• انخفاض عدد الصفائح الدموية

**تكرار حدوثها غير معروف (لا يمكن تقدير وتيرة الحدوث من البيانات المتاحة)**

- مشاكل في الكلى (تتطلب في بعض الأحيان عسيل الكلى)
- ألم المفاصل
- ألم عضلي
- ألم في الظهر
- مرض الرئة الحادلي
- شبيه اللقاع المُفَاعي (وهو نوع من البثور الجلدية)

**الإبلاغ عن الأعراض الجانبية**

إذا أصبت بأي أعراض جانبية ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرض. يتضمن ذلك أيَّ أعراض جانبية محتملة غير مدرجة في هذه التحذرة . يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

### 5. ظروف تخزين ستيجلوجان

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن مرأى ومتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على شريط الألومنيوم والكرتون بعد كلمة "EXP".

تاريخ انتهاء الصلاحية يُشارُ له كأخر يوم في ذلك الشهر.

لا يُحفظ في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية. يُحفظ في العبوة الأصلية.

لا تستخدم هذا الدواء إذا كانت العبوة تالفة أو تظهر عليها علامات العيب.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. سوف تساعد هذه التوجيه في حماية البيئة.

### 6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات ستيغلوجان

المواد الفعالة هي إرتوغليفوزين و سيبتاغليتين

- يحتوي كلُّ قرص من أقراص ستيغلوجان مُغلَّف تركزه 5 ملغم /100 ملغم على 5 ملغم من إرتوغليفوزين (على شكل إرتوغليفوزين لـ[يبروجولوتاميد أسيد]) و 100 ملغم سيبتاغليتين (على شكل سيبتاغليتين فوسفات مونوهيدرات).

- يحتوي كلُّ قرص من أقراص ستيغلوجان مُغلَّف تركزه 15 ملغم /100 ملغم على 15 ملغم من إرتوغليفوزين (على شكل إرتوغليفوزين لـ[يبروجولوتاميد أسيد]) و 100 ملغم سيبتاغليتين (على شكل سيبتاغليتين فوسفات مونوهيدرات).

المكونات الأخرى هي:

- أُلبُت الفرصن: السيلولوز ثقيق التبلور ، فوسفات هيدروجين الكالسيوم (لا مائي)، صوديوم كروس كارميلوز ، فومارات ستيريل الصوديوم، سترات المغنسيوم.
- طبقة الغشاء الرقيق: هيدروميلوز ، هيدروكسي بروبيل السيلولوز ، ثنائي أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأحمر ، أكسيد الحديد الأصفر، أكسيد الحديد الأسود، شمع كارنوبا.

**ما الشكل الصيدلاني لستيغلوجان وصفه وحجم عبوته**

أقراص ستيغلوجان 5 ملغم /100 ملغم المغلفة هي أقراص لونها بيج، لوزية الشكل، منقوش على أحد جانبيها فقط الرقم "554" .

أقراص ستيغلوجان 15 ملغم /100 ملغم المغلفة هي أقراص لونها بُني، لوزية الشكل، منقوش على أحد جانبيها فقط الرقم "555" .

يؤوفر ستيغلوجان في شرائط من الألومنيوم مصنوعة من Alu / PVC / PA / Alu ؛ تتضمن أحجام العبوات 14 (2x7) و 28 و 30 و 84 و 90 و 98 قرص مُغلَّف بغشاء رقيق على شكل شرائط من الألومنيوم غير مثقبة وعبوات تحتوي على 30 × 1 أو 30 (3x10) قرص مُغلَّف بغشاء رقيق على شكل شريط من الألومنيوم المثقبة.

**قد لا يتم تسويق جميع التراكمز وأحجام العبوات.**

• شيرينج-جلاو لايو إن في

• اندستريارك 30

• هيلست-أر-ب-جن-جيرغ

• بي-2220

• بلجوكا

**الشركة المالكة لحقوق التسويق:**

• ميرك شارب أند دوم بي. في.

• وارديرويج 39.

• 2031 بي إن فارليم

• هولندا

**لقد تمت مراجعة هذه التحذرة في مايو/أيار 2019**

(إن هذا الدواء)

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الموصىمن عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك

إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره

- لا تتلع مدة العلاج الممددة لك من تلقاء نفسك

- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب

- لا تترك الأدوية في متناول ايدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

و اتحاد الصيدلة العرب