

سيغلوروميت 2.5 ملغم /1000 ملغم

أقراص مُغلّفة

سيغلوروميت 7.5 ملغم /1000 ملغم

أقراص مُغلّفة

إرتوغليفلوزين/ ميتفورمين هيدروكلوريد

▼**يجب** هذا الدواء لمزيد من المراقبة. سيتيج تلك التعرف السريع على معلومات السلامة الجديدة. يمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أي أعراض جانبية قد تتعرض لها.

أنظر: نهاية الفترة وربع 4. لتتوقف على كيفية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

اقرأ هذه النشرة كمنهية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأنه قد تحتاج لראنها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المنتج، فقم باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرض.
- إذا كان هذا الدواء قد تم صرفه حصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، فهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي تعاني منها لأنه قد يضره.
- إذا عانيت من أي أعراض جانبية تكلم مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرض. هذا يتضمن أي أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، انظر الفقرة رقم 4.

تحتوي هذه النشرة على:

- ما هو سيغلوروميت وما دواعي استخدامه
- ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تستخدم سيغلوروميت
- كيفية تناول سيغلوروميت
- الأعراض الجانبية المحتملة
- طُرق تخزين سيغلوروميت
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو سيغلوروميت وما دواعي استخدامه

ما هو سيغلوروميت

يحتوي سيغلوروميت على مادتين فعالتين هما إرتوغليفلوزين وميتفورمين:

- إرتوغليفلوزين ؛ ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تُسمى مثبطات الناقل المشترك للصوديوم/جلوكوز 2- (SGLT2) .
 - ميتفورمين الذي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تُدعى بيجوانيد.

دواعي استخدام سيغلوروميت

- يُعالج سيغلوروميت من مستويات السكر في الدم لدى المرضى البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق) المصابين بمرض السكري من النوع 2.
- يمكن استخدام سيغلوروميت بدلاً من استخدام كل من إرتوغليفلوزين وميتفورمين كأقرص منفصلة.
- يمكن استخدام سيغلوروميت بعبءه أو مع بعض الأدوية الأخرى التي تُخفض نسبة السكر في الدم.
- تحتاج إلى متابعة الالتزام في خطة الغذاء والتمارين أثناء تناول سيغلوروميت.

طريقة عمل سيغلوروميت

يعمل إرتوغليفلوزين عن طريق تثبيط عمل بروتين SGLT2 في الكلى، مما يؤدي إلى التخلص من سكر الدم عن طريق البول.

يعمل ميتفورمين عن طريق تثبيط إنتاج السكر (الجلوكوز) في الكبد.

ما هو مرض السكري من النوع 2

مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مرضية يصعب فيها جسمك غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو إن الأنسولين الذي ينتجه الجسم لا يعمل كما يجب. يمكن أن يقوم جسمك أيضًا بإنتاج الكثير من السكر. عندما يحدث هذا، يتراكم السكر (الجلوكوز) في الدم مما قد يؤدي إلى مشاكل طبية خطيرة، مثل أمراض القلب وأمراض الكلى ومرض ضعف البؤرة البصرية.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تستخدم سيغلوروميت

لا تستخدم سيغلوروميت

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه إرتوغليفلوزين أو ميتفورمين أو تجاه أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6).
- إذا كنت تعاني من انخفاض شديد في وظائف الكلى أو كنت بحاجة لمصلب الكلى.
- إذا كان لديك مرض السكري غير مضبوط مع، على سبيل المثال، ارتفاع سكر الدم الشديد (جلوكوز الدم المرتفع)، أو الغثاس، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن السريع، أو الحمض البطني (اللاكتيكبي) (انظر "خطر الحمض البطني (اللاكتيكبي)" "أثناء أو فحماض الكيتوني. الحمض الكيتوني هو حالة تتراكم فيها المواد المسماة "الأجسام الكيتونية" في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ما قبل غيبوبة السكري. تشمل الأعراض الألم في المعدة، والتشنج السريع، والقيء، والغثاس، أو ظهور رائحة فمليك غير عادية تشبه رائحة الفواكه.

- إذا كنت تعاني من عدوى شديدة أو من الجفاف.
- إذا كنت قد تعرضت لموهر الأدوية قليلة أو لتيك مشاكل شديدة في الدورة البولية، مثل "سحمة" أو صعوبات في التفتس.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

إذا كنت تطرب القبول بكرة إدواء بشكل منتظم أو من وقت لآخر)

لا تتناول سيغلوروميت إذا كان أي مما ورد أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، استشر طبيبك قبل أن تتناول سيغلوروميت.

التحذيرات والاحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض قبل وثناء استخدام سيغلوروميت إذا كنت:

- تعاني من مشاكل في الكلى.
- تعاني أو سبق وعانيت من عدوى فطرية في المهبل أو الفصبي.
- سبق وأن عانيت من مرض خطير في القلب أو أصيبت بسكتة دماغية.
- تعاني من مرض السكري من النوع 1. يجب عدم استخدام سيغلوروميت لعلاج هذه الحالة.
- تتناول أدوية أخرى لعلاج مرض السكري؛ قد تكون أكثر عرضة للإصابة بانخفاض السكر في الدم عند استخدام سيغلوروميت مع بعض الأدوية الأخرى.
- تعرض لخطر حدوث الجفاف (على سبيل المثال، إذا كنت تتناول أدوية تزيد من إنتاج البول إسهال البول) أو أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع أو إذا كان عرك يزيد 65 عامًا). اسأل طبيبك عن طرق تجنب حدوث الجفاف.
- تعرضت لفقدان الوزن السريع، أو الشعور بالمرض أو حدوث المرض، أو ألم البطن، أو العطش الشديد، أو التشنج السريع، والقيء، أو الإرتباك، أو الغثاس أو القيء غير العادي، أو ظهور رائحة طازة لتسك (رائحة الفاكهة)؛ أو الإحساس بطعم حلو أو معني في فمك أو تغير في رائحة البول أو الحرق لتيك، راجع طبيبك أو أقرب مستشفى على الفور.
- قد تكون هذه الأعراض علامة على حدوث "الحمض الكيتوني السكري". وهي مشكلة يمكن أن تحدث لمرضى السكري نتيجة زيادة مستويات "الأجسام الكيتونية" في البول في الدم، والتي تظهر في العموصات. قد يزداد خطر الإصابة بالحمض الكيتوني السكري مع الصيام لفترات طويلة، أو الإفراط في استهلاك الكحول، أو الجفاف، أو انخفاض الصافي في جرعة الأنسولين، أو مع حاجة لكميات أعلى من الأنسولين بسبب المرض أو لمرضة خطيرة.
- سبق أن خضعت لجرأ أحد الأطراف البولية.

من المهم فحص كبدك بانتظام والتوقف بآية نصيحة أخرى يعطيك إياها إخصائي الرعاية الصحية بشأن الأدوية الباقم والتزيط المناسب. يجب عليك إخطار طبيبك على الفور في حال لاحظت أي جروح أو تغير في لون البشرة، أو في حال شعرت بأي إيلام أو ألم في فمك، تشير بعض الدراسات إلى احتمال أن يكون تناول إرتوغليفلوزين قد سامع في زيادة حالات بتر الأطراف البولية (خداسة أصبع القدم).

تحدث مع طبيبك على الفور في حال بنت عليك مجموعة من أعراض الإلتهام، الإحمرار أو التورم في الأعضاء التناسلية أو المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج، مع حمى أو الشعور بالإلحاح عموماً. هذه الأعراض قد تشير إلى وجود عدوى نادرة ولكن خطيرة لا بل مهددة للحياة، اسمها التهاب المثانة الفخار في العجان أو غرغرينا فورنيز، والتي تسمى الآن تحت الجلد. يجب معالجة غرغرينا فورنيز على الفور.

يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم) عند استخدام هذا الدواء بالاشتراك مع الأنسولين أو الأدوية التي تُخفّر إفراز الأنسولين من البنكرياس. قد يقلل الطبيب لك جرعة الأنسولين أو أي دواء آخر تتناوله.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

خطر الحمض البطني (اللاكتيكبي)

قد يتسبب استخدام سيغلوروميت في حدوث عرض جانبي نادر جدًا ولكنه خطير جدًا يُسمى الحمض البطني (اللاكتيكبي) ، خاصةً إذا كانت الكلىتان لا تعملان بشكل جيد. يزداد خطر الإصابة بالحمض البطني (اللاكتيكبي) أيضًا مع الإصابة بمرض السكري غير المضبوط أو العدوى الخطيرة ، أو أمراض التمثيل الغذائي أو تناول الكحول، أو الجفاف (انظر مزيدًا من المعلومات أدناه) ، ومشاكل الكبد وأي حالات طبية يتعرض فيها جزء من الجسم إلى نفس في إمدادات الكصبين (مثل مرض القلب الحاد الشديد) . إذا كان أي من الحالات المذكورة أعلاه ينطبق عليك ، استشر طبيبك لتحصل على المزيد من التعليمات.

توقف عن تناول سيغلوروميت لفترة قصيرة إذا كان لديك حالة مرتبطة بحدوث الجفاف (تغير في سائل الجسم) مثل القيء الشديد أو الإسهال أو الحمى أو التعرض للحرارة أو إذا قلت كمية السوائل التي تشربها عن الطبيعي. تحدث إلى طبيبك لتحصل على المزيد من التعليمات.

توقف عن تناول سيغلوروميت وراجع الطبيب أو ادب إلى أقرب مستشفى على الفور إذا واجهت بعض أعراض الحمض البطني (اللاكتيكبي) ، لأن هذا قد يؤدي إلى غيبوبة.

تشمل أعراض الحمض البطني (اللاكتيكبي) :

- التقيؤ
- الألم المدة (ألم في البطن)
- تشنجات العضلات
- شعور عام بالإعياء أو بالإرهاق الشديد
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم وتباطؤ ضربات القلب
- الحمض البطني (اللاكتيكبي) هو حالة طبية طارئة ويجب علاجها في المستشفى.
- إذا كنت بحاجة في إراء على رعاية جراحية كبرى ، يجب عليك التوقف عن تناول سيغلوروميت أثناء وبعد العملية. سيقرر طبيبك متى يجب عليك التوقف عن استخدام سيغلوروميت ومتى عليك العودة إلى استخدامه.
- سيحتاج طبيبك من وظيفة الكلى لديك مرة واحدة في السنة على الأقل أو أكثر إذا كنت مُشَيِّداً وإل إذا كنت تعاني من تدهور وظائف الكلى أثناء العلاج بسيغلوروميت.

سكر البول

سيظهر فحص البول لديك نتيجة إيجابية لوجود السكر أثناء تناوك لهذا الدواء ، وذلك بسبب الطريقة التي يعمل بها سيغلوروميت.

الأطفال والمراهقون

يجب على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عدم تناول هذا الدواء. إذا من غير المعروف إذا كان هذا الدواء أمناً وفعلاً عند استخدامه لدى هذه الفئة العمرية.

استخدام أدوية أخرى مع سيغلوروميت

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

قد تحتاج إلى إجراء المزيد من فحوصات جلوكوز الدم ووظائف الكلى بشكل متكرر ، أو قد يحتاج طبيبك إلى ضبط جرعة سيغلوروميت. على وجه الخصوص ، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيًا مما يلي :

- أدوية تزيد من إنتاج البول (مثل مدرّات البول).
- أدوية أخرى تقلل من كمية السكر في الدم ، مثل الأنسولين أو الأدوية التي تُخفّر إفراز الأنسولين من البنكرياس.
- أدوية تُستخدم لعلاج الألم والتهاب (NSAID) ومثبطات COX-2، مثل إيبوبروفين وسيليكسبب.
- أدوية تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات الأنزيم المحرل للأنجيوتنسين ومعدنات مثبّط الأنجيوتنسين II).
- إذا كان أي من الحالات المذكورة أعلاه ينطبق عليك (أو لست متأكدًا)، أخبر طبيبك.
- إذا كنت بحاجة في تلقى عناية طبية فبأن تتحتوي على الود في مجرى الدم، على سبيل المثال، في سيق الأشعة السينية أو التصوير الشعاعي، يجب عليك التوقف عن تناول سيغلوروميت قبل أو في وقت الحقن. سيقرر طبيبك متى يجب عليك التوقف وعودة إلى استخدام سيغلوروميت.

سيغلوروميت مع الكحول

تجنب الإفراط في تناول الكحول أثناء تناول سيغلوروميت لأن هذا قد يزيد من خطر حدوث الحمض البطني (اللاكتيكبي) (انظر بند "التحذيرات والاحتياطات").

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو ترضعاً ، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً ، أو تخططين لإجابت طفل ، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

من غير المعروف إذا كان سيغلوروميت يضر جنينك. إذا كنت حاملاً، تحدثي مع طبيبك حول أفضل طريقة للتحكم في نسبة السكر في الدم أثناء الحمل. يجب عليك عدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

من غير المعروف إذا كان هذا الدواء يُؤزف في حليب الثدي. استشيري طبيبك حول أفضل طريقة لتغذية طفلك الرضيع إذا كنت تتناولين سيغلوروميت. يجب عليك عدم استخدام هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

القيادة واستخدام الآلات

هذا الدواء ليس له تأثير يذكر على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

يمكن أن يؤدي تناول هذا الدواء إلى جانب الأنسولين أو الأدوية التي تزيد من إفراز الأنسولين من البنكرياس إلى انخفاض شديد في مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم) ، مما قد يتسبب في أعراض مثل الارتعاش أو الحرق أو تغيرات في الرؤية وقد يؤثر على فركك. القيادة واستخدام الآلات. تجنب القيادة واستخدام أي آلات إذا شعرت بالتأثر أثناء تناول سيغلوروميت.

يحتوي هذا الدواء على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغم) لكل قرص ، وهذا يعني بشكل أساسي "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية تناول سيغلوروميت

احرص دائماً على تناول هذا الدواء حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي تماماً. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

الجرعة

الجرعة الموصى بها من سيغلورميت هي عدد حبة واحدة مرتين في اليوم.
تعتمد جرعة سيغلوروميت التي تتناولها على حالتك وكمية إرتوغليفلوزين وميتفورمين اللازمة للتحكم في نسبة السكر في الدم لديك.
ميسمف لك الطبيب الجرعة المناسبة. لا تغير الجرعة إلا إذا أخبرك الطبيب بذلك.

طريقة تناول الدواء

- قم بتأجيل الفرس كاملاً ؛ إذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاع القرص ، فيمكنك كسره أو سحقه.
- تناول عدد قرص واحد مرتين يومياً. حاول أن تتناول الدواء في نفس الوقت من كل يوم ؛ سيساعدك ذلك على تذكر موعد الجرعة.
- يُسمح بتناول الدواء مع الطعام لأن ذلك يقلل من احتمال تعرضك لاضطراب المعدة.
- تحتاج إلى الاستمرار في اتباع خطة الغذاء والتمارين أثناء تناول سيغلوروميت.

إذا تناولت من سيغلوروميت أكثر مما يجب

إذا تناولت من سيغلوروميت أكثر مما يجب، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي على الفور.

إذا نسيت أن تتناول إحدى جرعات سيغلوروميت

إذا نسيت أن تتناول إحدى الجرعات، خذها حالما تتذكرها. ولكن، إذا كان الوقت قد حان لجرعة التالية، فتجاوز الجرعة الفائتة وعد إلى جدولك المعتاد.

لا تتناول جرعة مضاعفة (جرعات) في نفس الوقت) لتعويض عن جرعة مفدية.

إذا توقفت عن تناول سيغلوروميت

لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة طبيبك. قد تزيد مستويات السكر في الدم إذا توقفت عن تناول الدواء.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرض.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع سائر الأدوية، يمكن أن يُسبب هذا الدواء أعراضاً جانبية وإن كنت لا تحدث لدى جميع من يتناولوه.

راجع الطبيب أو أقرب مستشفى على الفور إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية الخطرة التالية:

الحمض البطني (اللاكتيكبي) (إنار جداً، قد يؤثر على شخص واحد من بين 10٠000 شخص)

قد يتسبب استخدام سيغلوروميت في حدوث عرض جانبي نادر جدًا ولكنه خطير جدًا يُسمى الحمض البطني (اللاكتيكبي) (انظر فقرة التحذيرات والاحتياطات). إذا حدث ذلك، يجب عليك التوقف عن استخدام سيغلوروميت ومراجعة الطبيب أو الذهاب إلى أقرب مستشفى على الفور. لأن الحمض البطني (اللاكتيكبي) قد يؤدي إلى غيبوبة.

الحمض الكيتوني السكري (نادر، قد يؤثر على 1 من بين ١٠000 شخص)

الأعراض التالية تشل علامات الحمض الكيتوني السكري (انظر أيضًا فقرة "التحذيرات والاحتياطات"):

- فقدان الوزن السريع
- الشعور بالمرض أو أن تكون مريض
- ألم البطن
- العطش الشديد
- تنفس سريع وعيق
- الارتباك
- الغثاس أو القيء غير المعتاد.

- رائحة حلوة لتسك (رائحة الفواكه)، أو طعم حلو أو معني في فمك أو تغير في رائحة البول أو الحرق لتيك.

قد يحدث هذا بعض الفطر عن مستوى السكر في الدم. قد يفرز طبيبك إيفاق علاجك بسيغلوروميت بشكل مؤقت أو دائم.

التهاب المثانة الفخار في العجان أو غرغرينا فورنيزيه (غير معروفة، لا يمكن تقدير وتوقيتها بالامتداد، في الحالات المتأخرة)

عدوى خطيرة تصيب (الأسعة) لرجوة للأعضاء التناسلية أو المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج (مرجمة لفترة بعنوان "الحاثير والاحتياطات" للتعرف على الأعراض).

إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه ، راجع الطبيب أو أقرب مستشفى على الفور.

تصل بالطبيب في أقرب وقت ممكن إذا تعرضت للأعراض الجانبية التالية:

الجفاف (فقدان كمية كبيرة من الماء من جسمك، شائع، قد يؤثر على 1 من بين 10 أشخاص)

تشمل أعراض الجفاف ما يلي:

- جفاف الفم
- الشعور بالمرض أو في الحرارة، أو الضعف، خاصة عند التوقف
- الإعياء

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف إذا كنت:

- تعاني من مشاكل في الكلى
- تتناول الأدوية التي تزيد من إنتاج البول (مثل مدرّات البول)
- تبلغ 65 سنة من العمر أو أكثر

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم؛ شائع)

سيظهر انخفاض في نسبة السكر في الدم عندما تقلل أو إذا كان لديك أي من الأعراض أو العلامات أدناه. قد يقلل الطبيب من جرعة الأنسولين أو أي دواء آخر تخد مضاد للسكري تستخدمه.

قد تشمل علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

- الصداع
- الغثاس
- الهيجان
- الجوع
- الدوخة
- الارتباك
- التعرق
- الشعور بالارتباك الشديد
- الشعور بالضعف
- تسارع نبضات القلب

إذا لاحظت أيًا من الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه، راجع طبيبك في أسرع وقت ممكن.

وتشمل الأعراض الجانبية الأخرى:

شائعة جدًا

- عدوى الفطريات المهبيلة (فلاع)
- الشعور بالمرض (فخاثر)

- التقيؤ
- إسهال
- ألم المعدة
- فقدان الشهية

شائعة

- عدوى الفطريات في الفصبي
- التغيرات في البول، تتضمن الحاجة للتخلى إلى القبول للتذكّر، بكميات أكبر، أو في الليل
- الغثاس
- الحكة المهبيلة
- تغيرات في حسية التئوق
- قد تُظهر عموصات الدم تغيرات في كمية الفوريا في دمك
- قد تُظهر عموصات الدم تغيرات في كمية الكوليسترول الكلي والسي (تسمى LDL - نوع من الدهون في دمك)
- قد تُظهر عموصات الدم تغيرات في كمية كريات الدم الحمراء في الدم (تسمى الهيموغلوبين)

غير شائعة (قد تؤثر على شخص واحد من بين كل 100 شخص)

قد تظهر عموصات الدم تغيرات متعلقة بوظائف الكلى (مثل "كرياتينين")

ألم أثناء تناول

نادرة جدًا

- انخفاض مستويات فيتامين ب 12: هذا قد يسبب فقر الدم (انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء).
- اضطرابات وظيفت الكبد
- تهاب الكبد (مشكلة في الكبد)

- شرى
- احمرار في الجلد
- الحكة

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

إذا نسيت بأي أعراض جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرض. يتضمن ذلك أي أعراض جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

5. كيفية تخزين سيغلوروميت
احتفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى وتناول الأطفال.
لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على شريط الألوينيوم والفكون بعد كلمة "EXP".
تاريخ انتهاء الصلاحية يشار له كأمر يوم في تلك الشهر.
لا يُنظف في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية. يُنظف في العبوة الأصلية .
لا تستخدم هذا الدواء إذا كانت العبوة تالفة أو تظهر عليها علامات الحث.
لا تخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو الفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. سوف تساعد هذه التابير في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى
محتويات سيغلوروميت
• المواد الفعالة هي إرتوغليفلوزين وميتفورمين
• يحتوي كل قرص مُغلف تركيز 2.5 ملغم/1000 ملغم عن 2.5 ملغم من إرتوغليفلوزين (شكل شكل إرتوغليفلوزين لإ-جيروجلوتليك أسيد) و 1000 ملغم من الميتفورمين هيدروكلوركس.
• يحتوي كل قرص مُغلف تركيز 7.5 ملغم/ 1000 ملغم عن 7.5 ملغم من إرتوغليفلوزين (شكل شكل إرتوغليفلوزين لإ-جيروجلوتليك أسيد) و 1000 ملغم من الميتفورمين هيدروكلوركس.
• المكونات الأخرى هي: - لبت الفروس: فيوفون(29-32)، السيليلوز دقيق التفلور، كروس بوفيدون، فوريل سلفات الصوديوم، ستيرات المغنيسيوم. - طبقة الغشاء: - هيدروميلوز، هيدروكسي بروبيل سليلوز، تالكي كسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأحمر، شمع كرومبا.

ما الشكل الصيدلاني لسيغلوروميت ووصفه وحجم عبوته

- أقرص سيغلوروميت 2.5 ملغم/ 1000 ملغم هي أقرص مغلفة لونها وردي، منشوش على أحد جانبيها فقط الفم "2.5/1000".
- أقرص سيغلوروميت 7.5 ملغم/ 1000 ملغم هي أقرص مغلفة لونها وردي، منشوش على أحد جانبيها فقط الفم "7.5/1000".

يوفر سيغلوروميت في شرائط من الألومنيوم مصنوعة من Alu / PA / PVC / Alu. تتضمن أحجام العبوات 14 : 28 (4x7) 60 : 66 (10x6) ، 168 ، و 180 قرصاً مغلفاً بمشاء رفيع على شكل شرائط من الألومنيوم غير مثقبة، وغلب تحتوي على عوات عديدة تضم 196 قرص (4 عوات تحتوي كل منها على 49 قرص) مُغلف بمشاء رفيع على شكل شرائط من الألومنيوم غير المثقبة.عبوات تحتوي على 30 × 1 قرص على شكل شريط من الألومنيوم المثقبة الموحدة الجرعة.

قد لا يتم تسويق جميع التركيبات وأحجام العبوات.

الشركة الصانعة:

إم إس دي إنترناتشونال جي إم بي لتلي (فرع بورنو ريكو) د.م.

برينكو إنسترويل بارك ، ستيت رود 183،

لان وينداسون، إم.إف. 00771

الولايات المتحدة الأمريكية

الشركة المصدرة للتشغيلية والمكلفة لحقوق التسويق:

ميك ثاروب ألد بوم بي.في.

وارينجروج 39،

2031 دي إن هارليم

هولندا

لقد تمت مراجعة هذه النشرة في تموز 2020

إن هذا الدواء - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك الحظوظ - تتبع بقاءه وصية الطبيب وطريقة استعماله المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك - في الطبيب الصيدلاني هذا الفيزيان بالذواء وبقلمه وخبره - لا تطعم هذه العلاج المصنعة لك من قِدام نفسك - لا تكون صرف الذواء بدون استشارة الطبيب - لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب و اتحاد الصيدلة العرب