

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU CONSOMMATEUR

^{Pr}APO-CARBAMAZEPINE
Carbamazépine en comprimés USP
200 mg

^{Pr}APO-CARBAMAZEPINE CR
Carbamazépine à libération contrôlée
Norme Apotex
200 mg et 400 mg

La présente notice constitue la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée à la suite de l'approbation d'APO-CARBAMAZEPINE pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. La présente notice n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'APO-CARBAMAZEPINE. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Raisons d'utiliser ce médicament :

APO-CARBAMAZEPINE vous a été prescrit par votre médecin :

- pour réduire le nombre de vos crises épileptiques;
- pour soulager la douleur provoquée par la névralgie du trijumeau;
- pour traiter votre manie aiguë ou votre trouble bipolaire.

Effets de ce médicament :

APO-CARBAMAZEPINE est un médicament qui appartient à la classe des anticonvulsivants et qui sert à traiter l'épilepsie. APO-CARBAMAZEPINE est également utilisé dans le traitement de la douleur associée à la névralgie du trijumeau, ainsi que dans le traitement de la manie.

Si vous avez des questions sur le mode d'action d'APO-CARBAMAZEPINE ou si vous ne savez pas pourquoi on vous l'a prescrit, veuillez consulter votre médecin.

Circonstances où il est déconseillé de prendre ce médicament :

Vous ne devez pas prendre APO-CARBAMAZEPINE si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à la carbamazépine ou à l'un des ingrédients d'APO-CARBAMAZEPINE (voir « **Ingrédients non médicinaux** »). Si vous pensez être allergique, demandez conseil à votre médecin. Ne prenez pas APO-CARBAMAZEPINE si vous êtes allergique à d'autres composés tricycliques comme l'amitriptyline, la trimipramine ou l'imipramine;
- vous souffrez d'une maladie cardiaque grave (bloc cardiaque);
- vous souffrez d'une maladie du foie;
- vous avez des antécédents de dépression de la moelle osseuse;
- vous avez des antécédents de maladie sanguine grave;
- vous présentez un trouble de la production de la porphyrine, un pigment qui joue un rôle important dans la fonction hépatique et dans la formation du sang (trouble également appelé porphyrie hépatique);
- vous prenez également des médicaments appartenant à un groupe particulier d'antidépresseurs appelés inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO);
- vous prenez aussi de l'itraconazole ou du voriconazole (Vfend) pour traiter une infection.

APO-CARBAMAZEPINE ne doit pas être utilisé pour soulager les douleurs légères au visage ni les maux de tête.

Si l'une des situations décrites ci-dessus s'applique à vous, **informez-en votre médecin avant de prendre APO-CARBAMAZEPINE.**

Ingrédient médicinaux :

La carbamazépine.

Ingrédients non médicinaux :

Comprimés APO-CARBAMAZEPINE à 200 mg : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, silice colloïdale et stéarate de magnésium.

Comprimés APO-CARBAMAZEPINE CR à 200 mg et à 400 mg : crospovidone, dioxyde de titane, éthylcellulose, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, méthylcellulose, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge, polyéthylène glycol et stéarate de magnésium.

Formes pharmaceutiques offertes :

APO-CARBAMAZEPINE est offert en :

comprimés ronds contenant 200 mg de carbamazépine.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

comprimés CR en forme de gélules (comprimés à libération contrôlée, pouvant être fractionnés) contenant 200 mg ou 400 mg de carbamazépine.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

Sang : Des effets indésirables graves touchant le nombre de cellules sanguines, quoique peu fréquents et rarement mortels, ont été signalés au cours de l'administration de carbamazépine. On a également observé d'autres effets secondaires, notamment : faible nombre de globules blancs, dépression de la moelle osseuse, hépatite et signes d'insuffisance hépatique tels que la jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux). Informez votre médecin sans tarder si vous présentez l'un ou l'autre de ces symptômes. Votre médecin doit exercer une surveillance étroite, assortie de fréquents examens de laboratoire, pendant toute la durée du traitement par APO-CARBAMAZEPINE afin de dépister aussitôt que possible tout signe d'anomalies du sang. Votre médecin doit mettre fin à votre traitement APO-CARBAMAZEPINE avec à la moindre manifestation de dépression de la moelle osseuse.

Peau : Des réactions graves et parfois mortelles appelées « érythrodermie bulleuse avec épidermolyse » et « syndrome de Stevens-Johnson » ont été signalées en association avec l'emploi de la carbamazépine. D'autres réactions cutanées, telles que les éruptions d'origine médicamenteuse s'accompagnant d'une éosinophilie et de symptômes généraux, la pustulose exanthématique aiguë généralisée et l'éruption cutanée maculopapulaire, ont également été signalées. Bien qu'elles soient très rares, les formes graves d'éruptions d'origine médicamenteuse s'accompagnant d'une éosinophilie et de symptômes généraux et de pustulose exanthématique aiguë généralisée peuvent également entraîner la mort. Dans certains cas, ces réactions cutanées sont attribuables à des facteurs génétiques. Votre médecin pourrait vous recommander de subir une analyse sanguine pour établir si vous faites partie de la population à risque.

Avisez immédiatement votre médecin si vous présentez l'une ou plusieurs des manifestations suivantes :

- une réaction cutanée grave, telle qu'une éruption cutanée, une rougeur de la peau, des vésicules sur les lèvres, les yeux, dans la

bouche, ou une desquamation de la peau (peau qui pèle) s'accompagnant de fièvre

- une enflure des ganglions lymphatiques
- des douleurs articulaires
- une hypertrophie du foie et/ou de la rate
- des problèmes aux poumons, aux reins, au pancréas, au cœur, à la moelle osseuse, au thymus ou au côlon.

Votre médecin pourra déterminer si cette réaction est liée à la prise d'APO-CARBAMAZEPINE et si c'est le cas, il mettra fin au traitement.

Cancer : Des études de toxicité à long terme chez les rats ont révélé un risque de cancer associé à l'administration de la carbamazépine. Avant de prendre APO-CARBAMAZEPINE, discutez avec votre médecin des bienfaits et des risques possibles du traitement.

AVANT de prendre APO-CARBAMAZEPINE, il y a des points importants que vous devez signaler à votre médecin ou à votre pharmacien :

- Votre état de santé, surtout si vous êtes atteint ou avez déjà été atteint d'une maladie du foie, des reins, du cœur, de la glande thyroïde ou du sang (y compris les maladies causées par d'autres médicaments).
- Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de troubles osseux ou si vous prenez des antiépileptiques (tels que le phénobarbital, la phénytoïne, la primidone, l'oxcarbazépine, la lamotrigine, le valproate de sodium ou la carbamazépine) durant une période prolongée.
- Si vous prenez de la delavirdine, un médicament employé pour le traitement de l'infection par le VIH-1.
- Les allergies dont vous souffrez, particulièrement si vous avez déjà présenté une sensibilité inhabituelle (éruption cutanée ou autre signe d'allergie) à l'oxcarbazépine ou à tout autre médicament que vous devez prendre en raison de votre état de santé. Il est important de noter que si vous êtes allergique à APO-CARBAMAZEPINE (carbamazépine), la probabilité que vous présentiez une réaction allergique à l'oxcarbazépine (TRILEPTAL*) est d'environ 1 sur 4 (25 %).
- Si vous êtes enceinte. Votre médecin pourrait vous recommander de prendre de l'acide folique avant et pendant votre grossesse ainsi que de la vitamine K au cours des dernières semaines de grossesse. Le médecin pourrait recommander que

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

le nouveau-né reçoive aussi de la vitamine K et qu'on l'observe afin de déceler tout problème au foie ou à la vésicule biliaire.

- Si vous prévoyez de tomber enceinte, pesez avec votre médecin les avantages éventuels du traitement par APO-CARBAMAZEPINE par rapport aux risques qu'il présente.
- Si vous êtes une femme prenant un contraceptif hormonal (pilule anticonceptionnelle), APO-CARBAMAZEPINE pourrait rendre ce contraceptif inefficace. Par conséquent, vous devez employer un autre moyen de contraception non hormonal en plus ou en remplacement de votre contraceptif hormonal durant votre traitement par APO-CARBAMAZEPINE. Cette mesure devrait contribuer à prévenir toute grossesse non désirée.
- Si vous présentez des saignements vaginaux irréguliers ou des pertes de sang légères (microrrhagie).
- Si vous allaitez; on sait qu'APO-CARBAMAZEPINE passe dans le lait maternel. Vous devez peser les bienfaits de l'allaitement par rapport aux risques qu'il pourrait entraîner pour le nourrisson avec votre médecin. Si vous décidez d'allaiter, on devra observer l'état de votre bébé afin de déceler tout problème au foie ou de la vésicule biliaire, de même que l'apparition de somnolence et de réactions allergiques cutanées.
- Les autres médicaments (avec ou sans ordonnance) que vous prenez.
- La quantité d'alcool que vous consommez habituellement.
- Si vous êtes atteint de glaucome (pression élevée dans l'œil).
- Si vous avez de la difficulté à uriner (rétention urinaire).
- Si votre médecin vous a mentionné que vous êtes atteint de troubles mentaux, d'un trouble mental appelé psychose, qui peut s'accompagner de confusion ou d'agitation ou si vous avez déjà songé au suicide.

Si l'une des situations ci-dessous s'applique à vous, **consultez votre médecin :**

- Si une réaction allergique se manifeste, telle que de la fièvre accompagnée d'une enflure des ganglions, d'une éruption cutanée ou de la formation de cloques ou de vésicules sur la peau, informez-en immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus près (voir **EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE**).

- Si vous faites plus de crises d'épilepsie que d'habitude, informez-en immédiatement votre médecin.
- Si vous ressentez des effets secondaires, tels que de la somnolence, des maux de tête, une perte d'équilibre, une vision double, des étourdissements, des nausées ou des vomissements, consultez votre médecin.
- Si, à n'importe quel moment, vous songez à vous faire du mal ou à vous enlever la vie. Un petit nombre de patients traités par des antiépileptiques ont signalé des idées et un comportement suicidaires. Si cela devait vous arriver, ou si vous observez de tels signes chez une personne à votre charge, consultez immédiatement le médecin traitant. Le patient doit alors faire l'objet d'une surveillance étroite. **Le traitement ne doit pas être cessé sans l'approbation du médecin traitant.**
- Si vous êtes atteint de problèmes aux reins associés à un faible taux de sodium dans le sang ou si vous présentez des troubles rénaux et prenez également certains médicaments qui font baisser votre taux de sodium sanguin (diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide ou le furosémide).
- Si vous éprouvez des étourdissements, de la somnolence, une baisse de tension artérielle (basse pression) ou de la confusion attribuables au traitement par APO-CARBAMAZEPINE, ces effets pouvant entraîner des chutes.

APO-CARBAMAZEPINE peut avoir un effet sur la fertilité masculine ou causer une anomalie des spermatozoïdes.

On recommande de faire des examens périodiques des yeux durant le traitement par APO-CARBAMAZEPINE.

Ne pas conduire de véhicule ou faire fonctionner des machines à moins d'avoir la certitude qu'APO-CARBAMAZEPINE ne cause pas de somnolence ou des étourdissements, de vision trouble ou ne nuit pas à votre coordination musculaire ni à votre vigilance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez aviser votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament d'ordonnance, un médicament en vente libre ou des produits de santé naturelle. Il est très important de le mentionner, car de nombreux médicaments et produits naturels peuvent interagir avec APO-CARBAMAZEPINE.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Votre dose pourrait devoir être modifiée ou vous pourriez devoir cesser la prise d'un des autres médicaments.

Chez les femmes qui prennent un contraceptif hormonal (pilule anticonceptionnelle) et APO-CARBAMAZEPINE, une irrégularité des règles peut se produire. Comme votre contraceptif hormonal pourrait perdre de son efficacité, vous devez envisager d'utiliser d'autres moyens de contraception (de type non hormonal).

Ne consommez pas d'alcool durant le traitement par APO-CARBAMAZEPINE.

Ne consommez pas de pamplemousse ni de jus de pamplemousse, car l'effet d'APO-CARBAMAZEPINE pourrait s'en trouver amplifié. D'autres jus de fruits, tels que le jus d'orange ou de pomme, n'ont pas cet effet.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

La posologie doit être déterminée en fonction des besoins de chaque patient. Il est très important de prendre APO-CARBAMAZEPINE selon les directives de votre médecin.

- Ne jamais augmenter ou diminuer la dose recommandée d'APO-CARBAMAZEPINE que vous prenez, sauf si votre médecin vous en avise.
- Si vous prenez APO-CARBAMAZEPINE, **n'interrompez pas soudainement votre traitement** sans d'abord consulter votre médecin. Ce dernier vous indiquera si vous pouvez cesser de prendre votre médicament et, le cas échéant, à quel moment le faire.
- Les comprimés APO-CARBAMAZEPINE ordinaires devraient être pris en 2 à 4 doses fractionnées par jour, avec les repas quand cela est possible.
- Les comprimés APO-CARBAMAZEPINE CR doivent être avalés entiers avec un peu de liquide, pendant ou après les repas.

Adultes et enfants de plus de 12 ans

La posologie initiale est de 100 à 200 mg, 1 ou 2 fois par jour. Votre médecin déterminera la dose qui vous convient. Suivez toujours les directives du médecin. Pour le traitement de la névralgie du trijumeau, la dose maximale quotidienne est de 1 200 mg.

Enfants de 6 à 12 ans

La posologie initiale est de 100 mg le premier jour, administrée en plusieurs prises. Le médecin déterminera la dose qui convient le mieux à l'enfant. Suivez toujours les directives du médecin.

Surdosage :

En case de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous avez oublié de prendre APO-CARBAMAZEPINE, prenez votre dose dès que possible. Cependant, s'il est presque temps de prendre la dose suivante, ne prenez pas celle que vous avez oubliée et continuez votre traitement selon l'horaire habituel. Ne doublez pas la dose pour compenser celle que vous avez oubliée.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Les effets secondaires peuvent comprendre les suivants :

- bosses mauves ou rougeâtres pouvant vous démanger;
- tremblements, mouvements involontaires du corps, spasmes musculaires, perte de coordination musculaire, faiblesse;
- agitation ou hostilité (surtout chez les patients âgés), dépression s'accompagnant d'agitation, de nervosité ou d'autres modifications de l'humeur ou de l'état mental, changements de comportement, confusion, maux de tête et pertes de mémoire;
- vision trouble ou double, démangeaisons s'accompagnant de rougeurs et d'enflure des yeux (conjonctivite), mouvements involontaires des yeux;
- difficulté à parler ou à articuler, perturbation du goût, sécheresse de la bouche, rougeurs et douleurs à la langue, ulcères dans la bouche;
- tintement ou autres sons inexplicables dans les oreilles, baisse de l'ouïe;
- engourdissements ou picotements dans les mains et les pieds;
- sécrétion inhabituelle de lait maternel, augmentation du volume des seins chez l'homme, troubles sexuels (dysfonctionnement érectile), infertilité masculine;
- sensibilité accrue de la peau au soleil, modifications de la pigmentation de la peau, acné, transpiration accrue;

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

- réactivation de l'herpèsvirus (pouvant être grave en présence lorsque le système immunitaire est affaibli);
- perte complète des ongles, chute de cheveux, croissance excessive de poils sur le corps et le visage;
- vomissements, nausées, perte d'appétit, constipation, diarrhée, douleurs abdominales;
- étourdissements, somnolence, agitation, fatigue;
- gain de poids;
- douleurs articulaires ou musculaires.
- chute provoquée par des étourdissements, de la somnolence, une basse pression ou une confusion mentale.

L'emploi prolongé d'antiépileptiques, tels que la carbamazépine, le phénobarbital, la phénytoïne, la primidone, l'oxcarbazépine, la lamotrigine et le valproate de sodium, est associé à un risque de diminution de la densité minérale osseuse pouvant entraîner l'affaiblissement et la fragilisation des os.

Si l'un de ces effets devient grave ou inconfortable, dites-le à votre médecin.

La carbamazépine peut entraîner des résultats anormaux aux épreuves sanguines. Votre médecin décidera quand les épreuves sanguines devront être effectuées et en interprétera les résultats.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes/effets	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin
	Cas graves seulement	Dans tous les cas	
Fréquents			
Réduction du nombre de globules blancs : fièvre, mal de gorge, éruption cutanée, ulcères dans la bouche, enflure des ganglions ou résistance moindre aux infections	✓		
Pensées ou comportements suicidaires : pensées, plans et actions ayant pour but de vous faire du mal ou de vous enlever la vie		✓	
Courants			
Œdème : enflure des chevilles, des jambes ou des pieds	✓		
Rares			
Lupus érythémateux disséminé : formation de plaques rouges, principalement sur le visage, pouvant s'accompagner de fatigue, fièvre, nausées ou perte d'appétit.	✓		
Hallucinations : voir ou			

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes/effets	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin
	Cas graves seulement	Dans tous les cas	
entendre des choses irréelles	✓		
Hypertension ou hypotension (haute/basse pression) : étourdissements, évanouissement, sensation d'ivresse	✓		
Très rares			
Glaucome : pression/douleur dans les yeux			✓
Thrombophlébite : enflure et rougeur le long d'une veine, extrêmement sensible ou douloureuse au toucher		✓	
Œdème de Quincke et réaction allergique grave : enflure du visage, des yeux ou de la langue, difficulté à avaler, respiration sifflante, urticaire et démangeaisons généralisées, éruption cutanée, fièvre, crampes abdominales, malaise ou sensation d'oppression dans la poitrine, difficulté à respirer, perte de conscience			✓
Réaction cutanée grave : n'importe quelle combinaison des symptômes suivants : éruption cutanée qui démange, rougeur, formation de cloques ou de vésicules sur les lèvres, les yeux ou dans la bouche, desquamation (peau qui pèle) accompagnées de fièvre, de frissons, de maux de tête, de toux, de douleur dans certaines parties du corps ou enflure des ganglions lymphatiques, douleur articulaire, augmentation du volume du foie ou de la rate; tout problème aux poumons, aux reins, au pancréas, au cœur, à la moelle osseuse, au thymus et au côlon			✓
Hépatite : jaunissement de la peau, urines foncées, douleurs abdominales, nausées, vomissements, perte d'appétit		✓	
Méningite : fièvre, nausées, vomissements, maux de tête, raideur du cou et hypersensibilité à la lumière vive			✓
Pancréatite : douleur vive dans la partie supérieure de	✓		

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes/effets	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin
	Cas graves seulement	Dans tous les cas	
l'abdomen, vomissements ou perte d'appétit			
Réduction marquée du débit urinaire en raison de troubles rénaux ou présence de sang dans les urines; besoin fréquent d'uriner	✓		
Porphyrie : urines foncées, douleur abdominale intense, transpiration excessive, vomissements et anxiété		✓	
Réduction du nombre de toutes les cellules sanguines : fatigue, mal de tête, essoufflement à l'effort, étourdissements, teint pâle, infections fréquentes entraînant de la fièvre, des frissons, des maux de gorge ou des ulcères dans la bouche, prédisposition accrue aux saignements et aux ecchymoses (bleus), saignements de nez	✓		
Syndrome malin des neuroleptiques : raideurs musculaires, forte fièvre, altération de la conscience, hypertension (haute pression), salivation excessive			✓
Fréquence cardiaque irrégulière ou douleur dans la poitrine, battements cardiaques rapides ou inhabituellement lents, difficulté à respirer	✓		
Thromboembolie (caillot de sang) : enflure, douleur et rougeur dans un bras ou une jambe, lesquels peuvent être chauds au toucher; possibilité d'apparition soudaine de douleur thoracique, de difficulté à respirer et de palpitations cardiaques			✓
Collapsus circulatoire : incapacité du corps à acheminer le sang aux organes; problème très grave pouvant être mortel			✓
Altération de la conscience ou évanouissement		✓	
Hyponatrémie (faible taux de sodium dans le sang) : léthargie, confusion, contractions musculaires ou aggravation importante	✓		

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes/effets	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin
	Cas graves seulement	Dans tous les cas	
des crises d'épilepsie			
Fréquence inconnue	Inflammation du côlon : diarrhée, douleur abdominale et fièvre	✓	

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise d'APO-CARBAMAZEPINE, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Garder ce médicament à la température ambiante de 15 °C à 30 °C.

Gardez le flacon bien fermé à l'abri de l'humidité.

Ne pas le ranger dans la salle de bain où vous prenez souvent des douches, par exemple.

Garder ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d'être associées avec l'utilisation d'un produit de santé par:

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir davantage au sujet de APO-CARBAMAZEPINE :

- communiquez avec votre professionnel de la santé;

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

- consultez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); ainsi que le site Web du fabricant : <http://www.apotex.com/ca/fr/products>. Vous pouvez aussi l'obtenir en téléphonant au fabricant au 1-800-667-4708.

Cette notice a été préparée par Apotex inc., Toronto (Ontario) M9L 1T9.

Dernière révision : 20 février 2018