

هاذول ®

أقراص ، نطق بالفم

محلول للشرب

محلول للحقن

فيم يستخدم هالدول ؟

- يخفف هالدول من اضطرابات التفكير ، والشعور ، والسوئال مثل :
 - المعتدات الزائفة وهي غير حقيقيه (الضلالات)
 - شكوك غير معتاده .
 - سماع أو رؤية أو استشعار الاشياء بطريقة مختلفة ، اشياء غير موجودة فعليا (هلاوس)
 - الإرتباك (أحيانا يتزامن مع تعاطي الكحوليات)
 - حدة المزاج ، الاضطرابات السلوكية بشكل عام .
- إضافة إلى ذلك فان هالدول يستخدم أيضا في علاج مايلي ؛
 - الحركات الارادية مثل التشنجات اللا ارادية .
 - الفواق .
 - الآلام الشديده المستمرة لفترة طويلة حتى مع مسكنات الالم الأخرى .
 - الغثيان والقيء في حالة عدم نفع الادوية الأخرى .

متى يتوجب عليك الإمتناع عن استخدام هالدول ؟

لا تستخدم هالدول في الحالة الآتية:

- إذا كنت تعاني من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش .
 - إذا واجهتك حالات الغماس أو البهده نتيجة مرض معين أو استخدام أدوية معينة أو كحوليات.
 - إذا كنت تعلم إنك شديد الحساسية لدواء .
 - إن كنت في شك ، اتصل بالطبيب .
- #### ماهي الإحتياطات الواجب عليك مراعاتها ؟
- إذا كنت تعاني حاليا أو عانيت فيما سبق من أي مما يلي عليك ابلاغ طبيبك والذي سيتبع بدوره حالتك عن قرب :
 - اضطرابات القلب ، أو وجود تاريخ مرضي في العائلة لأعراض القلب ، أو أن كنت تتناول أدوية للقلب .
 - إكتئاب .
 - مشاكل كبدية.
 - صرع ، أو أي حالة أخرى تسبب حدوث نوبات (مثل : اوقات الشفاء من شرب الكحوليات)
 - نشاط زائد في الغدة الدرقية (زيادة في نشاط الغدة الدرقية) .

الحمل :

- إن كنت حاملا أو تخططين لذلك ، تواصل مع طبيبك الذي سيقترح بدوره إن كان بإمكانك استخدام هالدول .
- لوحظ ظهور أعراض انعكاسية معينة مثل العرشة ، تصلب العضلات ، صعوبة الاععام لدى الأطفال حديثي الولادة من أم كانت تتناول هالدول أثناء الثلث الأخير من الحمل .

- يمر هالدول إلى المشيمة وقد يكون ذلك مصحوبا بتغيرات حركية أو سلوكية في الأطفال المولود من أمهات كانت تستخدم هالدول خلال الثلث الأخير من الحمل .
- الإرضاع :

- يمر هالدول مع حليب الأم لذا فإن عليك التواصل مع الطبيب الذي سيقترح إمكانية استخدام الرضاعة الطبيعية أثناء استخدامك لهالدول .
- القيادة وتشغيل الآلات:

- قد يتسبب هالدول الغماس والذي يقلل من انتباهك وقدتركك على القيادة .لذا فإن عليك الامتناع عن القيادة وتشغيل الآلات قبل ان يكون طبيبك على علم برد فلك لهالدول .
- الأدوية الأخرى والكحوليات :

- عليك تجنب الكحوليات أثناء استخدام هالدول .
- يمكن أن يتغير تأثير هالدول ،على سبيل المثال ؛
 - الادوية التي تطفي من للتأثير ؛ الأقرص المنومة ، المهدئات ، مسكنات الألم القوية .
 - أدوية الإكتئاب .

- أدوية ارتفاع ضغط الدم .
- عليك توخي الحذر أثناء استخدام هالدول والادوية الأخرى مثل مدرات البول ، والتي يمكنها خفض مستوى البوتاسيوم والمغنسيوم .
- اعلم طبيبك إذا كنت تستخدم أي من هذه الأدوية أو أي ادوية أخرى .

- سيخبرك طبيبك عن الادوية التي يمكن استخدامها مع هالدول .
- كيفية استخدام هالدول ومقدار الجرعة .
- يأتي هالدول على هيئة أقراص ، تقاط للفم ، محلول للشرب ، ومحلول للحقن .

- يمكنك تناول هالدول عبر الفم أثناء الوجبات أو بعد الوجبات على حد سواء .
- تؤخذ الأقراص مع كمية قليلة من الماء .
- تأتي نقاط الفم في زجاجة بلاستيكية مزودة بقطارة لعد فطرات الدواء . تناول نقاط الفم بعد اذابتها بكمية صغيرة من الماء ، أو عصير الفاكهة .

- يمكنك أخذ محلول الشرب كما هو. رج الزجاجة قبل كل استخدام .للحصول على الكمية الصحيحة من هالدول استخدم القطارة التي تأتي في العبوة (انظر الصورة) .
- من المهم جدا اخذ الكمية الصحيحة من هالدول . سيعمل طبيبك من الجرعة حتى يحصل على الجرعة التي تناسبك تماما .

- الكميات التالية تعطي فكرة تقريبية عن الكميات الملائمة لحالتك والواجب اخذها .
- سيخبرك الطبيب عن عدد الأقراص أو عدد نقاط الفم أو كمية الشراب الذي تحتاجه تماما .

بالبالغين ؛

- في حالة المعتدات الخاطئة ، اضطرابات الإستشعار، الإرتباك ؛
- في الحالات التي تتطلب تدخل فوري قد يختار طبيبك أعطائك هالدول على هيئة حقن . إذا كان عليك ان تأخذ هالدول عبر الفم فإنك ستحتاج إلى ١٠ إلى ٢٠ ملجم

- في المرة الواحدة ، وليس أكثر من ١٠٠ ملجم في اليوم .
- في حالة الأمراض القائمة لفترة طويلة فإنه يلزم عليك اخذ ١ ملجم على الأقل ٣ مرات في اليوم . وقد يزيد طبيبك هذه الجرعة لتصل إلى ٢٠ ملجم / ٣ مرات يوميا.
- في حالة حدة المزاج ، الشكوك غير المعتاده ، الاضطرابات السلوكية ، التشنجات الارادية، الفواق ؛

- إذا كنت بحاجة لعلاج فوري سيعطيك طبيبك هالدول حقن .
- في الأمراض التي تدوم لوقت طويل عليك اخذ ٥ ، ١٠ إلى ٣ ملجم ٣ مرات يوميا.
- في حالة الآلام الشديدة المستمرة ؛

- عليك اخذ ٥ ، ١٠ أو ١ ملجم هالدول ٣ مرات يوميا مع مسكنات الألم الموصوفة عن طريق الطبيب .
- في حالة الغثيان والقيء ؛

- سيعمد الطبيب الجرعة ويعطيك هالدول حقن .
- السنين ؛

- على المنتين ان يبدأ أو بالعلاج عن طريق اخذ نصف الكمية المذكورة في الجزء الخاص بالبالغين . سيعمل طبيبك الجرعة وفقا للتأثير الذي تحصل عليه .
- الأطفال:

- عادة يتناول الأطفال ٠ ، ١ ملجم لكل ٣ كجم من الوزن ٣ مرات يوميا. يمكن للطبيب تعديل الجرعة بناء على التأثير .
- ارشادات استخدام زجاجة النقط ١٥ مل

- تأتي زجاجة النقط مزودة بغطاء مؤمن ضد الأطفال والذي يفتح كما يلي ؛
- ادفع الغطاء المحوي البلاستيكي لأسفل بينما تدوير الغطاء عكس عقارب الساعة .
- بعد ازالة الغطاء المحوي يمكنك الضغف للحصول على عدد القطرات المطلوبة عن طريق القطارة المزودة مع الزجاجة

- ارشادات استخدام زجاجة محلول الشرب ١٠٠ مل
- واستخدام القطارة (مامصة زجاجية)
- تأتي الزجاجة مزودة بغطاء مؤمن ضد الأطفال والذي يجب عليك استبداله بالقطارة المؤمنة أيضا ضد الأطفال.

- هذان الملحقات يعملان كالآتي ؛
- ادفع الغطاء المحوي البلاستيكي لأسفل بينما تدويره عكس عقارب الساعة .
- عند استخدام الزجاجة لأول مرة ؛

- شكل ١ ادفع الغطاء عن الزجاجة .
- شكل ٢ اخرج القطارة من غلاها .
- الآن عليك تثبيت القطارة على الزجاجة .

- منذ ذلك الحين فصاعدا
- في أي وقت تحتاج استخدام الدواء قم بالخطوات على النحو الوارد ادناه ؛
- شكل ٣ اخرج القطارة من الزجاجة .
- تناول الكمية المحددة التي تحتاجها من المحلول .

- سيجد رقم الميليلترات أو الميليغرامات على القطارة .
- أعد تثبيت القطارة مرة أخرى على الزجاجة بعد كل استخدام .
- ارشادات فتح الزجاجة ١٠٠ مل واستخدام القطارة (مامصة بلاستيكية)

- شكل ١ ؛ تأتي الزجاجة الكهرمانيمة سعة ١٠٠ مل مزودة بغطاء مقاوم للاطلاق والذي يفتح كما يلي ؛
- ادفع الغطاء المحوي البلاستيكي لأسفل أثناء ادارة عكس عقارب الساعة .
- ازل الغطاء بعد فكه .

- شكل ٢ ؛ اغمس الماصة في الزجاجة . أثناء مسكها بالحلقة القاعدة ، اسحب الحلقة العلوية لأعلى حتى تقابل العلامة المقابلة لعدد الميليلترات أو الميليغرامات التي تحتاجها .
- شكل ٣ ؛ اخرج المزجعة بكاملها من

- افرد محتويات الماصة في كوب عن طريق ازالاق الحلقة العلوية لاسفل ثم اشربه فورا . اغلق الزجاجة واشطف الماصة بأماءلاستخدامها مستقبلا
- هام

- قد يستغرق الأمر وقتا حتى تشعر بتأثير الدواء . لا تتوقف عن تناول هالدول إلا إذا اخبرك طبيبك بذلك . إذا توقفت عن تناوله مبكرا بدون موافقة الطبيب قد تعود مشكلتك كما كانت مرة أخرى .
- إذا اخبرك طبيبك ان توقف عن استخدامه فإن عليك القيام بذلك تدريجيا خصوصا إذا كنت تأخذ جرعة عالية.

- قد يؤدي التوقف المفاجيء عن الدواء إلى بعض الآثار المزعجة بعد ذلك مثل الغثيان والقيء ، لذا كن على اتصال مع طبيبك في اللحظة التي تتوقف فيها عن الاستخدام .
- متاثيرات غير مرغوبة

- تحدثوا بأسفلك قائمة للتأثيرات الجانبية (تسمى أيضا التفاعلات الدوائية العكسية) المرتبطة بالعلاج باستخدام هالدول .
- تأثيرات شائعة جدا (سجلت في واحد على الأقل من كل ١٠ مرضى) ؛

- حدوث تغير في التنسيق الحركي أو حركات لاإرادية في العضلات (تعرف بالأعراض خارج الهرمية) EPS والتي تشمل بهده ، تصلب ، رجرجة، في حركات الأطراف ، الغثق ، الغثين الفم أو اللسان والتي قد تؤدي إلى اوضاع غير معتادة أو ارادية في تغيرات الوجه .
- حركات مفرطة غير طبيعية في اطراف الجسم .
- صداع .

- تأثيرات شائعة (سجلت في واحد على الأقل من كل ١٠٠ مريض) ؛
- الإنفعال ، صعوبة النوم ، أو البقاء نائما لوقت طويل ، الشعور بالحنن أو الإكتئاب .
- بعد العلاج لفترات طويلة قد يظهر اعتلال يشمل ارتعاش في اللسان ، الوجه ، الفم

- أو الفكين وربما يصاحبه حركة دودية بطيئة للسان والفم مع انخفاض القدرة على فتح الفم بصورة كاملة وكلها أعراض قد لا تختفي حتى مع وقف العلاج .
- تشوهات إضافية في التنسيق الحركي أو في الحركة الارادية في العضلات مثل حركة تشنجية في فمات العميون في وضع ثابت عادة مايكون لأعلى ، بهده في الحركات ، وحركات ترجرجة أو ارتجافية ، تصلب في العضلات ، تقلصات عضلية تسبب التواءات وحركات متكررة أو اوضاع غير طبيعية ، وجوها مختلفة للتعبير؛ مشية غير طبيعية، وعدم القدرة على البقاء ثابتا .

- الغماس .
- نوم مفرط .
- رؤية بشكل غير معتاد .
- صعوبة في إنتاج الحركات الامعائية، غثيان ، قيء ، زيادة في إنتاج اللعاب ، أو جفاف الفم .

- انخفاض ضغط الدم بصورة غير طبيعية (يسمى بهبوط ضغط الدم) ، انخفاض ملحوظ في ضغط الدم أثناء الوقوف أو تغير الوضع .
- شذوذ في اختبارات الدم الكبدية .
- طمع جلدي .
- عدم القدرة على التبول .

- المعز الجنسي أو عدم القدرة على الإنتصاب.
- زيادة الوزن بشكل غير مقصود أو نقصان في الوزن .
- أعراض غير شائعة (سجلت على الأقل واحد في كل ١٠٠٠ مريض ولكن اقل من ١ في كل ١٠٠ مريض) ؛
- حساسية وتشمل بنور ، تورم في الوجه .
- الأرق ، الإرتباك ، فقدان الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية .
- تقلصات عضلية لا ارادية مثل مرض باركنسون .
- تضخير .

- تشنجات وتسمى أيضا تقلصات عصبية .
- نقص وضوح في حركة الجسم .
- تصلب متشنج في الأطراف .
- عدم وضوح في الرؤية .
- سراع غير عادي في ضربات القلب .
- شعور بعدم راحة مع التنفس (ضيق نفس) .

- التهاب الكبد ، ازدياد الصفراء في الدم بسبب اصفرار الجلد واللثة والعينين ويسمى (اليرقان).
- حكة الجلد ، التعرق، الإفراط في رد فعل الجلد عند التعرض للضوء .
- اضطرابات حيضية مثل حدوث ألم في الطمث أو انقطاع في فترات الحيض .
- افراز سوائل من حلمات الثدي وعدم راحة وآلم في الثدي .
- متنية غير طبيعية .

- تورم في الأطراف بسبب الإحتباس الشديد للسوائل .
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم بشكل غير معتاد .
- تأثيرات نادرة (سجلت على الأقل واحد من كل ١٠٠,٠٠٠ مرضى ولكن اقل من ١ في كل ١٠٠٠) ؛
- زيادة في كمية كيميوات الجسم والتي ينتج عنها تكوين الحليب في الثدي حتى في الرجال .

- متلازمة صرعية عصبية خبيثة (حالة طبية طارئة تشمل تصلب الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة) .
- حركة العين من جانب لآخر وهي حركة مرتبطة بالشعور بأن الغرفة تدور حول الرأس والجسم .
- تضيق الأنابيب المؤدية إلى الرتتين والتي ينتج عنها الضفير .

- فقدان دم كثير أثناء الحيض .
- مشاكل في الأداء الجنسي .
- شذوذ في اختبار تتبع القلب (رسم القلب الكهربائي)

- تأثيرات شديدة النادرة (سجلت في اقل من ١ في كل ١٠,٠٠٠ مريض) ؛
- انخفاض في عدد الخلايا الدموية التي تحارب العدوى وتسمى الخلايا البيضاء، وأيضا الخلايا المسؤولة عن تكوين الجلطات وتسمى الصفائح الدموية ، أو اختفائها تماما . كما ان كافة أنواع الخلايا الدموية تصبح قليلة في العدد .
- رد فعل تحسسي كافية لإسداد آيزين مع التنفس) ، صعوبة التنفس ، وانخفاض شديد في ضغط الدم .

- زيادة في كيميوات الجسم التي تنظم السوائل عن طريق التخلص من الماء الزائد في البول . وهذا يسبب بقاء الماء وتجميع المواد الكيميائية الضرورية في الدم .
- انخفاض غير معتاد في مستوى السكر في الدم .
- ضربات قلب زائدة ، تقلصات سريره منسقة نوعا ما في القلب ، تقلصات غير منسقة في عضلة القلب التي يمكن أن تؤدي بسرعة إلى الوفاة إن لم يعالج .
- تورم الحبال الصوتية والحنجرة بالسائل ، تشنج الحبال الصوتية والحنجرة (نادرة جدا)

- فشل الكبد على مدار أيام واسابيع ويسمى الفشل الكبدى الحاد واسبنداد في القناة الصفراوية ويسمى انسداد مراري .
- ظهور علامات أرجوانية حمراء صغيرة ، أحيانا مع كتل ليثة من الجلد أو في الأنسجة الأخرى النجمية عن التهاب الأوعية الدموية . طمع جلدي ناتج عن فقدان الطبقة الخارجية من الجلد .

- كبير حجم الثدي حتى في الذكور .
- انتصاب لفترة طويلة بشكل غير معتاد وغير مرتبط بالاثارة الجنسية .
- تورم في الوجه بسبب احتباس مفرط في السوائل .
- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير معتاد .

معلومات اضافية مهمة:

- المرضى المسنين الحساسين بالخرف والذين يتطلبون العلاج باستخدام هالدول للسيطرة على السلوك قد يواجهون خطرا أعلى في الوفاة بالمقارنة مع عدم علاجهم به .
- إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب (الخفقان ، الخفقان ، الدوخة أو الإغماء) ، حمى عالية ، تصلب العضلات ، تنفس سريع ، تعرق غير معتاد ، أو نقص اليقظة العقلية ، عليك ابلاغ طبيبك على الفور فقد يكون جسمك لا يتفاعل مع الدواء بشكل ملائم .

- يجب اخبار الطبيب أو الصيدلي عن أي اثار جانبية أخرى غير مرغوبة قد تواجهك.
- الجرعة الزائدة

- اتصل بطبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .
- وتشمل الأعراض مايلي ؛

- انخفاض اليقظة العقلية، رجفة شديدة ، تصلب في العضلات، هذه الأثناء يمكن البدء به علاج هذه الاضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء بقي في معدتك .

معلومات اضافية مهمة:

- النظر في غسيل المعدة أو تحفيز القيء أو اعطاء الفحم المنشط .
- انشاء مجرى هوائي وتطبيق التدابير الداعمة .
- النظر في النقل للمستشفى .
- مراقبة تخطيط القلب والعلامة الحيوية حتى يصبح التخطيط طبيعيا .
- لا يوجد ترياق محدد ولكن يمكن السيطرة على ردود الفعل خارج الهرمية عن طريق الحقن بمضاد للتشنج الرعاش مثل بيتروترين .

كيفية حفظ هالدول

- عليك حفظ هالدول بين ١٥ - ٣٠° ٥ وهي درجة حرارة الغرفة العادية يمكنك الإحتفاظ بهذا الدواء لفترة محدودة فقط. لا تستخدم هالدول بعد التاريخ المطبوع بعد EXP الشهر والسنة التي ولت مطعها بشكل جيد .
- الشراب ؛ احفظ المحلول من التجمد .
- محلول الحقن ؛ يحفظ بعيدا عن الضوء .
- تنصحك بإعادة الادوية القديمة إلى الصيدلية .

ماهي مكونات هالدول ؟

- الدواء الفعلي في هالدول هو هالوبريدول .
- اقراص هالدول ؛
- يأتي هالدول اقراص في اكثر من تركيز ؛

- ١ ملجم
- تحتوي أيضا على لاكتوز احادي التميوه ، نشا ذرة ، سكروز ، تالك ، زيت بذر القطن المهذرج ، ماء نقى .
- ٢ ملجم

- تحتوي على لاكتوز أحادي التميوه ، نشا ذرة ، سكروز ، تالك ، زيت بذر القطن المهذرج ، ماء نقى ، كينولون أصفر
- ٥ ملجم
- تحتوي على لاكتوز أحادي التميوه ، نشا ذرة ، سكروز ، تالك ، زيت بذر القطن المهذرج ، ماء نقى ، نديوجينول سلفونات الصوديوم .

- ١٠ ملجم
- تحتوي على كالمسيوم هيدروجين فوسفات ثنائي التميوه ، نشا الذرة ، كالمسيوم سيترات، كينولون أصفر ، ماء نقى .
- ٢٠ ملجم

- تحتوي على كالمسيوم هيدروجين فوسفات ثنائي التميوه ، نشا الذرة ، كالمسيوم سيترات، نشا ذرة عليه جيلاتين سميكا ، ماء نقى.

هالدول نقاط بالفم

- تستخدم النقط عن طريق الفم .
- يأتي هالدول نقاط بالفم ١٥ مل مع قطارة .

تركيز الدواء / القطرة

- ١ مل يحوي ٢٠ ملجم هالوبريدول
- ١ مل يحوي ١٠ ملجم هالوبريدول
- ١ مل يحوي ٥ ملجم هالوبريدول

- تحتوي النقط أيضا على حمض اللاكتيك ، ميثيل باراهيدروكسيبنزوات وماء نقى .
- يأتي في زجاجة ١٠٠ مل مع قطارة .

هالدول شراب

- ١ مل يحوي ١٠ ملجم هالوبريدول
- ١ مل يحوي ١٠ ملجم هالوبريدول
- ١ مل يحوي ٥ ملجم هالوبريدول

- تحتوي الشراب أيضا على حمض اللاكتيك ، ميثيل باراهيدروكسيبنزوات وماء نقى .
- يأتي في زجاجة ١٠٠ مل مع قطارة .

هالدول محلول للحقن

- يحتوي الأمبول على ٥ ملجم هالوبريدول .
- يحتوي محلول الحقن أيضا على ماء الحقن ، حمض اللاكتيك.
- تسجيل الشركة الصاحبة / الصنعة ؛
- راجع العلبة الخارجية .

- آخر تحديث لنشرة الدواء الداخلية ؛ يوليو ٢٠٠٨
- ما يتوجب عليك معرفته بشأن الأدوية...
- ابلغ طبيبك أو الصيدلي عن أي أدوية أخرى تستخدمها حيث ان بعض الأدوية ينبغي عدم تناولها معا .

- من الهام استخدام الدواء بالشكل الصحيح ولذا فإنه ينبغي عليك ان ؛
- تتقرأ نشرة المعلومات الخاصة بأمراض كاملة بعناية .
- تستخدم الدواء فقط للغرض الذي وصف من اجله .
- استخدم الدواء بالكمية الموصوفة فقط .
- استخدم الدواء خلال الفترة الموصوفة فقط .
- احفظ جميع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال .

- لا تسمح أبداً للآخرين باستخدام الادوية الموصوفة من اهلك أنت ولا تستخدم أي دواء لم وصفه لآخرين على الإطلاق .
- احفظ الأدوية في عبواتها الأصلية وفي مكان جاف (ليس الحمام اطلاقا على سبيل المثال)

- اجعل من إعادة الادوية التي لم تستخدم أو القديمة إلى الصيدلي الذي تتعامل معه عادة دأمة لك .
- إذا تناول شخص مارجعة زائدة من دواء ، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم .