

**هالدول ديكانويس والأسماء المرتبطة به (انظر الملحق 50 (I مجم/مل محلول للحقن
هالدول ديكانويس والأسماء المرتبطة به (انظر الملحق 100 (I مجم/مل محلول للحقن**

هالوبيريدول ديكانويت

يُرجى قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء نظرًا لاحتوائها على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فاطرّحها على طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط. ولا يجوز إعطاؤه إلى أي شخص آخر. فقد يضر بهم، حتى إذا تشابهت علامات المرض معك.
- في حالة ظهور أي آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي، أو الممرضة. ويتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مرئية في هذه النشرة. انظر القسم 4.

محتويات هذه النشرة

1. ما دواء هالدول ديكانويس وما دواعي استخدامه؟
2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استعمال دواء هالدول ديكانويت
3. كيفية استخدام هالدول ديكانويت
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين هالدول ديكانويت
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما دواء هالدول ديكانويس وما دواعي استخدامه؟

اسم الدواء هو هالدول ديكانويت.

يحتوي هالدول ديكانويس على المادة الفعالة هالوبيريدول (في صورة هالوبيريدول ديكانويت). الذي ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي يطلق عليها اسم "الأدوية المضادة للذهان".

يُستخدم هالدول ديكانويس مع البالغين الذين تم علاجهم فيما سبق بهالوبيريدول عن طريق الفم. ويُستخدم هذا الدواء لعلاج الأمراض التي تؤثر على طريقة تفكيرك ومشاعرك وتصرفاتك. ويشمل ذلك مشكلات نفسية (مثل القسام). قد تجعلك هذه الأمراض تشعر بما يلي:

- الشعور باضطراب (هنيان)
- رؤية أشياء غير موجودة بالفعل أو سمعها أو شم رائحتها (الهلوسة)
- تصديق أشياء غير صحيحة (الأوهام)
- شعور غير عادي بالشك (جنون الارتياب)
- شدة الشعور بالإثارة أو البياج أو الحماس أو الاندفاع أو فرط النشاط
- الشعور الزائد بالعدوانية والشعور العدائي والعنف.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استعمال دواء هالدول ديكانويت

لا تستخدم دواء هالدول ديكانويس في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة هالوبيريدول أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (درجة في القسم 6) [يتم استكماله محلياً]
- كنت غير مدرك للأشياء من حولك أو عندما تصبح ردود أفعالك بطيئة بشكل لم تعهد
- إذا كنت تعاني من مرض باركنسون
- تعاني من نوع من الخرف يسمى "داء جسيمات ليوبي"
- تعاني من شلل فوق نخاعي تقدمي (PSP)
- تعاني من حالة قلبية تسمى "إطالة فترة QT"، أو أي مشكلة أخرى في إيقاع القلب تظهر كإشارات غير طبيعية في الرسم الكهربائي للقلب (ECG)
- تعاني من قصور في القلب أو في الأوعية الأخيرة أصبت بأزمة قلبية

- تعاني من انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم لم يتم علاجه
- تناول أي من الأدوية المدرجة تحت قسم "الأدوية الأخرى وهالدول ديكانويس" - لا تستخدم هالدول ديكانويس إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج".

يجب عدم تناول هذا الدواء إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تطبق عليك. إذا لم تكن متأكداً، فاستشر الطبيب أو الممرضة قبل إعطائك دواء هالدول ديكانوبيت.

التحذيرات والاحتياطات

الآثار الجانبية الخطيرة

يمكن أن يسبب هالدول ديكانويس مشكلات في القلب ومشكلات في السيطرة على الجسم أو حركة الأطراف وتأثير جانبي خطير يُسمى "متلازمة الورم الخبيث لمضادات الذهان". ويمكن أن يسبب أيضاً ردود فعل تحسسية شديدة وتجلط الدم. يجب أن تكون على بينة بالآثار الجانبية الخطيرة أثناء استخدام هالدول ديكانويس لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل. انظر "انتبه إلى الآثار الجانبية الخطيرة" في القسم 4.

كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الخرف
تم الإبلاغ عن زيادة بسيطة في الوظائف والسكنات الدماغية لكبار السن الذين يعانون من الخرف والذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان. تحدث إلى طبيبك قبل إعطائك هالدول ديكانويس إذا كنت من كبار السن، خاصةً إذا كنت تعاني من الخرف.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من:

- ضربات قلب بطيئة إذا كان لديك مرض بالقلب أو حدثت وفاة لأحد أقاربك فجأة بسبب مشكلات قلبية
- انخفاض ضغط الدم أو الشعور بالدوار عند الجلوس أو الوقوف
- مستوى منخفض من البوتاسيوم أو الماغنيسيوم (أو "الشوارد الكهربائية" الأخرى) في الدم. سيقرر طبيبك كيفية علاج هذه الحالة
- إذا حدث لك نزيف بالمخ، أو أخبرك طبيبك بأنك أكثر عرضة من غيرك للإصابة بسكتة دماغية
- الصرع أو النوبات (التشنجات) في أي وقت مضى
- مشكلات في الكلى أو الكبد أو الغدة الدرقية
- مستوى عالٍ من هرمون "البرولاكتين" في الدم، أو السرطان الذي قد يكون سببه ارتفاع في مستويات البرولاكتين (مثل سرطان الثدي)
- تارikh مرضي من الإصابة بجلطات الدم أو شخص آخر في عائلتك لديه تاريخ مرضي من الإصابة بجلطات الدم
- الاكتئاب.

قد تحتاج إلى متابعة مباشرة وقد يلزم تغيير كمية جرعة دواء هالدول ديكانويس التي تحصل عليها.

إذا لم تكن متأكداً من عدم انتظام أي من المذكور أعلاه عليك، فتحدث إلى الطبيب أو الممرضة قبل إعطائك دواء هالدول ديكانوبيت.

الفحوصات الطبية

قد يحتاج الطبيب إلى إجراء رسم قلب (ECG) قبل أو أثناء العلاج باستخدام دواء هالدول ديكانوبيت. يقيس رسم القلب النشاط الكهربائي للقلب.

اختبارات الدم

قد يرغب طبيبك في فحص مستويات البوتاسيوم أو الماغنيسيوم (أو "الشوارد الكهربائية" الأخرى) في الدم قبل أو أثناء العلاج بهالدول ديكانوبيت.

الأطفال والمرأهقون

لا ينبغي استخدام هالدول ديكانويس مع الأطفال والمرأهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وذلك لأنه لم يتم إجراء الدراسة على هذه المجموعات العمرية.

الأدوية الأخرى وهالدول ديكانوبيت

يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو كنت قد تناولت أي أدوية أخرى.

لا تستخدم هالدول ديكانويس إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج:

- مشكلات في ضربات القلب (مثل أميودارون ودوفتيلايد وديسوبيراميد ودرونيدارون وإيبوتيد وكينيدين وسوتالول)
- الاكتئاب (مثل سيتالوبرام وإيسسيتالوبرام)
- الذهان (مثل فلوفينازين وليفومبرومازين وبيرفينازين وبيموزيد وبروكلوربيرازين وبرومازين وسيرتندول وثيوريزادين وتريفلوبورازين وتريفلوبورومازين وزيراسيدون)

- العدوى البكتيرية (مثل أزيرثروميسين وكلارإيثروميسين واريثروميسين وليفوفلوكساسين وموكسيفلوكساسين وتيليثروميسين)
- العدوى الفطرية (مثل بنتاميدين)
- الملاриا (مثل هالوفانترین)
- الغثيان والقيء (مثل دولاسترون)
- السرطان (مثل توريميفين وفانديتاتيب).

أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تتناول بيريبييل (العلاج الآلم في الصدر أو لخفض ضغط الدم) أو الميثادون (مسكن أو لعلاج إدمان المخدرات).

قد تؤدي هذه الأدوية إلى زيادة احتمالية الإصابة بمشكلات في القلب، لذلك تحدث مع طبيبك إذا كنت تأخذ أيّاً من هذه الأدوية ولا تستخدم هالدول ديكانويس (انظر "لا تستخدم هالدول ديكانويس في الحالات التالية").

قد تحتاج إلى متابعة خاصة عند تناولك الليثيوم ودواء هالدول ديكانويس في الوقت نفسه. أخبر طبيبك مباشرة وتوقف عن تناول كلٍ من الدواعين عند حدوث:

- حمى لا يمكن تفسير سببها أو حركات لا يمكن السيطرة عليها
 - الشعور بالاضطراب أو التتوّش أو الصداع أو مشاكل في التوازن أو الشعور بالنعاس.
- كل هذه علامات لوجود حالة خطيرة.

قد تؤثر بعض الأدوية على فعالية هالدول ديكانويس أو قد تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بمشكلات في القلب أخبر طبيبك إذا كنت تتناولين:

- أليبرازولام أو بوسبيرون (العلاج القلق)
 - دولوكسيتين، فلوكتسيتين، فلوفوكسامين، نيفازدون، باروكسيتين، سيرترالين، نبتة سانت جون (سيبيريكوم، بيرفوراتوم)
 - أو فينلافاكسين (العلاج الاكتئاب)
 - بوبروبيون (العلاج الاكتئاب أو المساعدة على التوقف عن التدخين)
 - كاربامازيبين أو فينوباربیتال أو فينيتوين (العلاج الصرع)
 - ريفلاميبيسين (العلاج العدوى البكتيرية)
 - إنترافونازول أو بوساكونازول أو فوريكونازول (العلاج العدوى الفطرية)
 - أقراص كيتوكونازول (العلاج متلزمة كوشينج)
 - إندينافير أو ريتونافير أو ساكينافير (العلاج فيروس نقص المناعة البشرية أو "HIV")
 - كلوربرومازين أو بروميذازين (العلاج الغثيان والقيء)
 - فيراباميل (العلاج ضغط الدم أو مشكلات القلب).
- أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تتناول أي دوّية أخرى لخفض ضغط الدم، مثل أقراص الماء (مدرات البول).

قد يضطر طبيبك إلى تغيير جرعة هالدول ديكانويس إذا كنت تتناول أيّاً من هذه الأدوية.

يمكن أن يؤثر دواء هالدول ديكانويس على فعالية أنواع الأدوية الآتية

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية للحالات الآتية:

- للتهنئة والمساعدة على النوم (المهدئات)
- الألم (المسكّنات القوية)
- الاكتئاب ("مضادات الاكتئاب ثلاثة الحلقات")
- الأدوية المعالجة لانخفاض ضغط الدم (مثل غوانيثيدين وميثيلدوبا)
- ردود الأفعال التحسسية (الأدرينالين)
- "اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط" (ADHD) أو الخُدار (المعروف باسم "المنشطات")
- الأدوية المعالجة لمرض باركنسون (مثل ليفودوبا)
- سيولة الدم (فينينديون).

استشر طبيبك أو الممرضة الخاصة بك قبل إعطائك دواء هالدول ديكانويس إذا كنت تتناول أيّاً من هذه الأدوية.

دواء هالدول ديكانويس والكحول

قد يجعلك شرب الكحول أثناء استخدام دواء هالدول ديكانويس تشعر بالنعاس وفي حالة انتباه أقل. هذا يعني أنه يجب مراعاة كمية الكحول التي تتناولها. تحدث مع طبيبك بشأن شرب الكحول أثناء استخدام هالدول ديكانويس، وأخبر طبيبك بالكمية التي تشربها.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوصية

الحمل - إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو كنت تحظطين لإنجاب طفل، استشيري طبيبك. قد ينصحك طبيبك بعدم استخدام هالدول ديكانويس أثناء الحمل.

قد تحدث المشكلات التالية لدى الأطفال حديثي الولادة الذين استخدمت أمهاتهم هالدول ديكانويس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (الثلث الأخير من فترة الحمل):

- ارتعاش العضلات أو تقلصات العضلات أو ضعف العضلات
- النعاس أو الهياج
- مشكلات التنفس أو التغذية.

معدل تكرار هذه المشكلات غير معروف على وجه الدقة. إذا كنت تستخدمين هالدول ديكانويس أثناء الحمل وظهرت على طفلك أي من هذه الآثار الجانبية، اتصل بطبيبك.

الرضاعة الطبيعية - استشيري طبيبك إذا كنت مرضعاً أو تعقدين أو تخططين للرضاعة الطبيعية. وهذا بسبب احتمال وصول كميات قليلة من الدواء إلى لين الأم وللطفل. سوف يناقش معك طبيبك مخاطر وفوائد الرضاعة الطبيعية أثناء استخدام هالدول ديكانويس.

الخصوصية - قد يزيد هالدول ديكانويس من مستويات هرمون يسمى "برولاكتين"، والذي قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال والنساء. تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بذلك.

القيادة واستخدام الآلات

قد يؤثر هالدول ديكانويس على قدرتك على قيادة السيارة واستخدام الأدوات أو الآلات. الآثار الجانبية، مثل الشعور بالنعاس، قد تؤثر على انتباحك، لا سيما عند البدء في استخدامه أو بعد تناول جرعة كبيرة. تجنب القيادة أو استخدام أي أدوات أو أجهزة دون مناقشة هذا مع طبيبك أولاً.

تحتوي هالدول ديكانويس على الكحول البنزيلي وزيت السمسم يحتوي هذا الدواء على 15 مجم من الكحول البنزيلي في كل مل من المحلول. قد يسبب الكحول البنزيلي حدوث تفاعلات الحساسية. استشيري الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تعاني من أعراض الكبد أو الكلى، أو إذا كنت حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية. وهذا نظراً لأن الكميات الكبيرة من الكحول البنزيلي قد تترآكم في الجسم وقد تسبب آثاراً جانبية (أُعْرَف بالحماض الأيضي). يحتوي هذا الدواء أيضاً على زيت السمسم الذي قد يسبب تفاعلات حساسية شديدة في أحوالٍ نادرة.

3. كيفية استخدام هالدول ديكانويس

كمية الدواء الذي ستحصل عليه

سيقر طبيبك كمية دواء هالدول ديكانويس التي تحتاج إليها ومدة ذلك. سيقوم طبيبك بتعديل الجرعة لتتناسب حالتك، وقد يعطيك أيضاً أحد أنواع هالوبيريدول التي يتم تناولها عن طريق الفم. تعتمد جرعتك من هالوبيريدول ديكانويس على:

- سنك
- إذا كنت تعاني من مشكلات في الكلى أو الكبد
- كيفية استجابتك لها
- أدوية أخرى تتناولها.

البالغون

ستكون جرعتك الأولية عادةً بتركيز ما بين 25 إلى 150 مجم. قد يقوم الطبيب بتعديل الجرعة بما يصل إلى 50 مجم كل 4 أسابيع لتحديد الجرعة التي تناسب حالتك (عادةً ما بين 50 مجم و200 مجم كل 4 أسابيع). لن يتم إعطاؤك أكثر من 300 مجم كل 4 أسابيع.

الأشخاص كبار السن

عادةً ما يبدأ كبار السن بجرعة أقل، عادةً 12.5 مجم إلى 25 مجم كل 4 أسابيع. يمكن تعديل الجرعة حتى يجد الطبيب الجرعة التي تناسب حالتك (عادةً بين 25 مجم و75 مجم كل 4 أسابيع). سوف يتم إعطاؤك جرعة أعلى من 75 مجم كل 4 أسابيع فقط إذا قرر طبيبك أنه من الآمن القيام بذلك.

كيفية إعطاء هالدول ديكانويس

سيعطيك طبيب أو الممرضة دواء هالدول ديكانويس. وهو مخصص للاستخدام العضلي، ويعطى بالحقن العميق في العضل. عادةً ما تستمر الجرعة الواحدة من ديكانويس هالدول لمدة 4 أسابيع. لا يجب حقن ديكانويس هالدول في الوريد.

في حالة تناول جرعة زائدة من هالدول ديكانويس

سيعطيك طبيب أو ممرضة هذا الدواء، لذلك، من غير المحتمل أن تُعطى مقداراً كبيراً. إذا كنت تشعر بالقلق، فأخبر الطبيب أو الممرضة.

إذا فاتتك جرعة أو توقفت عن استخدام هالدول ديكانويس

يجب عدم التوقف عن تناول هذا الدواء إلا بطلب من طبيبك حيث قد تظهر الأعراض مجدداً. إذا فاتتك موعداً، اتصل بطبيبك على الفور لتحديد موعد جديد.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بشأن استخدام هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، على الرغم من عدم إصابة الجميع بها.

انتبه إلى الآثار الجانبية الخطيرة

أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا لاحظت أو شككت في حدوث أيّ من الأمور التالية. فقد تحتاج إلى علاج طبي عاجل.

مشكلات في القلب:

- نظم غير طبيعي للقلب - يجعل القلب لا يعمل بشكل طبيعي، ويمكن أن يسبب فقدان الوعي
- خفقان سريع للقلب بشكل غير طبيعي
- زيادة خفقان القلب.

مشكلات القلب غير شائعة بين الأشخاص الذين يستخدمون هالدول ديكانويس (حيث إنها قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص). وقد حدثت وفيات مفاجئة في المرضى الذين يستخدمون هذا الدواء، ولكن معدلات تكرار حدوث الوفيات غير معروفة على وجه الدقة. حدثت سكتة قلبية (توقف خفقان القلب) أيضاً في الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان.

مشكلة خطيرة تسمى "متلازمة الورم الخبيث لمضادات الذهان". وهذا يسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة، وصلابة شديدة في العضلات، والارتباك وفقدان الوعي. معدل تكرار هذا التأثير الجانبي في الأشخاص الذين يستخدمون هالدول ديكانويس غير معروف على وجه الدقة.

مشكلات السيطرة على حركة الجسم أو الأطراف (اضطرابات حركة العضلات الهيكلية)، مثل:

- حركة الفم واللسان والفك وأحياناً الأطراف (خلل الحركة المتأخر)
- شعور بعدم الراحة أو صعوبة الجلوس في وضع ساكن، وزيادة في حركة الجسم
- بطء أو فلة حركة الجسم أو نفخان أو حركات ارتعاشية
- ارتعاش العضلات أو تقلصات العضلات أو تناقل خطوات المشي
- عدم القدرة على الحركة
- اختفاء تعبيرات الوجه العادمة، ليبدو في بعض الأحيان وكأنه قناع.

هذه الأعراض شائعة جدًا بين الأشخاص الذين يستخدمون هالدول ديكانويس (حيث إنها قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص). عند حدوث أيّ من هذه التأثيرات، قد تحتاج إلى دواء إضافي.

ردود الفعل التحسسية الحادة التي قد تتشمل:

- تورم الوجه أو الشفتين أو الفم أو اللسان أو الحلق
- صعوبة في البلع أو التنفس
- طفح مثير للحكمة (الشرى).

معدل تكرار هذا التفاعل التحسسي في الأشخاص الذين يستخدمون هالدول ديكانويس غير معروف على وجه الدقة.

جلطات دموية في الأوردة، عادةً في الساقين (خثار الوريد العميق أو DVT). وقد تم الإبلاغ عن هذه الحالات لدى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان. علامات خثار الوريد العميق في الساق تشمل تورم وألم واحمرار في الساق، ولكن الجلطات قد تتحرك إلى الرئتين مما يسبب ألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس. ويمكن أن تكون الجلطات الدموية خطيرة جدًا، لذلك أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أيّ من هذه المشكلات.

أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أيّ من الآثار الجانبية الخطيرة المذكورة سابقاً.

الآثار الجانبية الأخرى

أخبر الطبيب إذا لاحظت أو شككت في حدوث أيّ من الآثار الجانبية التالية:

آثار شائعة قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص:

- الاكتئاب
- صعوبة النوم أو الشعور بالنعاس
- الإمساك
- جفاف الفم أو زيادة اللعاب
- مشكلات في الجماع

تهيج أو ألم أو تجمّع للكيغ (خراج) موضع الحقن
زيادة الوزن.

آثار غير شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص):

- توثر عضلي غير طبيعي
- الصداع
- حركة العيون لأعلى أو حركات العين السريعة التي لا يمكنك السيطرة عليها
- مشكلات في الرؤية، مثل الرؤية المشوّشة.

كما تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية، ولكن معدل تكرار حدوثها غير معروف على وجه الدقة:

- مشكلة نفسية خطيرة، مثل الاعتقاد بأمور غير صحيحة (أوهام) أو رؤية أو الشعور بأشياء غير موجودة أو سماعها أو شم رائحتها (هلوسة)

- الشعور بالهياج أو الارتباك
- النوبات (التشنجات)

- الشعور بالدوار، ويشمل ذلك عند الجلوس أو الوقوف
- انخفاض ضغط الدم

مشكلات يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس، مثل:

- نورم حول الحنجرة أو تشنج لفترة قصيرة في الأحبال الصوتية، والذي يؤثر على الكلام
- ضيق في الشعب الهوائية بالرئتين
- ضيق النفس

- الغثيان والقيء
- تغيرات في الدم، مثل:

- آثار على خلايا الدم - انخفاض عدد جميع أنواع خلايا الدم، بما في ذلك انخفاض حاد في خلايا الدم البيضاء وانخفاض عدد "الصفائح الدموية" (الخلايا التي تساعد على تجلط الدم)

- زيادة مستوى هرمونات معينة في الدم - "البرولاكتين" و"الهرمون المضاد لإدرار البول" في الدم (متلازمة الإفراز غير السليم للهرمون المضاد لإدرار البول)

- انخفاض مستوى السكر في الدم
- تغيرات تظهر في اختبارات الدم الخاصة بالכבד ومشكلات الكبد الأخرى، مثل:

- اصفرار الجلد أو بياض العينين (البركان)
- الالتهاب الكبدي
- فشل مفاجئ في الكبد

- انخفاض تدفق الصفراء في القناة الصفراوية
- مشكلات الجلد، مثل:

- الطفح الجلدي أو الحكة
- زيادة الحساسية لأشعة الشمس

- تساقط الجلد أو تقشره
- التهاب الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى طفح جلدي مصحوب ببثور حمراء أو أرجوانية صغيرة

- فرط التعرق
- تمزق في الأنسجة العضلية (انحلال الربيبات)

- تشنجات العضلات أو وخز أو انقباضات لا يمكنك السيطرة عليها، ويشمل ذلك تشنجات في العنق تتسبب في دوران الرأس إلى جانب واحد

- صعوبة أو عدم القدرة على فتح الفم

- تصلب العضلات والمفاصل
- عدم القدرة على التبول أو إفراغ المثانة تماماً

- انتصاب مستمر ومؤلم للعضو الذكري
- صعوبة الوصول إلى الانتصاب أو الحفاظ عليه (العنة)

- فقدان الرغبة الجنسية أو انخفاض الرغبة الجنسية
- تغيرات في الدورة الشهرية (الحيض)، مثل عدم وجود حيض، أو طول مدة الحيض أو كثافته أو الحيض المصحوب بألم

- مشكلات الثدي، مثل:

- الألم أو عدم الراحة
- إفراز غير متوقع لحليب الثدي

- تضخم الثديين لدى الرجل
- تورم ناجم عن تراكم السوائل في الجسم

- ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم
- مشكلات في المثانة

- نقص في الوزن.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

في حالة ظهور أي آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي، أو الممرضة. ويتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يساعد الإبلاغ عن الآثار الجانبية، على توفير مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

5. كيفية تخزين هالدول ديكانوبيت

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

ينبغي ألا يستخدم دواء هالدول ديكانوبيس بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على الملصق وعلى العبوة الكرتونية <بعد الأحرف EXP>. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يُخزن في العبوة الأصلية لحمايتها من الضوء.
يُخزن في درجة حرارة مابين 15 و 30 درجة مئوية.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات هالدول ديكانوبيت

محلول 50 مجم/مل:

المادة الفعالة هي هالوبريدول ديكانوبيت. يحتوي كل مل من محلول الحقن على 70.52 مجم من هالدول ديكانوبيت، ما يكفي 50 مجم من مادة هالوبريدول. تتمثل المكونات الأخرى في الكحول البنزيلي وزيت السمسم.

محلول 100 مجم/مل:

المادة الفعالة هي هالوبريدول ديكانوبيت. يحتوي كل مل من محلول الحقن على 141.04 مجم من هالدول ديكانوبيت، ما يكفي 100 مجم من مادة هالوبريدول. تتمثل المكونات الأخرى في الكحول البنزيلي وزيت السمسم.

شكل دواء هالدول ديكانوبيس و محتويات العبوة

محلول 50 مجم/مل:

هالدول ديكانوبيس هو محلول يميل إلى اللون الكهرماني، قليل الزوجة، وخالي من الجسيمات المرئية. يتتوفر في صورة أمبولات زجاجية كهرمانية اللون تحتوي على 1 مل من محلول في عبوات تحتوي على أمبول واحد أو 5 أمبولات، أو أمبولات تحتوي على 3 مل من محلول في عبوات تحتوي على أمبول واحد، أو 5 أمبولات، أو 50 أمبولا (10 عبوات تحتوي كل منها على 5 أمبولات).

محلول 100 مجم/مل:

هالدول ديكانوبيس هو محلول يميل إلى اللون الكهرماني، قليل الزوجة، وخالي من الجسيمات المرئية. يتتوفر في أمبولات زجاجية تحتوي على 1 مل من محلول في عبوات تحتوي على أمبول واحد أو 5 أمبولات.

قد لا تُطرح جميع الترقيزات أو أحجام العبوات في الأسواق.

للتواصل معنا، الرجاء الانتقال إلى الموقع www.janssen.com/contact-us

حامل الرخصة التسويقية

جانسن فارماسيوتيكا البرتغال، ول تي دي استرادا كونسيجليري بيدروزاو 69 أ كوبيليز دي باكسيو 2734-503 باكارينا- البرتغال

الشركة المصنعة

جانسن فارماسيوتيكا إن في- ترنه تسويق- 30-بي-2340 بيرس- بلجيكا

تم آخر مراجعة لهذه النشرة في 5 مايو 2019.

هذا دواء

- الدواء هو منتج يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء. الطبيب والصيدلي هما الخبران بالأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر الوصفة الطبية ذاتها دون استشارة طبيبك.
- احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيادلة العرب