



## أزيكيور®

أزيثروميسين دايهيدرات

الوصف:

أزيكيور® (أزيثروميسين) هو مضاد حيوي من مجموعة أزاليد، مُنْتَجٌ من إريثروميسين (يتبع إلى مجموعة الماكروليدات). يؤدي أزيثروميسين مفعوله المضاد للبكتيريا بمنع تكون البروتينات في البكتيريا المساعدة عن طريق ارتباطه بوحدة الريبيوزون الفرعية ۵۰ ألى لهذه البكتيريا ومنع إنتقال الببتيدات.

الخواص:

يتم إنتاج أزيثروميسين بمرارة من الصناعة الحيوانية بعد تناوله عن طريق الفم وتوزع بشكل كبير خلال الجسم بتوافر حموضي ۳۷٪. يصل تركيز أزيثروميسين في الأنسجة إلى مستويات أعلى من تركيزه في المصل أو البلازما. وجدت دراسة عالمية من أزيثروميسين في اللوزتين، نسيج الرئتين والبروستات، يطرح أزيثروميسين بصورة غير متاحولة بشكل رئيسي عن الطريق الصفراء.

التحاليف: المضادة للجراثيم.

أزيثروميسين يدخل حد البكتيريا الهاوية سالية الغرام وتشمل هيبيوفيليس المتفجرة وأموروكابيكلا دكتارايس.

أزيثروميسين يدخل حد البكتيريا الهاوية موجبة الغرام وتشمل ستانليوكوكس قرني، ستانليوكوكس إجلاتاكتا، ستانليوكوكس بيمينا وستانليوكوكس بيوجيتس.

أزيثروميسين يفعال أيضاً ضد كامبديوتا، إيكوماتين، ميكوكليم، كابريم، أفيقم، وميكموك، وكيريم، إنتراسيليفان.

دوعي الاستعمال:

بروص أزيكيور® في علاج الحالات التالية:

- إثباتات الجهاز التنفسي العلوي وتشمل التهاب الجيوب الأنفية، التهاب البلعوم والتهاب اللوزتين.
- التهاب الأنف الوسطي.

▪ إثباتات الجهاز التنفسي السفلي وتشمل التهاب الرئة والتهاب القصبات.

▪ إثباتات البطل والأنسجة اللمبة غير العقدية.

▪ إثباتات الجهاز التناسلي غير المعقّدة والتي تتبعها كالامبدين أو نيسيريا، غونيوروبا.

▪ الوقاية والعلاج في مرض ميكوباكتريري أو قيام المعد المتناثر.

الجرعات وطريقة الاستعمال:

يوصى بتناول أزيكيور® قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعد الطعام ساعتين.

▪ إثباتات الجهاز التنفسي /إثباتات البطل والأنسجة اللمبة.

البالغون: وعمر جيد: مكبس كل ۱۵۰ ملجم / والأطفال: قرص: حمل ۲۶۶ ملجم - تبلغ مقدار الجرعة الكلية ۱۵ ملجم / كل مرتين يومياً لمدة ۳ أيام.

البالغون: وعمر جيد: مكبس كل ۱۵۰ ملجم / والأطفال: قرص: حمل ۲۶۶ ملجم - يوصى بإعطاء مكبس أزيكيور® للأطفال أقل من وزن ۴۵ كغم، بدلخ مقدار الجرعة الإعتيادية ۱۰ ملجم / كل مرتين يومياً لمدة ۳ أيام.

لتختبر المفعول:

إقبال القراءة لكتاب المصحح واحتلاها أضف كمية من الماء المذكورة أدناه إلى المصحح على دعفتين.

- للحصول على عبوة ۱۵ مل (۱۰۰ ملجم): أضف ۶ مل من الماء.

- للحصول على عبوة ۲۲ مل (۱۰۰ ملجم): أضف ۱۲ مل من الماء.

- للحصول على عبوة ۳۰ مل (۱۰۰ ملجم): أضف ۱۸ مل من الماء.

رج القارء جيداً بعد كل إضافة للحصول على علامة محسنة.

عند الإعطاء، يجب أن يوضع المصحح في طبقين مختلفين عن طريق الجنس (البالغون وكبار السن)، بلغ الجرعة ۱۵ ملجم تطلى كبرمة مفردة.

▪ أمراض التي تختلف في طبق الجنس (البالغون وكبار السن)، بلغ الجرعة ۱۵ ملجم تطلى كبرمة مفردة.

▪ الوقاية من مرض ميكوباكتريري أو قيام المعد المتناثر: تبلغ جرعة أزيكيور® الإعتيادية ۱۲۰ ملجم تؤخذ مرة أسبوعياً. ويمكن لهذه الجرعة أن تتعالى بشكل متزامن مع جرعة ريفابيوتين المعتمدة.

▪ علاج مرض ميكوباكتريري أو قيام المعد المتناثر: يوصى بإعطاء أزيكيور® كبرمة يومياً مقدارها ۶۰ ملجم وتحطى بشكل متزامن مع جرعة موصى بها مقدارها ۱۵ ملجم / كل مرتين يومياً.

مواعيد الاستعمال:

▪ حالات فرط الحساسية لمجموعة الماكروليدات من المضادات الحيوية.

▪ المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة في الكبد.

▪ الاستعمال المتزايد مع مشتقات الارغوت.

محاذير الاستعمال:

▪ ينصح المرضى بوجوبأخذ المضادات البكتيرية والتي تتضمن أزيثروميسين في علاج الإنتانات البكتيرية والتي تتضمن أزيثروميسين في علاج الإنتانات البكتيرية فقط؛ لأنها لا تعالج الإنتانات الفيروسية التي تشمل نزلات البرد العادمة، وعلى المرضى أيضاً إكمال العلاج كما هو موصوف تماماً على الرغم من احتفالية حدوث تحسن شامسة في بداية العلاج.

▪ يتم طرح أزيثروميسين بصورة عامة من طرف الكبد؛ لذا يجب توخي الحذر عند إعطاء أزيثروميسين للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد. لا يوجد معلومات عن استعمال أزيثروميسين في المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد؛ لذا يجب توخي الحذر عند إعطاء أزيثروميسين لهذه الفئة من المرضى.

▪ قد ينبع عن الاستعمال طوابيل الأداء أو المكثرة لأزيثروميسين - كما هي الحال مع باقي المضادات الحيوية من مجموعة الماكروليدات - نحو كائنات مقاومة لا تتأثر به؛ لذا عند حدوث إنتان مخافع

بح وقف لزبتوهابسين والبدء بعلاجات أخرى مناسبة.

- \* يجب توجيه النظر في المرضى الذين يعانون من إطالة في فترة QT، خاصة بعد تسجيل حالات من عدم إنظام في ضربات البطنين عند إستعمال المسارات الجوية من مجموعة الماكروليدات مع مقارنة المرض.

من درس در دراسات للتحول في العروض والفنون، وبجرائم متوسطة السمية إذا أعطيت للأم، ولكن لم يظهر إلا دلائل على وجود ضعف في الشخصية أو خطر على الجنين بسبب أزيزهومايسين. على أيّة حالٍ



وكان أصل الأحصار، الذي أدرج في المراسيم الرسمية، يقتصر على ملوك مصر، وكذلك أوصي بالذلة لاستئصال البشط وذلك ضد الاستعمال المتزايد مع أثريه وما ينبع منه من تدهور الأحوال.



**٣- عدم الأعراض الجانبية التي لم تسبّبها ذات حفيظة إلى مسوسة الخد وغضّ الرأوا عند التوقف عن العلاج.**

- قد حدث اعراض جانبية ولكن بسبة ٦% أو أقل وتتضمن:
    - الجهاز التنفسى-الرعائى: تقليل أيام فى الصدر
    - الجهاز الهضمى: سرر الهمس، انتفاخ، تقطفالأنف و البرقان بسبب ركود الصفراء.
    - الجهاز التناسلى-الرعائى: المictivات، التهاب المهبل والتهاب الكلوة.
    - الجهاز العصبى: دوار، صداع، درجة وعاص.
    - ينحل على إرهاق.
  - أدوية كثيرة تسبب هذه الأعراض جانبية.

فقط الجزء، منه، محسن سعيد وروجه ومهنية.  
إن الأخطاء الجاذبة الملاحظة في جرعات أعلى من الجرعات الموصى بها كانت مشابهة لتلك في الجرعات العارضة.

عند حدوث فرط للجرعة، يجب إتخاذ الإجراءات العرضية الداعمة وذلك عند الضرورة.

**العنوان:** متحف جاهد يحيى العسيلي بين الحصص في تاريخ مصر، ١٧٠٠-١٩٥٠: بحسب إسقاط المعلم على العصر، دار المساحة، القاهرة، ٢٠١٣.

٤٠ كبسولات كل كبسولة تحتوى على أزيثروميسين دايبيدرات ما يعادل ٢٥٠ ملجم أزيثروميسين في عبوات سعة ٦ كبسولات.

زنكيور ٢٠٠ ملغم/٥ مل معلق جاف، كل ٥ مل من المعلق المحضر تحتوى على أزيثروميسين دايبهيدرات ما يعادل ٢٠٠ ملغم أزيثروميسين فى عبوات سعة ٣٠ مل (بعد التحضير).