

أوكيولوزان^٥

التركيب

المواد الفعالة: نافازولين نيترات، كبريتات زنك سباعي التميؤ، بندق الساحرة، زيت زهرة البرتقال، زيت لافندر، صبغة يوفرازيا (أيبرايث)
السواغ: ١ر ـ مجم كلوريد بنزوكسونيوم لكل مليلتر، سواغ ناقلـة

الشكل الصيدلاني وكمية المادة الفعالة في كل وحدة

زجاجة ذات قطارة والكمية/ زجاجة ذات قطارة:

قطرة للعين: ٥ر ـ مجم نافازولين نيترات لكل مليلتر، ٢ر ـ مجم كبريتات زنك سباعي التميؤ لكل مليلتر، ٤٠ مجم بندق الساحرة لكل مليلتر، ٥٠ر ـ مجم زيت زهرة البرتقال لكل مليلتر، ١٨٠ر ـ مجم زيت لافندر لكل مليلتر، ٨ر ـ مجم صبغة يوفرازيا (أيبرايث) لكل مليلتر

دواعي الاستعمال/ الاستخدامات الممكنة

الاستخدامات الممكنة

الأشكال الحادة والمزمنة من التهاب الملتحمة غير المُعدي، التهاب غير النوعي للملتحمة (يشمل التهاب الذي يحدث بعد شفاء التهاب الملتحمة البكتيري أو الفيروسي).
غسل القناة الأنفية الدمعي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

البالغون

نقطة واحدة، يتم تقطيرها في كيس الملتحمة للعين المصابة ٣-٤ مرات يومياً.

الأطفال والمراهقون

لم تُجرَّ أبحاث على استعمال وأمان أوكيولوزان في الأطفال والمراهقين.
بوجه عام، يجب توخي الحذر عند استعمال قابضات الأوعية في الأطفال، ويجب استعمال جرعات منخفضة.

موانع الاستعمال

الحساسية المفرطة تجاه كبريتات الزنك، أو نافازولين، أو أي مكوّن آخر في التركيبة.
يُحظر استعمال أوكيولوزان أساساً في المرضى الذين لديهم التهاب جاف في القرنية والملتحمة (متلازمة شوجرين)، وكذلك في المرضى الذين لديهم جلوكوما الزاوية الضيقة وجفاف بالعينين.
لا ينبغي إعطاء أوكيولوزان للأطفال تحت ٦ سنوات.
الاستعمال المتزامن مع مثبطات أحادي أمين أوكسيديز (MAO).

التحذيرات والاحتياطات

لا ينبغي استعمال أوكيولوزان لأكثر من ٣ أيام بدون إشراف طبي؛ إذا لم يتحسن تهيج العين خلال هذه المدة، يجب وقف استعمال المستحضر والتفكير في علاج بديل مناسب.
إذا شعر المرضى بألم في العين أو اضطراب في الإبصار أثناء العلاج، يجب أن يوقف فوراً استعمال أوكيولوزان.
يجب توخي الحذر في الأطفال والمراهقين، وفي المرضى الذين لديهم قابلية للجلوكوما، وفي المرضى الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم، أو مرض قلبي، أو ورم القواتم، أو أنيوريزم، أو ارتفاع السكر في الدم، أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

ملاحظة لمرتدي العدسات اللاصقة

يجب خلع العدسات اللاصقة قبل كل تقطير، ولا يُعاد ارتداؤها إلا بعد ١٥ دقيقة من التقطير.

التأثرات

لا ينبغي استعمال المستحضرات المحتوية على نافازولين في المرضى الذين يتلقون علاجاً بمثبطات أحادي أمين أوكسيديز (MAO) حتى مرور ١٠ أيام بعد استعمال الجرعة الأخيرة من مثبط أحادي أمين أوكسيديز (MAO).
قد تشدد أيضاً آثار مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات بالاستعمال المتزامن مع نافازولين.
رغم ذلك، لا توجد حتى الآن تأثيرات معروفة تتضمن قطرة العين أوكيولوزان.
عند الاستعمال المتزامن لساثر المستحضرات العينية، يجب أن تمر فترة ١٥ دقيقة على الأقل بين كل تقطير.

الحمل والإرضاع

لا توجد دراسات منضبطة في الحيوانات أو في النساء الحوامل. لذلك لا ينبغي استعمال المستحضر في النساء الحوامل أو المرضعات ما لم توجد ضرورة واضحة.
لا توجد دراسات عن استعمال المستحضر في النساء المرضعات.

التأثير على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات

لم تُجرَّ دراسات مناسبة.
قد تضعف القدرة على تشغيل الآلات أو القيادة لفترة قصيرة بعد تقطير المستحضر مباشرة.
يجب ألا يزاول المريض الأنشطة المذكورة عاليه إلى حين يعود الإبصار إلى الطبيعي.
قد يحدث تعب في حالات نادرة.

الآثار المناوئة

اضطرابات في العين

شائع: قد يحدث لفترة قصيرة إحساس حارق خفيف وغشاوة في الإبصار عقب التقطير، ولكن هذا لا يؤثر على نجاح العلاج.
قد يؤدي الاستعمال لفترات مفرطة في الطول إلى احمرار العينين (تأثير ارتدادي). نادراً جداً: توسع الحدقة، مع ارتفاع طفيف في الضغط داخل العين.

الجهاز القلبي الوعائي

في حالات نادرة، قد توجد آثار جهازية دورية (ارتفاع ضغط الدم، تسرع القلب، خفقان، أو صداع).
توجد تقارير عن حدوث تعب في بعض المرضى.

تجاوز الجرعة

قد تحدث الأعراض التالية عقب التناول بالغم على سبيل الخطأ: تغيرات في سرعة النبض والنظم، شحوب، تعرق، توسع الحدقة، ارتفاع ضغط الدم، نعاس وانخفاض درجة حرارة الجسم.
قد يحدث ببطء في القلب أو حتى غيبوبة، ولا سيما في الرضع.

الخواص والآثار

الكود S01GA51:ATC

آلية المفعول

تقدم أيونات الزنك أساس المفعول القابض والمطهر الطفيف لكبريتات الزنك.
نافازولين، وهو بنزول إيميدازولين، يعمل كقابض للأوعية ويخفف التهاب الانتهابي وتورم الملتحمة بالارتباط مباشرة بالمستقبلات في العضل الأملس الوعائي.
تعمل خلاصات الهاماميليس (بندق الساحرة) ويوفرازيا على تشديد الأثر المضاد للالتهاب.

الحرائك الدوائية

لا توجد دراسات على الحرائك الدوائية لأوكيولوزان عقب الاستعمال الموضعي في العين. لذلك لا يمكن تقديم معلومات عن الامتصاص، أو التوزيع في سوائل وأنسجة العين، أو الإطراح.
شأنه شأن جميع المواد المحاكية للمسبثاوي ألفا، يمتص نافازولين جهازياً عبر الأوعية الدموية.
غير أنه لا توجد بيانات عن الكمية المحتصة.

البيانات قبل الإكلينيكية

لا توجد بيانات قبل إكلينيكية متاحة بشأن أوكيولوزان.

معلومات أخرى

اللاتوافقات

لا يُعرّف أي منها حتى الآن.

التأثير على الاختبارات التشخيصية

يعطي قياس ضغط العين نتائج مزيفة بالاستعمال المسبق لأوكيولوزان.

العمر الرفي

عند حفظها في العبوة غير المفتوحة، يمكن استعمال قطرة العين أوكيولوزان حتى تاريخ انتهاء الصلاحية (= EXP) المطبوع على العبوة.

احتياطات خاصة بالتخزين

يجب تخزين قطرة العين أوكيولوزان في العبوة الأصلية غير المفتوحة في درجة حرارة ١٥- ٢٥°م.
اغلق الزجاجة مباشرة بعد الاستعمال.
بعد الفتح، لا تستعملها لأكثر من شهر واحد.

أحجام العبوات

أحجام العبوات مختصة بالبلد.

الصانع

انظر اللعبة الخارجية

آخر مراجعة للمعلومات

نوفمبر ٢٠٠٥

تاريخ الموافقة (على النص)

١٤ أغسطس ٢٠٠٦

^(٢) = علامة تجارية مسجلة

نوفارتس فارما، شركة مساهمة، بازل، سويسرا

هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينفعه وضره.
- لا تقطع من تلقاء نفسك مدة العلاج المحددة لك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

تُحفظ الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب